

abietina x *tristis* wordt weergegeven. Hij is van mening dat zeer waarschijnlijk veel van deze vogels Nederland op de trek passeren, maar door de moeilijke herkenbaarheid in het veld onopgemerkt blijven.

Omdat de hierboven ter sprake gebrachte vogel niet bij *fulvescens* of *abietina* kon worden ingedeeld, o.a. op grond van de egaal olijfgroene boven-delen en vleugels en de opvallend lichte keelvlak, lijkt het van voldoende belang deze vondst hier te vermelden.

Castricum, februari 1968.

A. Hoogerwerf, E. J. Kortenoever,
R. Slings, W. Verkerk en K. de Vries.

DE MOGELIJKE HERKOMST VAN DE BROEDENDE KEPEN (*Fringilla montifringilla*) IN 1965 EN 1966 IN NEDERLAND.

Naar aanleiding van de mededeling over de broedgevallen van Kepen in 1965 en 1966 in ons land (*Limosa* 40: 149—150) zou ik de aandacht op het volgende willen vestigen.

In de zomer van 1967 vertelde de heer G. Burggraave uit Brugge mij dat hij van een bestuurslid van de „Nationale Federatie van Belgische Vogel-vangers” had vernomen dat de leden van deze vereniging in het voorjaar van 1965 of 1966 een groot aantal Kepen, die zij in het najaar daaraan voorafgaande hadden gevangen, paarsgewijs hadden losgelaten. In verband met de broedgevallen in die jaren in ons land heb ik hem gevraagd of hij wilde proberen bij genoemd bestuurslid nadere bijzonderheden te krijgen. Op 10 oktober 1967 schreef de heer Burggraave mij het volgende:

„Als antwoord werd mij gemeld dat de meeste vogelvangers in België ertoe werden aangezet om eind mei 1965 elk een koppel Kepen los te laten, die zij tot zolang natuurlijk gekooid hadden gehouden. Het doel was voor België een nieuwe broedvogel te verkrijgen. Volgens mijn korrespondent zouden minstens 10.000 vogelvangers hieraan hebben meegewerkt. Vorig jaar en dit jaar werd dit slechts door enkele vogelvangers herhaald.”

Ofschoon het heel goed mogelijk is dat de broedgevallen in 1965 en 1966 in ons land afkomstig zijn geweest van wilde vogels, moet mijns inziens toch rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat zij betrekking hebben gehad op in België losgelaten vogels. Daar de vogels in België eerst eind mei werden losgelaten, zou dit tevens een verklaring zijn voor de late data van de broedgevallen.

Tenslotte lijkt het mij niet uitgesloten dat verscheidene van de zomer-waarnemingen in 1965 (*Limosa* 40: 57) eveneens betrekking hebben gehad op Belgische vogels.

SUMMARY:

The possible origin of the breeding Bramblings (Fringilla montifringilla) in the Netherlands in 1965 and 1966.

Referring to the communication on the breeding-cases of Bramblings (*Fringilla montifringilla*) in the Netherlands in 1965 and 1966 (*Limosa* 40: 149-150) attention is called to the release of over 10.000 pairs of caged Bramblings in Belgium at the end of May 1965 and of much smaller numbers in 1966 and 1967.

A. L. Spaans.