

Waarneming van een Grijze Gors (*Emberiza cia*) in Nederland (**)

door

H. VAN DONGEN en M. J. TEKKE

Op 13 september 1968 waren wij aanwezig op het Ringstation Meyendel, gelegen in de Haagse Duinwaterleidingduinen. In een van de geheel kale boompjes, die deel uitmaken van de houtwal van de vangplaats, streek op ca. 3 m een vogel neer, die wij op het eerste gezicht voor een Rietgors hielden. Door de kijkgaten van het Ringstation konden wij de vogel zeer goed waarnemen, op een afstand van 15 m, met volle zon in de rug. Plotseling boog de vogel de kop naar beneden, keek naar de grond en hield zijn kop in deze stand, zodat wij volop in de gelegenheid waren hem boven op de kop te bekijken; eerst toen zagen wij dat er over de bovenkop twee zeer donkere strepen liepen, van snavelbasis naar achterhoofd, op een vrij lichte ondergrond. Toen de vogel rechtop zat, was deze tekening derhalve niet zichtbaar. Wij reageerden gelijktijdig op dit zeer in het oog lopende kenmerk en werden het er over eens dat het geen Rietgors was. Met onze kijkers (8 x 40 en 10 x 50) konden wij de nagenoeg zwarte strepen zeer goed waarnemen. Voorts noteerden wij de volgende kenmerken: typische, vrij lichte gorzensnavel; keelstreek en wangen vuilwit; onderzijde beige met spaarzame vlekken; bovenzijde vaal roestbruin met lichte schakeringen door veerranden en een niet zeer opvallende vuilwitte vleugelstreep. Tekke legde de waargenomen details direct vast in een schets; een voorlopige determinatie met de ter plaatse aanwezige literatuur liep uit op Grijze Gors. Dezelfde week ging Tekke naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en daar vond hij tussen de balgen in de collectie direct een exemplaar met een kleed als van de vogel die waargenomen werd; dit bleek te zijn een niet uitgekleurd ♂ van de Grijze Gors. Het leverde geen enkel probleem meer op; de balg, op afstand bekeken, toonde de kop-tekening alsmede de kleuren van de wangen, boven- en onderzijde zoals die in het veld werden waargenomen. De Avifauna van Nederland (p. 93) vermeldt: Eén geval, één waarneming: 14 mei 1942, Marken, Limosa 15: 33 en één onbevestigde waarneming: 26 maart 1928, Weert. Vóór 1900 één vondst (half april 1876, Nijmegen). Volgens de Avifauna van België is de soort aldaar een onregelmatige gast, bijna uitsluitend in de herfst (17 gevallen). Deze waarneming is aanvaard door de C.N.A.

SUMMARY :

New record of the Rock Bunting

On september 13th, 1968 a specimen of the Rock Bunting was seen on the Ringing Station Meyendel in the dunes near The Hague. Till now there were only one find (in the former century), one sight record and one unconfirmed observation (= a trustworthy one man's sight record) of this species in the Netherlands.