

gaande met slagregens. Hierop volgde een zondag „potdicht” van mist en regen.

Om een uur of 12 zagen wij bij de Waalenburg een *Wespendief* overgaan, met veel lawaai uitgeleide gedaan door wolken vogels van dit drassige gebied; hij verdween in oostelijke richting.

Hoeveel *Wespendieven* er in het totaal op het eiland waren valt moeilijk vast te stellen. Wij kunnen alleen instaan voor de door ons waargenomen roofvogels: 22 *Wespendieven* en 1 *Zwarte Wouw*. Volgens de Avifauna van Texel (1963) is er tot nu toe slechts één maal een *Zwarte Wouw* waargenomen, t.w. op 20 november 1931. Dit zou dus op een eerste voorjaarswaarneming wijzen.

P. Meeth.

[Voor verdere gegevens over grote aantallen *Wespendieven* op de trek zie o.a. De Ned. Vogels : 485; *Limosa* 38 : 37 en 40 : 25 (t.K.)]

*ENKELE ♂ EX. VAN DE BLAUWE KIEKENDIEF (Circus cyaneus) IN JEUGDKLEED BROEDVOGEL OP AMELAND IN 1968.*

Tijdens een vakantieverblijf op Ameland van 25 mei—15 juni 1968, werden op 3 ver uiteenliggende plaatsen op het eiland Ameland regelmatig prooi-overdrachten waargenomen tussen 2 exemplaren van de *Blauwe Kiekendief* in ♀ kled. De prooi-overgave vond steeds op de gebruikelijke wijze in de lucht plaats, waarbij vaak het karakteristieke „pie-e” van één van de vogels werd gehoord.

Aangezien vliegvlugge jongen van deze soort in de bovengenoemde periode nog niet te verwachten zijn, en bovendien van de jachtopziener, de heer S. Timmer, werd vernomen dat alle jongen op het gehele eiland, voorzover reeds aanwezig, nog klein waren, nam mijn belangstelling toe, omdat het vermoeden rees, dat het hier 3 ♂♂ in jeugdkled betrof. Hoewel uiteraard steeds van grote afstand werd waargenomen, viel bij alle 3 plaatsen al spoedig op, dat de prooi-brengende exemplaren iets kleiner waren dan de prooi-ontvangende, terwijl de eerstgenoemde vogels hoewel zeer gelijkend op de laatstgenoemde, op de gehele bovenzijde iets lichter bruin van kleur waren.

Dat er hier sprake moest zijn van juveniele ♂♂ werd bevestigd toen één der exemplaren na een prooi-overdracht eens vlak langs vloog, waardoor waargenomen kon worden, dat er zich ongeveer ter hoogte van de overgang van hand- in armpennen een kleine lichtblauwe plek op de bovenzijde van de vleugels bevond.

M. H. B. v. d. Beek.

*Naschrift.*

Niethammer (*Handbuch der Deutschen Vogelkunde*, II (1938): 219) schreef reeds: „Geschlechtsreife: Bereits junge, noch unausgefärbte ♂ balzen (E. Hesse, *J. Orn.* 1912) und horsten auch (Banzhaf briefl.)” (t.K.).