


*EEN WAARNEMING VAN EEN WITVLEUGELSTERN (Chlidonias leucopterus) IN ZUIDELIJK FLEVOLAND*

Op 10 augustus 1968 zag ik een Witvleugelstern in de nieuwe polder Zuidelijk Flevoland, die in het begin van 1968 droog viel. Ik liet de vogel zien aan de heer J. Vos, die de waarneming geheel kon bevestigen. De stern vloog ter hoogte van Spakenburg van het Eemmeer de nieuwe polder in (bij km-paal 23) en passeerde ons op ongeveer 40 meter. We konden de vogel circa 10 minuten observeren met de zon in de rug terwijl er een flinke noordenwind woei. We gebruikten 12 x 60 en 15 x 70-kijkers, die op



De Witvleugelstern in Zuidelijk Flevoland, 10 augustus 1968.

statieven stonden. Terwijl hij op insecten joeg, laag boven de in ruime mate aanwezige moerasandjvie (*Senecio congestus*), varieerde de afstand tussen ons en de vogel van honderd tot vierhonderd meter. Door de opmerkelijk contrastrijke combinatie van de zwart-witte kop en onderdelen (in de rui), zwarte ondervleugeldekveren, donkergrijze rug, witte stuit, staart, onderstaartdekveren en bovenzleugeldekveren kon de Witvleugelstern gemakkelijk worden herkend temidden van de hem omringende Zwarte Sterns, zelfs op grote afstand. Het wit van de bovenzleugeldekveren ging geleidelijk over in het grijs van de grote en kleine slagpennen. De staart was zwak gevorkt. Vorm en kleur van de snavel konden niet nauwkeurig worden waargenomen.

Enig verschil in vliegwijze, postuur en silhouet tussen de Witvleugelstern en de Zwarte Sterns werd niet opgemerkt.

Gedurende de zomermaanden en vroege herfst bevonden zich, zoals gewoonlijk, langs de IJselmeerkust duizenden Zwarte Sterns.

#### SUMMARY :

##### *Observation of a White-winged Black Tern (Chlidonias leucopterus) in Zuidelijk Flevoland*

On the tenth of August 1968 a White-winged Black Tern was seen in the new Dutch polder „Zuidelijk Flevoland“. Because of the remarkably contrasting combination of the black and white head and underparts (in moult), black underwing-coverts, dark-grey back, white rump, tail, undertail-coverts and upperwing-coverts it was easily recognized among the surrounding Black Terns. In summer and early autumn the coast of the Yselmeer is the domain of thousands of Black Terns.

E. J. van IJzendoorn.

#### *NOORDSE STERNA (Sterna paradisaea) OP AMELAND*

In aansluiting op hetgeen in Limosa 40, 1967 : 40 wordt medegedeeld over de Noordse Stern (*Sterna paradisaea*) op Ameland, lijkt het niet van belang ontbloeit er melding van te maken, dat deze soort ook in 1968 weer broedend op dat eiland werd aangetroffen; in 1967 lukte het niet dit met zekerheid vast te stellen.

Op een schelpenstrand nabij Hollum werden op en omstreeks 24 mei van dit jaar drie paren waargenomen, waarvan met zekerheid een 3- en een 2-legsel werden gevonden, maar vermoedelijk ook nog een 1-legsel. Het 2-legsel werd een dag nadat wij het vonden door schapen stuk getrapt, maar tot eind mei bleef dit lot het 3-legsel bespaard. Echter werd dit legsel een zo grote bezienswaardigheid dat mag worden betwijfeld of de eieren normaal zijn uitgekomen. Die grote belangstelling werd veroorzaakt door de opvallende agressiviteit van de vogels: bezoekers aan het broedterrein werden al op een afstand van 15-20 meter van het nest door de vogels aangevallen waarbij het regelmatig voorkwam dat de hoofden der indringers werden geraakt (zie foto).

Vermoedelijk gold een bericht dat tegen het einde van juni in de pers verscheen, deze zelfde soort; dit bericht vermeldde dat Duitse badgasten door de vogels tot de vlucht werden gedwongen nadat ze een ei hadden opgeraapt . . .

In de buurt van de door ons gevonden nesten werd slechts één paar Visdiefjes opgemerkt, waarvan een 3-legsel werd gevonden; het opvallende verschil in gedrag trad evident aan de dag.

Bijgaande foto van de Noordse Stern, die door een vriend van mij werd gemaakt, demonstreert duidelijk de grote agressiviteit der vogels.

Bakkum NH, augustus 1968

A. Hoogerwerf.