

minuut liggen zonder merkbaar dieper te zinken. De staart werd daarbij iets schuin omhoog gehouden, geheel boven water. De meeuwen gingen in de buurt op het water liggen.

Na enige tijd vloog de Kramsvogel zonder enige moeite op uit het water en vloog naar de kant, waar de meeuwen de inmiddels weer ingezette achtervolging beëindigden.

Hoewel de vogel niet geheel fit leek te zijn, kan uit het bovenstaande toch gekonkludeerd worden, dat de Kramsvogel een zeker drijfvermogen bezit en daar eventueel gebruik van kan maken.

R. Meijer.

NOG EEN WAARNEMING VAN CETTI'S ZANGER IN ONS LAND.

Op 15 mei 1969 en volgende dagen werd een zingend ♂ van Cetti's Zanger waargenomen onder de gemeente Nuth L., door het Unielid, W. de Veen te Schinnen en andere Limburgse ornithologen.

Een uitvoerige mededeling over deze waarneming volgt later. Deze is nog niet beoordeeld, doch op grond van de thans ontvangen gegevens mag worden verwacht, dat dit de 2de bevestigde waarneming voor Nederland wordt. Voor de eerste, zie p. 110 van dit nummer.

C.N.A.

WAARNEMING VAN EEN NOORDSE BOSZANGER (Phylloscopus borealis) OP TERSCHELLING.

Op 8 september 1967 zocht ik het begin van de Stuifdijk op de Bosplaat van Terschelling af naar zangertjes, die daar in de trektijd de dag plegen door te brengen in het duindoornstruweel. Mijn aandacht werd spoedig getrokken door een afwijkende *Phylloscopus*-achtige vogel. Deze viel tussen de ook aanwezige Fitissen allereerst op door de grijsgroene kleur van de bovendelen (kop, rug, stuit en staart) en de grijswitte kleur van de onderdelen, waarvan alleen op de borst een zweem van geel te zien was. Bij nadere beschouwing was duidelijk één klein smal lichtgeel vleugelstreepje te zien. De lichtbruine kleur van de poten wees hierna uit, dat het om een Noordse Boszanger (*Phylloscopus borealis*) ging.

In tegenstelling tot wat in de verschillende handboeken vermeld staat, was de lichte geelwitte wenkbrauwstreep minder opvallend dan bij de aanwezige Fitissen. Bij de laatstgenoemde vogels liep de wenkbrauwstreep vanaf de snavel langs het oog naar achteren, terwijl deze bij de Noordse Boszanger vanaf de voorkant van het oog achterwaarts verliep, dus niet tussen oog en snavel. De twee geluiden, die de vogel kort na elkaar elk eenmaal liet horen, verschilden geheel van die van Fitis of Tjiftjaf: ik noteerde „tittitsliet” en „tsliet”, beide geluiden hoog en scherp.

De Noordse Boszanger vertoonde het normale *Phylloscopus*-gedrag, scharrelde actief in de duindoorns en over de grond op insectenjacht en maakte

nu en dan een uitvalsvluchtje op vliegenvangermanier. Regelmatig ging de weinig schuwe vogel boven op de duindoornstruiken zitten, ook op korte afstand, wat een uitstekende waarneming mogelijk maakte. Van 15.20 tot 17.05 uur had ik de vogel vrijwel onafgebroken in het kijkerbeeld (10×50), meestal op 4 tot 15 m afstand onder allerlei belichtingen en bij weinig wind. Van 18.00 tot 18.30 uur was ik weer ter plaatse, nu in gezelschap van Chr. Smeenk, die alle bovengenoemde kenmerken (behalve geluid) bevestigde. Alleen werd de Noordse Boszanger door Smeenk wat groter, door mij wat kleiner geschat dan de Fitis.

W. Dubbeldam.

De C.N.A. beschouwt deze waarneming als onvolledig op grond van de beschrijving van de wenkbrauwstreep en de lichaamsgrootte, alsmede het ontbreken van een verwijzing naar de snavelvorm. (Redactie).

*TWEDE WAARNEMING VAN DE BUIDELMEES (Remiz pendulinus)
AAN HET BEUVEN, N. BRABANT.*

Op 9 november 1968 zag ik aan het Beuven te Someren op ca 25 m afstand van de plaats waar ik op 21 oktober 1967 een Buidelmees had gevangen (zie *Limosa* 41: 29) weer een exemplaar. Op slechts 8 m van mij verwijderd kwam de vogel uit het riet omhoog, klom tot in de top van een rietstengel waar hij even bleef zitten en vloog tenslotte laag over het riet weg, richting zuid. De oog- en oorstreep was, vergeleken met die van de gevangen vogel van 1967, slechts een zwakke aanduiding te noemen.

A. P. van Aerle.

SUMMARY:

Second record of the Penduline Tit at the Beuven, Province of Noord-Brabant

On November 9th, 1968 a juvenile specimen of the Penduline Tit was seen on nearly the same spot in the Province of Noord-Brabant, where an adult specimen had been caught on October 21st, 1967.