

De ondergetekenden houden zich sinds 1963 bezig met het verrichten van zo veel mogelijk dagelijkse waarnemingen vanaf het havenhoofd van trek en trekgedrag van sterns (voornamelijk Visdief, Grote Stern en Dwergstern); zij hebben ook met de Noordse Stern en de Lachstern voldoende veldervaring.

De waarneming werd verricht om 9.10 uur 's-morgens bij brekende bewolking na wat heilig weer en bij zachte zuidwestelijke wind (windkracht 3). De drie Dougalls Sterns werden het eerst opgemerkt door Van Bruggen. De vogels passeerden op zeer korte afstand en wel op circa 4 meter van de waarnemingsplaats en 5 meter boven de waarnemers.

De volgende kenmerken werden vastgesteld: zeer slanke sterns van het type van de Visdief, met een zwarte veeg op punt van de bovenvleugel, maar met een korter lichaam en met naar verhouding lange staart en zeer slanke vleugels, helder witte onderzijde en opvallend lange, dunne, geheel zwarte of bijna geheel zwarte snavel (mogelijk met iets roods). Zij maakten een kleinere en slankere indruk dan Visdieven en onderscheidden zich bovendien door hun vaste, rechtlijnige vlucht met rustige, ondiepe vleugelslag. Bij hen vergeleken maakten de twee minuten later passerende Visdieven een lompe en grijze indruk, terwijl de rode kleur op de snabels van de Visdieven eveneens opviel. De drie vogels maakten geen geluid.

Afgezien van twee of drie onzekere gevallen, is dit de eerste maal dat wij deze soort met zekerheid, tijdens onze waarnemingen vanaf het Scheveningse havenhoofd, hebben vastgesteld.

Van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna werd bericht ontvangen dat deze onze waarnemingen op grond van de ingediende uitvoerige beschrijvingen in zijn vergadering van 14 december 1968 voor de avifauna van Nederland heeft aanvaard.

M. van Bruggen
F. H. Jansen
R. J. J. Vlek

SUMMARY

New record of the Roseate Tern

On August 2nd, 1967 three Roseate Terns were seen off the coast near Scheveningen. This is the third record in the Netherlands for this century.

WAARNEMING VAN EEN BALKAN GELE KWIKSTAART (*Motacilla flava feldegg*) IN ZUIDELIJK FLEVOLAND

Op 23 mei 1968 reden wij per auto in Zuidelijk Flevoland over de dijk van Nijkerk naar Muiderberg. Ter hoogte van km.paal 20/6 reden wij zeer langzaam omdat ons bekend was, dat zich hier sinds enige tijd een aantal Noordse Gele Kwikstaarten (*Motacilla flava thunbergi*) ophield. Plotseling zagen wij op een schraal begroeid gedeelte een paartje Gele Kwikstaarten. Het ♂ was een bijzonder fraaie vogel met een fluweelzwarte kopkap welke doorliep tot ver in de nek. Opvallend was ook, dat het oog geheel in het zwart viel. De onderzijde van de vogel was diepgeel hetgeen ook kon worden op-

gemerkt van keel en kin. Het geel reikte tot aan de basis van de ondersnavel. Wij waren er al spoedig van overtuigd, dat wij een Balkan Gele Kwikstaart in de kijker hadden.

Wij waren in de gelukkige omstandigheid de vogel geruime tijd onder uitstekende belichting van nabij, zowel op de grond als in de vlucht te kunnen gadeslaan. Hierdoor waren wij ook in staat waar te nemen, dat het exemplaar twee fijne geelachtige streepjes over de vleugel had. Op de borst was een opvallend „collier” van donkere vlekken te zien, een verschijnsel dat ook wel voorkomt bij de Noordse Gele Kwikstaart. Het leek ons, dat de Balkan Gele Kwikstaart iets groter en zwaarder was dan de in de omgeving aanwezige Noordse Gele Kwikstaarten. Ook de veelvuldig gehoorde roep leek ons afwijkend van de roep van de andere — ons bekende Gele Kwikstaarten. Het ♀ dat zich steeds in de onmiddellijke omgeving ophield van ons exemplaar, was niet te onderscheiden van een Gele Kwikstaart ♀ (*Motacilla flava*).

Op 24 mei 1968 hebben Dr. G. A. de Vries en Mej. M. H. F. Luykx uit Baarn op deze plaats gedurende korte tijd eveneens een exemplaar van de Balkan Gele Kwikstaart kunnen waarnemen, waarbij de volgende notities werden gemaakt: Waarnemingsplaats: dijk van Zuidelijk Flevoland ter hoogte van de Eemmond. De Balkan Gele Kwikstaart, die vanuit de auto voor slechts korte tijd op ± 5 meter afstand met een 8×30 Zeiss prismakijker werd waargenomen, vertoonde de volgende kenmerken: diepzwarte schedel en wangen, zwart ver op de nek doorlopend, geen oogstreep, onderzijde, kin en keel goudgeel, aan de zijkanten van de borst opvallende donkere vlekken. In de onmiddellijke nabijheid hielden zich 2 Noordse Gele Kwikstaarten en 1 paar gewone Gele Kwikstaarten op.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit dezelfde vogel zijn geweest. Aan de hand van enige ter plaatse door ons gemaakte kleurendia's kon Prof. Dr. K. H. Voous later onze waarneming bevestigen.

Op 13 mei 1960 zagen Kist en Waldeck voor het eerst in Nederland een Balkan Gele Kwikstaart nabij het gemaal Lovink in O. Flevoland (Limosa 34: 3). Op 15 mei d.a.v. zag Swaab 's morgens op dezelfde plaats twee exemplaren terwijl Klatte, v. d. Oord, Swaab en Tekke later op deze dag nog een exemplaar konden vaststellen (Limosa 35: 167).

Volgens Tekke (in litt. aan ten Kate) worden de gevallen van 13 en 15 mei 1960 thans als één waarneming beschouwd (contra Limosa 37: 302).

CNA: bevestigde waarneming

N. Marra

N. Marra Jr.

SUMMARY

New record of Motacilla flava feldegg

On May 23rd and 24th, 1968 a ♂ of *Motacilla flava feldegg* was seen on the same spot in Southern Flevoland. Till then only one record was known for the Netherlands.