

KORTE MEDEDELINGEN**INTERESSANTE BROEDGEVALLEN IN SCHOORL IN 1970**

CHR. VAN ORDEN en C. OOEYEEVAAR

Waarschijnlijk door het extreem koude voorjaar — nog kouder dan dat van 1969 — waren diverse trekvogels, vooral Koperwieken, Kramsvogels en Kepen, in Schoorl nog eind april te zien. Zo kon men in de laatste tien dagen van april volledige zang van Koperwieken en Kramsvogels horen, hetgeen wij hier nog niet eerder hebben meegemaakt. Zelfs op 3 mei zongen er nog Koperwieken bij het voormalige station van Schoorl. In voorgaande jaren zagen we de laatste Koperwieken zelden later dan 18 april.

Door het koude weer zijn diverse vogels verlaat weggetrokken. Vogels als Keep, Vuurgoudhaan en Sperwer bleven zelfs en hebben met succes in Schoorl gebroed.

De Keep overzomert zo goed als elk jaar in zeer klein aantal (1—3 ex.) in Schoorl, vaak rondom de Geitenweide in de boswachterij. Dit waren altijd mannetjes. Dit jaar waren er maar liefst 7 mannetjes verspreid in de boswachterij aan het zingen. Met zekerheid zijn 5 van deze ex. vrijgezel gebleven. Een is enkele malen gezien in de nabijheid van een Vinkenvrouwkje, doch op een gegeven moment was dit vrouwtje verdwenen. Het laatste ex. heeft echter met succes bij de kruising Bleydensteinseweg—Julianalaan gebroed. Het nest is niet gevonden, wel zijn de oude vogels met drie net uitgevlogen jongen herhaalde malen gezien. Op 28 juni alarmeerden de vogels bijzonder. Jongen zagen we op dat moment nog niet. Op de avond van 2 juli namen we voor het eerst de jongen waar in gezelschap van de oude vogels. Tot 6 juli hebben we de familie daar waargenomen, waarna zij zich verspreidde.

Het Vuurgoudhaantje heeft voor zover wij weten nog niet eerder in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gebroed. Voor het eerst kreeg één van ons (v. O.) in 1969 het vermoeden van broeden doordat in mei en juni een ex. bij het begin van de Oorsprongweg steeds zong, van vroeg tot laat in de avond. De vogel is waarschijnlijk vrijgezel gebleven. Begin mei 1970 waren er in de boswachterij diverse zingende Vuurgoudhaantjes waar te nemen. De meeste zijn alsnog vertrokken, doch eind juni bleek 1 paar met uitgevlogen jongen bij de jeugdhierberg te vertoeven. Op 7 juli vonden we een nest met 5 jongen in een laaghangende tak van een fijnspar, ook bij de jeugdhierberg, terwijl op de zelfde dag nog twee families met uitgevlogen jongen werden gezien. Elders in de boswachterij hebben we geen Vuurgoudhaantjes meer waar kunnen nemen. In totaal waren er dus zeker 3 broedparen. Op zichzelf is het broeden van het Vuurgoudhaantje in het westen van Nederland, nadat de soort zich ogenschijnlijk blijvend in Engeland is gaan vestigen, niet sensationeel, doch wel nieuw.

De Sperwer, die sinds 1963 niet meer broedde in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, heeft dit jaar met succes 2 jongen grootgebracht. Ook dit broedgeval vond plaats bij de jeugdherberg. Opmerkelijk voor de Sperwer was dat ook deze soort nog zo algemeen doortrok eind april begin mei.

De Goudvink, die zeker in de laatste 15 jaren niet meer in Schoorl broedde — voordien hoogst incidenteel — heeft bij de Bickerslaan 3 jongen groot weten te brengen in een verwilderde tuin. Voor het eerst werden de jonge vogels waargenomen op 13 mei.

Voorts is de ontwikkeling van de Kleine Barmsijs rooskleurig. Circa 32 paren hebben in de boswachterij gebroed en zeker 4 paren in grotere tuinen. Totaal dus zeker 36 paren. Voor het eerst, zover wij weten, is ook het aantal broedparen van de Kleine Mantelmeeuw boven de 20 gestegen, nl. 21 paren. Het overgrote deel behoort o.i. tot de vorm *intermedius*. De Boomvalk heeft met maar liefst 6 paren gebroed. Voordien was het hoogste aantal 4 broedparen.

Adres: Landenstraat 7, Schoorl.

ZEER DONKER GEKLEURDE TORENVALK TE EEMNES

An exceptionally dark-coloured Kestrel at Eemnes

R. RENSE

Op 23 augustus 1970 namen de heer Drs. C. S. P. van Dam en de ondergetekende te Eemnes twee Torenvalken *Falco tinnunculus* L. waar, die boven een zogenaamd „wiel” of „waai” (doorbraakkolk) naar prooien zochten en daarbij de „biddende” houding aannamen. Na ongeveer tien minuten verdwenen zij.

Eén der exemplaren was een groot mannetje dat aan de bovenzijde zeer donkerbruin, bijna zwart was. Aan de onderzijde was de vogel eveneens opvallend donkerder gekleurd dan andere Torenvalken. Elke andere valkensoort kan hier worden uitgesloten, omdat dit exemplaar een duidelijke grijze staart met zwarte eindband had.

Het andere exemplaar, dat geregeld in de lucht met genoemd mannetje prooien zocht, was kleiner en betrof een jong mannetje (in jeugdkleed) of een vrouwtje.

Interessant is nog te vermelden dat de heer N. Marra op 13 en 19 september 1969 langs de Knardijk (tussen paal 13 en 14) ook een bijna zwart exemplaar van de Torenvalk heeft waargenomen.

SUMMARY

An exceptionally dark-coloured male Kestrel has been observed at Eemnes, Netherlands.

Adres: Laan v. Vollenhove H 93, Zeist.