

IN 1971 MINDER RUIENDE GRAUWE GANZEN IN HET HARINGVLIET

Less moulting Grey Lag Geese at the Haringvliet in 1971

G. L. OUWENEEL

In de zomer van 1971 brachten iets minder dan 400 Grauwe ganzen *Anser anser* op de noordelijke Ventjagersplaten in het Haringvliet de vleugelrui door, een aanzienlijk geringer aantal dan in 1969, toen ter plaatse 1000—1200 Grauwe ganzen ruiden (Limosa 42, 206), en ook een afname ten opzichte van 1970 toen de concentratie ca. 600 vogels telde (Limosa 43, 159). De vogels arriveerden enkele dagen vroeger in vergelijking met beide voorgaande jaren: op 30-5-1971 waren reeds 250 exemplaren aanwezig, ruim 60% van het gezelschap. In 1969 bleek op 1-6-1971 slechts 16% van de uiteindelijke concentratie present te zijn en in 1970 was op 5-6-1971 nog maar ruim 40% gearriveerd. Het gedrag van de ganzen wees er op, dat op 30-5-1971 de rui-cyclus althans voor een deel van de aanwezige vogels reeds was ingezet: ca. 150 vogels zwommen toen zeer geconcentreerd in het Ventjagersgaatje. Op 2-6-1971 verzamelden jeugdige recreanten slagpennen langs de noordzijde van de Dammenweg. Evenals in 1969 bevond zich in de concentratie een Streepkop *Anser indicus*.

De ruiende ganzen troffen in 1971 — in tegenstelling tot voorgaande jaren — een getijloos gebied aan, waarin delen van de Ventjagersplaten onregelmatig droogvielen. De regenperiode in juni 1971 deed het water zodanig wassen dat ook de hoogst gelegen delen van het platencomplex voor langere tijd onderkwamen, zodat in die periode de ruiende vogels althans de dagen zwemmend moesten doorbrengen. Aanwijzingen werden verkregen dat de ganzen naast de gebruikelijke gorzenstrook langs de zuidoever van het Haringvliet op Overflakkee óók in de zich snel ontwikkelende vegetatiekraag langs de Dammenweg kwamen fourageren. Op een tweetal data, 26-6-1971 en 3-7-1971, werd fourageren van nog niet geheel vliegvlugge Grauwe ganzen waargenomen op de genoemde terreinen tijdens de ochtenduren.

Interessant is nog de waargenomen ruitrek (moult-migration) van Grauwe ganzen op Ameland tijdens de Club-excursie op 22 en 23-5-1971. In dit week-einde werden tenminste 2 vluchten Grauwe ganzen waargenomen: één vlucht van 18 exemplaren op 22-5-1971, die het oostelijk deel van het eiland kruiste richting ZW, en de volgende dag een vlucht van 14 exemplaren, die boven de zeereep in westelijke richting vloog.

SUMMARY

In the summer of 1971 only 400 Grey Lag Geese moulted at the Haringvliet in the Netherlands. In 1969, 1000—1200 geese and in 1970 about 600 geese moulted there.

On the 22nd and 23rd of May moult-migration was observed at Ameland, one of the Waddenislands, north of the Netherlands: two flights of respectively 18 and 14 geese were seen flying in a south-westerly direction.

LITERATUUR

Salomonsen, F. (1968): The moult migration. *Wildfowl* 19: 5—24.
Adres: Kilstraat 22, Maasdam.