

„Siie”, volkomen verschillend van het geluid van de hier inheemse Boomkruiper. Naar aanleiding van bovenstaande kenmerken kwamen wij tot de conclusie, dat onze vogel een Kortsnavelboomkruiper *Certhia familiaris* moest zijn. Ik wil hierbij nog aantekenen, dat de bruine bovenzijde van dit exemplaar mij nog iets donkerder van kleur leek, dan van de Kortsnavelboomkruipers welke wij in 1967 op Öland (Zweden) zagen. Maar dit is achteraf natuurlijk niet te beoordelen. Zeker is wel, dat onze vogel lichter bruin was dan de Nederlandse broedvogels.

Helaas bestond door gebrek aan tijd geen gelegenheid het gevangen exemplaar te meten en te wegen. Om dezelfde reden was ik niet in staat de vogel te tonen aan één of meer in mijn omgeving wonende waarnemers. In de late namiddag van 30 september werd de vogel geringd in onze tuin losgelaten.

In Limosa 35: 223—226 schrijft Dr. K. Waldeck over een waarschijnlijke waarneming van een Kortsnavelboomkruiper op 8 oktober 1961 in Den Haag en attendeert hij de veldornithologen op de mogelijkheden tot waarneming van deze tot dan nog niet voor Nederland vastgestelde boomkruiper. In Limosa 42: 112—113 beschrijft O. de Bruyn een waarneming van de Kortsnavelboomkruiper nabij Zeddam op 29 december 1967. Deze waarneming werd door de Commissie voor de Nederlandse Avifauna bevestigd, waarmee de Kortsnavelboomkruiper in de Nederlandse lijst werd opgenomen.

Hoewel op het moment, dat deze bijdrage geschreven wordt de beslissing van de C.N.A. nog niet bekend is, leek het mij goed de waarneming hier toch te vermelden, omdat deze de mening van Waldeck zou kunnen bevestigen, dat de Kortsnavelboomkruiper meer in ons land voorkomt dan de waarnemingen en publikaties doen vermoeden.

C.N.A.: Onvolledige waarneming.

SUMMARY

It is possible that a Tree Creeper *Certhia familiaris* L. has been caught at Groenekan (U).

Adres: Koningin Wilhelminaweg 337, Groenekan (U).

BLONDE TAPUIT *OENANTHE HISPANICA* OP TERSCHELLING

Black eared Wheataer *Oenanthe hispanica* op Terschelling

J. VAN DIJK en J. C. VAN DIJK-BOOMGAARDT

Op 6 mei 1970 fietsten wij langs de oostelijke rand van het Formerumer Bos, toen wij tussen een groep van circa 15 Tapuiten *Oenanthe oenanthe* een bijzonder contrastrijk vogeltje zagen zitten. Even later konden wij door onze kijkers (12 x 60; 7 x 50) in het door duinen omzoomde weiland een inderdaad zeer afwijkende tapuit waarnemen. Met de zon achter ons en de vogel op ca. 20 m afstand, kon de volgende beschrijving worden opgemaakt:

Grootte en houding als Tapuit.

Vleugels geheel gitzwart.

Rug, nek en kruin geheel egaal zandkleurig met okergele tint; alleen voorhoofd lichter.

Oogstreek en wang zwart, lichte keel.

Onderzijde vuilwit, met alleen op de borst dezelfde kleur als op de rug, maar veel bleker.

Staartpatroon als bij Tapuit, maar zwarte eindband erg smal, smaller dan bij de meeste andere tapuiten.

Gedrag en vlucht als Tapuit. In vlucht vallen de geheel gitzwarte vleugels en schouders erg op.

We namen de vogel waar van 14.25-14.35 uur. Daarna verdween de vogel met de andere tapuiten in oostelijke richting. Voor ons stond dadelijk vast dat we een lichtkelige Blonde Tapuit hadden waargenomen. Daar we een prachtig uitgekleurd mannetje hadden gezien, kon ook de subspecies bepaald worden. In „Birds of the British Isles” van D. A. Bannerman vonden we nl. voor de oostelijke subspecies vermeld staan: „entirely lacks the sandy-coloured plumage which is so characteristic of the western subspecies”.

Gelet op de kleur van de rug, zijn wij er van overtuigd een mannetje van *Oenanthe hispanica hispanica* te hebben waargenomen. Tot nu toe werd de soort twee maal eerder waargenomen zonder dat de subspecies vastgesteld kon worden, nl. op 7 mei 1937 te Wassenaar en op 13 augustus 1962 op Texel (Limosa resp. 10: 111, 36: 118). Wellicht is het interessant nog te herinneren aan de weerssituatie van begin mei 1970. Na een bijzonder koude aprilmaand volgde een zeer fraaie eerste meiweek met een matige tot krachtige zuidoosten wind.

C.N.A.: De determinatie van bovenstaande waarneming werd in de C.N.A.-vergadering van 3 april 1971 als juist aanvaard; door afwezigheid van méér waarnemers wordt de waarneming als „onbevestigd” geregistreerd.

Adres: J. de Veerstraat 42, Noordwijk-binnen.

WITTE KWIKSTAART ALS WINTERVOGEL IN ZEEUWS-VLAANDEREN

Observations on the White Wagtail during the winter in Zeeuws-Vlaanderen

J. J. VAN DEN STEEN

Uit mijn waarnemingen van de laatste 15 jaar ben ik stellig tot de overtuiging gekomen dat de Witte Kwikstaart *Motacilla alba alba* in Zeeuws-Vlaanderen een regelmatige wintervogel en dus een jaarvogel in Nederland is.

Ik geef hieronder mijn waarnemingen, gedaan in het Krekengebied Canisvliet tussen 20 november en 1 maart in de laatste vier jaar, waarbij de getallen tussen haakjes de aantallen waargenomen vogels aangeven:

1967/68: 29/11 (1), 10/12 (4), 30/12 (1), 1/1 (1), 7/1 (1), 20/1 (1), 10/2 (1) en 24/2 (1);