

1968/69: 22/12 (4), 25/12 (9), 29/12 (1), 5/1 (1), 12/1 (1), 21/1 (1) en 2/2 (1);

1969/70: 22/11 (8), 29/11 (1), 6/12 (3), 9/12 (1), 13/12 (3), 20/12 (2), 26/12 (1), 3/1 (2), 17/1 (1), 31/1 (1), 7/2 (1), 14/2 (1), 21/2 (1) en 28/2 (1);
1970/71: 26/11 (2), 28/11 (2), 5/12 (1), 12/12 (2), 17/12 (2), 19/12 (6), 27/12 (2), 10/1 (1), 12/1 (1) en 16/1 (1).

Na bestudering van mijn gegevens uit de periode winter 1955/56 tot en met 1966/67 stelde ik vast dat ik in de maanden november-december-januari en februari regelmatig Witte Kwikstaarten zag te Sas van Gent, Zandstraat, Philippine, Braakman en Terneuzen. Te Sas van Gent was er tot en met 1964/65 midden in de kom van de gemeente een rietstukje in een zijarm van het kanaal Gent-Terneuzen (werd nadien opgespoten). Daarin roestten gedurende de voormelde maanden en sinds 1955/56 (begin van mijn waarnemingen) alle avonden tot max. 50 Witte Kwikstaarten. Deze waren vaak in gezelschap van enkele Grote Gele Kwikstaarten.

De Witte Kwikstaart gedraagt zich in de wintermaanden als wintervogel heel anders dan onze soms eind februari-begin maart aankomende broedvogels. Overdag komen deze vogels vrijwel niet in de nabijheid van bebouwde plaatsen maar verblijven midden in de polders op geschikte plaatsen.

Bij strenge aanhoudende vorst worden de waarnemingen schaarser, maar de vogels verdwijnen niet helemaal.

Adres: Stevensstraat 18, Sas van Gent (Z-VI.).

DE SPREEUW ALS VOEDSELPARASIET VAN DE GRUTTO

Starlings pursuing Black tailed Godwits

J. HOF

Op 30 juni 1971 was ik getuige van een vreemd gedrag van Spreeuwen. In de gemeente Ooststellingwerf (Frl.) fourageerden op een perceel gemaaid grasland ca. 25 Grutto's en ca. 7 Spreeuwen. Telkens wanneer een Grutto een worm uit de grond had gehaald, probeerden Spreeuwen hem deze afhandig te maken. Dit leidde tot wilde achtervolgingsvluchten door één en soms door twee Spreeuwen. Tijdens deze vluchten probeerden de Spreeuwen het voedsel van de Grutto's te bemachtigen door steeds van onderen af aanvallen uit te voeren op de snavel van de Grutto. Opvallend was de felheid waarmee de Spreeuwen trachten hun doel te bereiken. Na 20 à 30 seconden staakten de Spreeuwen meestal hun poging en voegden zich dan weer tussen de nog fouragerende Grutto's, waarna het „spelletje” zich herhaalde. Gedurende mijn waarneming is het de Spreeuwen niet gelukt om op deze wijze voedsel te bemachtigen. Men zou echter mogen veronderstellen dat de Spreeuwen er in sommige gevallen in geslaagd moeten zijn op deze manier voedsel te bemachtigen, gezien de felheid waarmee dit alles plaatsvond.

Uit een publikatie van Rittinghaus (1951) is bekend dat een Spreeuw een visje bemachtigde uit de snavel van een Dwergstern.

SUMMARY

Starlings pursuing Black tailed Godwits were observed. They were not successful in capturing food from these birds.

LITERATUUR

Rittanghaus, H. 1951. Der Star als Nahrungschmarotzer der Zwergseeschwalbe *Sterna Albifrons*. Vogelwarte 16: 15—16.

Adres: Paulus Potterstraat 151, Zutphen.

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1971
(EN EERDER)

W. PH. J. HELLEBREKERS

Grutto *Limosa limosa* broedend in tarwevelden.

J. van der Straaten en L. M. van den Bergh maken melding van drie paar Grutto's broedend in tarwevelden op 1 juni 1970 langs de Vogelweg O. Flevo-land.

Bosuil *Strix aluco* broedend in een konijnehol.

Vogeljaar 1970: 294. Op 10-4-1970 een nest in een konijnehol in Midden Heerenduinen, IJmuiden (H. Hogendorp en P. J. Kok).

Volgens de Nederlandse Vogels schijnt dit wel een enkele maal geconstateerd te zijn; voor zover mij bekend is dit echter de eerste keer in Nederland.

Koekoek *Cuculus canorus* gevoerd door Winterkoning.

Mej. L. G. Groen schrijft mij als volgt:

30 augustus 1970 Vlieland, Bomenland. Ik hoorde in een dicht stuk loofbos een frequent en doordringend piepen (p.m. 100 x per minuut). Ik ben op het geluid afgegaan en zag een jonge Koekoek, die om voedsel bedelde. Hij had al de grootte van een volwassen Koekoek: borst en onderdelen dwars grijs/wit gestreept, vleugels en uitgespreide handpennen bruin met wat oranje-achtige stippen, grijze kop, grote rode mond, lange staart met iets wit aan de zijkanten, verder donker. Hij werd gevoerd door een Winterkoning, die op een iets hoger gelegen tak ging zitten. Dan veranderde het doordringend gepiep in een snel ie-ie-ie-ie met trilvleugelbewegingen. De Koekoek vloog telkens de pleegouder tegemoet. Door die herhaalde verplaatsingen kon ik niet waarnemen of er één of twee pleegouders voerden. Soms bleef de Koekoek even op een vaste plaats zitten en dan kwam zo'n Winterkoning recht op hem afvliegen en ging weer op een iets hoger gelegen takje zitten voeren.

Broedt de Houtsnip *Scolopax rusticola* ook wel vanaf het eerste ei?

Ik ontving een drie-legsel van de Houtsnip, verzameld op 31 mei 1971.