

KORTE MEDEDELINGEN

SHORT COMMUNICATIONS

PHYLLOSCOPUS BONELLI BONELLI IN NEDERLAND GEVANGENBonelli's warbler *Phylloscopus bonelli bonelli* caught in the Netherlands

K. H. VOOUS

Op 5 september 1969 werd door Dr. J. A. Smits (Hilversum) in de bosjes achter de eendenkooi op Schiermonnikoog een Bergfluiters *Phylloscopus bonelli* gevangen, geringd en weer vrij gelaten (ring Vogeltrekstation Arnhem S 400126). De gevangen vogel werd mede door enkele ornithologen van het Vogelwerkkamp van het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit (o.a. G. Boere, J. Buker, E. Nieboer, E. Osieck) bekeken, gefotografeerd, gemeten en de determinatie bevestigd. De volgende gegevens werden vastgesteld:

Gewicht $7\frac{1}{2}$ gram (onderhuids vet alleen rond de cloaca). Vleugel 63, staart $47\frac{1}{2}$ mm.

Iris donkerbruin; bovensnavel hoornkleurig grijs met lichte snijrand; ondersnavel licht rose met witte snijrand; poten hoornkleurig.

Geen rui van kleine veren of pennen; de slagpennen waren gesleten, de staartpennen waren niet gaafrandig, maar gebruikt.

Op grond van de kleine vleugelmaat (die als balg-maat beneden de 63 mm zou komen te liggen), kan besloten worden dat deze vangst de ondersoort *P. bonelli bonelli* (Vieillot) betreft. Hiermede is de eerste subspecifieke determinatie van een in Nederland vastgestelde Bergfluiters mogelijk geworden. Tot nu toe vermeldde de „Avifauna van Nederland” (2e druk, 1970: 82) sinds 1958 acht gevallen zonder zich over de ondersoort te kunnen uitspreken.

C.N.A.: Bevestigde waarneming.

SUMMARY

Record of a specimen of Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli* caught 5 September 1969 by Dr. J. A. Smits on the island of Schiermonnikoog, Netherlands. The relatively small measurements of the living bird (wing 63, tail $47\frac{1}{2}$ mm) indicate that the bird belongs to the western subspecies *P. b. bonelli*. Up to now all eight Netherlands records of the Bonelli's Warbler had to remain without subspecific identification.

Adres: Biologisch Laboratorium, Vrije Universiteit, Amsterdam.

AFWIJKENDE POPULATIE KOOLMEZEN

An abnormal population of Great Tits

K. H. VOOUS

Reeds enkele jaren lang worden door Dr. J. A. Smits te Hilversum bij zijn routine-ringwerk regelmatig Koolmezen gevangen, die hem opvielen door hun bleke verenkleed. Het waren zowel mannetjes als vrouwtjes, zowel meerjarige als jonge vogels, zodat bij hem al spoedig de gedachte uitging naar de aanwezigheid van een afwijkend kenmerk in een overigens normale Koolmezen-