

de nek geel. Een lichtbruine wenkbrauwstreep liep tot in de nek en midden op de kruin was een vage, alleen in goed licht te onderscheiden, iets lichtere lengtestreep zichtbaar. Bij het opstrijken van de veertjes op de voorkop en de oorstreek kwam zwart te voorschijn.

De rug was donker kastanjebruin, getekend met enig beige en zwart. De stuit was donkerbruin.

De vleugeldekveren waren kastanjebruin met zwart en beige, de grote en kleine slagpennen zwartbruin. Het voorste deel van de vleugel had een grote, witte vlek, die vooral ook in de vlucht erg opviel en daarachter was een veel smallere, lichte, beige vleugelstreep te zien. In de witte vleugelvlek kwamen enkele lichtgele veertjes voor. De staartveren waren zwartbruin met op de buitenste pennen een schuine, diagonaal verlopende, brede, witte streep, grotendeels op de binnenvlag. De op één na buitenste staartpennen hadden een klein wit vlekje aan het eind.

De poten waren licht, enigszins vleeskleurig bruin. Van de rechterpoot ontbrak de gehele tarsus. De lengte van de vleugel bedroeg 76 mm, het gewicht was 19 gram. De vogel werd geringd (ring Vogeltrekstation Arnhem B 235171) en daarna losgelaten. Hij leek in goede conditie te zijn; het verenkleed was niet afgesleten.

De Wilgengors is broedvogel o.a. van Oost-Finland (onregelmatig), Europees Rusland en Siberië. Dat de soort meer op de trek in West-Europa voorkomt, blijkt uit een waarneming van mei 1969, gedaan door de eerste auteur samen met Mr. J. Kist op een terrein in de buurt van Ganges (Zuid-Frankrijk). De Avifauna van Nederland 1970 p. 89 vermeldt één vondst (10—11 september 1963 Lichtschip Noord-Hinder, Limosa 37: 317) en één onbevestigde waarneming (26 augustus 1962 Oostelijk Flevoland, Limosa 37: 53). Dit is dus de tweede bevestigde waarneming sinds 1900.

C.N.A.: Bevestigde waarneming.

#### SUMMARY

On 27th October 1971 a specimen of male Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola* was trapped at the Vogelringstation Meyendel near Wassenaar, the Netherlands. The bird was ringed and released. This is the second confirmed record of the species since 1900.

Adres: Van Kijfhoeklaan 114, Den Haag.

#### BROEDGEVAL VAN EEN SIJS *CARDUELIS SPINUS* IN HET GOOI

Breeding case of the Siskin *Carduelis spinus*

D. A. JONKERS

Op 13 juli 1971 deelde de heer N. Verlaat mij mee, dat hij op het terrein van de boomkwekerij Jurrissen te Naarden het broeden van een Sijs *Carduelis spinus* had vastgesteld. Hij had al enkele weken Sijzen gehoord en

gezien, maar realiseerde zich pas dat zij wel eens op de kwekerij zouden kunnen broeden, toen hij de vogels met voer zag. Nadat hij het nest had gevonden, stelde hij de heer G. Buhr hiervan in kennis, die op zijn beurt mij op de nestvondst attendeerde.

De boomkwekerij is ongeveer 5 hectare groot en grenst onmiddellijk aan de druk bereiden spoorlijn van het Gooi naar Amsterdam. Verder wordt hij ingeklemd tussen de bebouwing van Naarden en het Naardermeer. Er worden voornamelijk coniferen geteeld, die geen van alle de hoogte van vijf meter overschrijden; onderbegroeiing is niet aanwezig. Tot laat in het voorjaar worden hier Sijsen gezien, die in de elzen van het Naardermeer en het Laegieskamp foerageren.

Het nest was gebouwd in een ongeveer  $3\frac{1}{2}$  meter hoge *Gammacyprus Gammacyprus lawsonia sterwartii*, die op een veertig meter afstand van de spoorlijn stond en zat op een hoogte van  $1\frac{1}{2}$  meter tussen twee zijtakken dicht bij de stam. Een opmerkelijk lage plaats voor een vogel, waarvan veelal wordt vermeld, dat het nest zich goed verborgen van hoog tot zeer hoog in het naalddhout bevindt.

Bij mijn nadering bevond het vrouwtje zich op het nest. Na enkele minuten vloog zij weg en waren de vijf, ongeveer zeven dagen oude jongen te zien, die door mij werden geringd. Als bouw materiaal waren fijne takjes en plantendelen gebruikt; de voering bestond uit haar, dat vermoedelijk afkomstig is van in de buurt grazende pony's. Circa tien minuten later kwamen zowel het mannetje als het vrouwtje met voer aanvliegen, waarbij het mannetje de karakteristieke roep liet horen. De Sijs is een zeldzame broedvogel, zie Avifauna van Nederland II: 92, en het is de eerste maal, dat het broeden van de Sijs in het Gooi werd vastgesteld.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

#### SUMMARY

On July 13nd, 1971 there was a breeding-case of the Siskin in Naarden, Province of Noord-Holland on a tree nursery in the surroundings of the nature reserve the Naardermeer. The nest was build in a *Gammacyprus Gammacyprus lawsonia sterwartii*.

Adres: Engelsjan 21, Laren N.H.

#### VERMOEDELIIK BROEDGEVAL VAN DE BONTE STRANDLOPER, *CALIDRIS ALPINA*, IN OOSTELIIK FLEVOLAND

Possible breeding case of Dunlin in Oostelijk Flevoland

W. J. A. SCHIPPER

Bij een bezoek aan een temidden van rietvelden liggende, schaars met mossen en lage kruiden begroeide zandvlakte in Oostelijk Flevoland op 24 juni 1971, werd mijn aandacht getrokken door de temidden van alarmerende Kleine Plevieren en Strandplevieren voortdurend klinkende alarm-