

gezien, maar realiseerde zich pas dat zij wel eens op de kwekerij zouden kunnen broeden, toen hij de vogels met voer zag. Nadat hij het nest had gevonden, stelde hij de heer G. Buhr hiervan in kennis, die op zijn beurt mij op de nestvondst attendeerde.

De boomkwekerij is ongeveer 5 hectare groot en grenst onmiddellijk aan de druk bereiden spoorlijn van het Gooi naar Amsterdam. Verder wordt hij ingeklemd tussen de bebouwing van Naarden en het Naardermeer. Er worden voornamelijk coniferen geteeld, die geen van alle de hoogte van vijf meter overschrijden; onderbegroeiing is niet aanwezig. Tot laat in het voorjaar worden hier Sijsen gezien, die in de elzen van het Naardermeer en het Laegieskamp foerageren.

Het nest was gebouwd in een ongeveer $3\frac{1}{2}$ meter hoge *Gammacyprus lawsonia sterwartii*, die op een veertig meter afstand van de spoorlijn stond en zat op een hoogte van $1\frac{1}{2}$ meter tussen twee zijtakken dicht bij de stam. Een opmerkelijk lage plaats voor een vogel, waarvan veelal wordt vermeld, dat het nest zich goed verborgen van hoog tot zeer hoog in het naalddhout bevindt.

Bij mijn nadering bevond het vrouwtje zich op het nest. Na enkele minuten vloog zij weg en waren de vijf, ongeveer zeven dagen oude jongen te zien, die door mij werden geringd. Als bouw materiaal waren fijne takjes en plantendelen gebruikt; de voering bestond uit haar, dat vermoedelijk afkomstig is van in de buurt grazende pony's. Circa tien minuten later kwamen zowel het mannetje als het vrouwtje met voer aanvliegen, waarbij het mannetje de karakteristieke roep liet horen. De Sijs is een zeldzame broedvogel, zie Avifauna van Nederland II: 92, en het is de eerste maal, dat het broeden van de Sijs in het Gooi werd vastgesteld.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

SUMMARY

On July 13nd, 1971 there was a breeding-case of the Siskin in Naarden, Province of Noord-Holland on a tree nursery in the surroundings of the nature reserve the Naardermeer. The nest was build in a *Gammacyprus lawsonia sterwartii*.

Adres: Engelsjan 21, Laren N.H.

VERMOEDELIJK BROEDGEVAL VAN DE BONTE STRANDLOPER, *CALIDRIS ALPINA*, IN OOSTELIJK FLEVOLAND

Possible breeding case of Dunlin in Oostelijk Flevoland

W. J. A. SCHIPPER

Bij een bezoek aan een temidden van rietvelden liggende, schaars met mossen en lage kruiden begroeide zandvlakte in Oostelijk Flevoland op 24 juni 1971, werd mijn aandacht getrokken door de temidden van alarmerende Kleine Plevieren en Strandplevieren voortdurend klinkende alarm-

roep van een Bonte Strandloper, *Calidris alpina*, in prachtkleed. De vogel vloog daarbij steeds vrij laag om mij heen. Onder het verder lopen raakte ik de vogel ineens kwijt. Op 29 juni, bij een volgend bezoek aan dezelfde zandvlakte, ontdekte ik, gespitst op zijn aanwezigheid, op ca. 100 m afstand van de plek van 24 juni wederom een Bonte Strandloper in prachtkleed op korte afstand voor mij, staartwippend op een kleine verhevenheid in het zandterrein. Bij mijn nadering vloog de vogel op en bleef alarmerend om mij heen vliegen. Ook ditmaal verloor ik hem bij het verdergaan uit het oog, mede ten gevolge van de vele door elkaar vliegende en alarmerende Kleine Plevieren. en Strandplevieren.

Gezien de bovenstaande waarnemingen lijkt een broedgeval van de Bonte Strandloper op deze zandvlakte waarschijnlijk. Daar de vogel op 29 juni op geringe afstand van de plek van 24 juni werd waargenomen, en bij bezoeken op 3 en 9 juli geen Bont Strandloper meer werd gezien, lijkt het aannemelijk dat op beide waarnemingsdata in juni de vogel reeds jongen had.

Adres: De Morinel 54, Dronten.

WAARNEMING VAN DRIE BALKAN GELE KWIKSTAARTEN *MOTACILLA FLAVA FELDEGG* BIJ SAS VAN GENT (Z.VL.)

Observation of three black-headed Wagtails *Motacilla flava feldegg* near
Sas van Gent (Z.VL.)

J. J. VAN DEN STEEN

Op zaterdag 8 mei 1971 rond 8.30 uur betrad de auteur, in gezelschap van de heer J. Verloove, leraar biologie, het kreekweidestrand van de Canisvlietse kreek nabij Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen. Het was nagenoeg windstil (windkracht 1 uit Zuid-Oost), zonneschijn en een temperatuur van 20° later oplopend tot 24°.

Voormeld kreekweidestrand (blauwgrasland) las er drassig bij (het had van 4 tot 8 uur met tussenpozen gemotregend, waarna de zon doorbrak). Er liep op ongeveer 30 meter een vijftal koeien op de weide, die op het ogenblik dat we de weide betraden, naar ons toekwamen. Bij dit vee liep een viertal kwikstaarten die we beiden, elk met kijker 7×50 , bekeken. Wij stelden onmiddellijk vast, dat het hier niet om de vrij algemeen voorkomende Gele Kwikstaart *M. f. flava* ging. Naarmate het vee naderde kwamen ook de kwikstaarten roepend dichterbij en toen het vee nagenoeg naast ons stond waren de vogels op ± 12 meter van ons af. Ze waren niet schuw. Wij stonden doodstil met onze kijkers — zon in de rug — de vier vogels te observeren. De volgende kenmerken sprongen bij drie der vogels onmiddellijk in het oog: mooie zwarte kopkap (het zwart is te vergelijken met de kleur van de kop van de meerkoet in broedkleed — fluweelzwart), welke tot onder het oog en tot vrij ver achter in de nek reikte, en zeer mooie intensief gele onderzijde, borst, keel en kin, welke onmiddellijk aan het zwart van de kopkap aan-