

Beuk *Fagus sylvatica* lokaal een groot deel van de opstand uitmaakte; voorts waren de volgende soorten voornamelijk aanwezig: Inlandse Eik *Quercus robur*, Douglas Spar *Pseudotsuga taxifolia*, Corsicaanse Den *Pinus nigra corsicana* en Fijnspar *Picea abies*.

Opgemerkt zij nog, dat de nestboom een hoogte had van ongeveer 8 m en dat de maximale afmetingen rondom de elipsvormige nestingang $8\frac{1}{2}$ cm (verticaal) $\times$ $6\frac{1}{2}$ cm (horizontaal) bedroegen.

Een gelijksoortig geval van een laaggeplaatste nestingang van een Grote Bonte Specht constateerde ik op 13 juni 1960 op de „Gorsselse Heide” te Eefde; hierbij bedroeg de hoogte van de nestingang 90 cm, terwijl het nest zich in een Berk *Betula sp.* bevond.

R. RENSE.

VROEGE BROEDSELS VAN DE EIDEREEND *SOMATERIA MOLLISIMA*

Op 26 april 1970 bij de Zuiderduintjes op Rottummeroog een nest met 3 eieren (E. C. Smith), op 27 april op Vlieland nest met 2 eieren en op 8/9 mei, ook op Vlieland, 7 nesten w.o. 3 met 5 eieren (A. Hoogerwerf). Inderdaad vroeg. Ned. Vogels: „vanaf het midden van mei”; Jourdain in British Birds: „From mid-May to June, often not till June in N. Scotland”. H.

Adres: Insulindeweg 31, Delft.
