

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1972
(EN EERDER)

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Scholekster *Haematopus ostralegus* broedend op een plat dak.

In Vogeljaar nr. 20 p. 161 wordt melding gemaakt van het broeden van een Scholekster in juni 1971 op een plat dak te Amstelveen; één pullus, naar schatting een week oud, is doodgefallen. Eenzelfde geval heeft zich voorgedaan in mei 1964 op een schooldak in Den Haag. Men vraagt zich af waar en op welke afstand de vogels hun voedsel zochten. H.

Zeer vroeg ei van de Kievit *Vanellus vanellus*.

In het Natuurhistorisch Maandblad uit Limburg stond een mededeling over een zeer vroeg legsel, of beter gezegd één ei, van de Kievit. Ik heb mij hierover in verbinding gesteld met de vinder, de heer A. W. P. Maassen te Montfort. Deze antwoordde mij als volgt: „Het nest met één ei heb ik gevonden op 28 februari 1972 op een perceel akkerland langs de Vlootbeek in de gemeente Posterholt. Het perceel was vorige herfst omgeploegd en nog niet ingezaaid. Het ei werd niet medegenomen. De derde dag na het vinden zou het nest gecontroleerd worden, maar helaas was de akker bewerkt en nest en ei verdwenen. Er waren veel Kievieten aanwezig. Hoewel de meeste later weer op trek zijn weggetrokken, zijn er toch enige paartjes tot nestelen gekomen.” De Ned. Vogels vermeldt: „vanaf tweede decade van maart, vroegste datum van het eerste ei 9 maart 1912”. H.

De Rietgors *Emberiza schoeniclus* als waardvogel van de Koekoek *Cuculus canorus*.

Op 29 juli 1972 zag ik bij Zutphen een jonge Koekoek, die door een Rietgors werd gevoerd. De juv. Koekoek (blauw-grijs type) zat op een tak van een omgewaaide knotwilg. De Koekoek heb ik gedurende ca. één uur waargenomen. Verscheidene malen heb ik gezien, dat deze gevoerd werd door een ♂ Rietgors (♀ niet gezien). De Koekoek was al vliegvlug; hij vloog enkele malen een rondje, maar ging steeds weer op dezelfde plaats zitten. J. Zijlstra.

Hoewel theoretisch de mogelijkheid bestaat, dat het Koekoeksei in een ander soort nest is gelegd en dat het jong door de Rietgors alleen werd gevoerd, meende ik deze mededeling te moeten publiceren, daar de Rietgors tot de zeldzame waardvogels behoort. In mijn publicaties in *Limosa* heb ik slechts 4 gevallen kunnen achterhalen. H.

Nog een laag geplaatst nest van de Grote Bonte Specht *Dendrocopos major*.

Naar aanleiding van de publicatie in *Limosa* 45 p. 97 1972 deelde de heer A. Smit mij mede, dat hij in 1972 ook een dergelijk laag geplaatst nest

had gevonden, dicht langs de drukke Elspeterweg bij de legerplaats Nunspeet. Het bevond zich in een eik op 104 cm hoogte. Op 24 mei waren er jongen. Het ♀ (het ♂ liet verstek gaan) fourageerde van de overkant van deze weg en vloog telkens zeer laag naar het nest. Dit heeft het ♀ waarschijnlijk het leven gekost, want op 25 mei lag het dood, nog warm, op de weg. H.

Sterk afwijkend legsel van de Scholekster *Haematopus ostralegus*.

Dank zij de bemiddeling van de heer M. de Jong ben ik in bezit gekomen van een sterk afwijkend legsel. Het legsel was gevonden door Mr. J. A. de Vries in de eerste helft van juni 1971 bij Heerenveen/Oranjewoud, waarbij de vinder de vogel op het nest heeft waargenomen. Enkele dagen later bleek het nest verlaten te zijn. De ondergrond is grijs/leemkleurig, getekend met enkele kleine zwarte puntjes en vlekjes. Normaal is een helder leem- tot zandkleurige ondergrond met grotere bruinzwarte of roodbruine vlekken. Maten gem. 55.2 x 38.1 cm, gewicht 2,8 g. De maten zijn normaal, het gewicht iets aan de lichte kant. Mijn formule voor 100 Ned. eieren luidde 3.2 (1.78—3.7) g. H.

Adres: Insulindeweg 31, Delft.