

VANGST VAN EEN SIBERISCHE GESTREEPTE STRANDLOPER  
*CALIDRIS ACUMINATA* IN MONSTER

Sharp-Tailed Sandpiper *Calidris acuminata* trapped and ringed in Monster.

NORMAN D. VAN SWELM, DICK J. G. BRAND en JAN VAN DER STRAATEN

Tijdens werkzaamheden in het kader van het Vogelpopulatie-Onderzoek Ockenrode werd op de avond van 4 september 1972 een Siberische Gestreepte Strandloper *Calidris acuminata* gevangen en geringd.

De vogel hield zich op in een drinkwaterreservoir in de Westlandse duinen, gemeente Monster, en was vergezeld van drie Kleine Strandlopers *Calidris minuta*. Hij werd voor het eerst gezien en gehoord tegen de schemering, maar kon toen niet gedetermineerd worden. Later om ongeveer 23.30 uur werd hij tezamen met een Kleine Strandloper gevangen.

Ten tijde van de vangst waren de weersomstandigheden als volgt: bewolking 8, wind N.O. kracht 2 à 3, temperatuur 16°C. In de periode vanaf 26 augustus voorafgaande aan de vangst was de wind voortdurend oostelijk.

Beschrijving: zwarte, relatief korte, snavel; recht maar aan de punt zeer flauw gebogen (in het veld niet zichtbaar). Oog donkerbruin. Oogring wit. Kruin roodbruin met zwarte puntjes. Lichte wenkbrauwstreep. Teugel, oorstreek, wangen en nek lichtbruin/isabel met fijne donkere streepjes. Keel wit. Borst isabelkleurig met zwarte spikkels met name aan de zijkant dicht open, niet middenonder waar een geleidelijke overgang naar het wit van de buik waarneembaar was. De borsttekening vertoonde enige overeenkomst met die van de Zanglijster *Turdus philomelos*. Buik, onderstaartdekveren, okselveren en ondervleugel wit. Poten donkergroen. De veren van de rug en schouder hadden een donker centraal gedeelte met roodbruine en witte randen. Het geheel maakte een geschubde indruk (geen V op de rug als bij juv. Kleine Strandloper). De bovenzijde van de vleugel was donkerbruin met een zeer smalle witte vleugelstreep, gevormd door de uiteinden van de vleugeldekveren, die tot aan de basis van de laatste grote slagpennen doorliep. Onderrug en stuit zwartbruin. Stuitzijden wit. De vrij sterk verlengde, middelste staartpennen waren bruinzwart. De overige staartpennen lichtgrijs als bij Kleine Strandloper. De staartpennen waren aan de top voorzien van een smal wit randje. De staart maakte, indien ingeklapt, een pijlvormige indruk. Geluid: een vrij zacht „pliep, pliep”. Het kleed van dit ex. kwam sterk overeen met het kleed van een in mei 1906 te Shanghai, China, geschoten ex. dat aanwezig is in de collectie van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden.

Dit is het tweede geval voor Nederland. Sinds de publikatie van Marra (1970) is nog een geval voor Europa bekend geworden. Op 7 juli 1970 werden twee ex. waargenomen in de omgeving van Dovre, Noorwegen. Een van de vogels vertoonde broedgedrag, maar een broedgeval kon niet vastgesteld worden.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

## SUMMARY

On the 4th September 1972 a Sharp-Tailed Sandpiper *Calidris acuminata* was trapped and ringed in the Westland Dunes, south of The Hague (at 52.01 N 04.09 E) in the province of Zuid-Holland. This is the 2nd record for The Netherlands.

## LITERATUUR

- Bauer, Carl-Axel och Berith Persson (1971): Spetstjärtad Snäppa, *Calidris acuminata* funnen i Norge. *Sterna* 10: 57—62.  
Hollom, P. A. D. (1960): Popular Handbook of rarer British Birds.  
Marra, N., J. M. Marra en N. Marra Jr. (1970): De Siberische Gestreepte Strandloper (*Calidris acuminata*) nieuw voor Nederland. *Limosa* 43: 132—135.  
Uspenski, Dr. S. M. (1969): Die Strandläufer Eurasiens 61—64.

Adres: Woudenbergstraat 125, Den Haag. Publikatie Vogelpopulatie-Onderzoek Ockenrode.

---

WAARNEMING VAN TEREK RUITER *TRINGA TEREK* BIJ HOOFD-  
PLAAT (Z. VL.)

Observation of a Terek Sandpiper *Tringa terek* near Hoofdplaat (Z.VL.)

D. A. JONKERS, TH. A. RENSSSEN

Op 31 oktober 1972 namen wij op een zandplaatje aan de rand van een schor bij Hoofdplaat, 8 kilometer ten oosten van Breskens, een vogel waar, die onmiddellijk opviel door zijn omhooggebogen snavel. Tweede auteur had de vogel zien komen aanvliegen, waarbij hem de donkere vleugels met witachtige eindrand, die contrasteerden met de rest van het lichaam dat wit gekleurd was, opvielen.

De weersomstandigheden op die dag waren goed; er was een matige Z.O.-Z. wind bij een temperatuur van 10°C en een bewolkte hemel met helder zicht. Waarnemingstijd: 11.20 uur. Afstand ongeveer 90 m. Onze kijkersterktes: 7 x 50, 10 x 50, 16 x 50 en een telescoop 40 x 60. Wij maakten van deze vogel de volgende beschrijving: foerageert solitair in een ondiep plasje met in de omgeving — op enkele meters afstand — Bonte Strandlopers, een Steenloper en Tureluurs.

Opvallende ca. 6 cm lange grauwwarte snavel, die enigszins aan een Kluut doet denken, maar waarvan de welving veel flauwer loopt. Bij het foerageren wordt af en toe een licht maaiende beweging gemaakt; de steekbewegingen die bij het schokkende verlopende foerageren worden gemaakt, overheersen.

De kop, nek en zijkant van de hals zijn grauwwit, de vleugels donkergrijs met een bruine gloed. Onderzijde lichaam wit, poten grijs gekleurd met een zweem van geel. Grootte: kleiner dan Tureluur, doch groter dan Bonte Strandloper. Na enkele minuten verdween de vogel al foeragerend achter de begroeiing.

Omdat wij geen roep hadden gehoord en nogmaals het vliegbeeld wilden zien, besloten wij de vogel te benaderen. Op de plaats gekomen waar deze