

Zwarte Stern en Kokmeeuw in Krabbescheer-velden, wel een totaal andere omgeving dan in de Lauwerszeepolder. Wel nestelden er in het gebied, waar het Dwergmeeuwe-nest lag, enkele tientallen paartjes Kokmeeuwen en enkele paartjes Kluten.

Om eventuele verstoring te vermijden hebben we niet verder gezocht naar andere Dwergmeeuwe-nesten, evenmin hebben we later het nest weer opgezocht. Het viel ons alleen op, dat de Dwergmeeuwen na veertien dagen uit de omgeving van ons proefterrein verdwenen waren.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

Adres: J. Meijer, Herestraat 56, Grijskerk 8058.

BEOBACHTUNG EINER ZWERG GANS *ANSER ERYTHROPUS* AUF TEXEL

WAARNEMING VAN EEN DWERG GANS *ANSER ERYTHROPUS* OP TEXEL

Observation of al lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* at Texel

B. WARTMANN, W. SUTER, J. BÜHLMANN und A. SUTTER

Während eines dreiwöchigen Aufenthaltes im Frühjahr 1972 auf der Insel Texel beobachteten wir am Morgen des 5. April im Reservat „De Schorren“ neben den zahlreichen Ringelgänsen *Branta bernicla*, die bei aufkommender Flut gerade auf dem Wasser schwammen, auch eine Zwerggans *Anser erythropus*. Wir konnten die Zwerggans, die sich eng an die Ringelgänse assoziiert hatte, während des ganzen Tages im Gebiet beobachten. Mit steigender Flut flog sie mit einem Trupp Ringelgänsen auf die angrenzenden Weiden, wo sie gemeinsam mit ihnen graste. Auffällig war, dass sie sich immer eher am Rand des einige hundert Gänse umfassenden Trupps aufhielt. Im Flug fiel sie neben der geringen Grösse besonders dadurch auf, dass sie nicht alle Flugmanöver der anderen Gänse mitmachte, bei der Landung gesellte sie sich jedoch sogleich wieder zu ihnen. Gegen Abend schliesslich befand sich die Zwerggans relativ nahe auf dem jetzt freien Watt. Nun hatten wir nochmals die Möglichkeit, alle Kennzeichen zu überprüfen. An dieser Stelle sei festgehalten, dass sich die „Commissie voor de Nederlandse Avifauna“ mit unserer Identifikation einverstanden erklärt hat.

Unsere Beobachtung erscheint uns aus dreierlei Gründen bemerkenswert: Erstens handelt es sich um die Erstbeobachtung für Texel; zweitens ist der 5. April das späteste Beobachtungsdatum einer Zwerggans für die Niederlande; nach Angaben des Vogelwarts soll sich die Gans noch am 8. am gleichen Ort aufgehalten haben, was wir aber nicht bestätigen konnten. Drittens fällt am beobachteten Exemplar die Assoziierung an die Ringelgänse auf; im „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ wird unter Sozialverhalten

der Zwerggans nur auf gelegentlich enge Bindung an *Anser* sp. hingewiesen, die Assoziierung an *Branta bernicla* scheint eine Ausnahme zu sein.

LITERATUUR

- Bauer, K. & U. Glutz von Blotzheim. 2, 1968. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Akad. Verl. ges., Frankfurt.
 Kist, J. & K. H. Voous. 1970. Avifauna van Nederland. Brill, Leiden.
 Van Orden, Ch. & A. J. Dijkzen. 1967. De Vogels van Texel. Texelse Museumvereniging, Texel.

Adresse: Beat Wartmann. Paradiesstrasse 24. CH-8802 Kilchberg, Schweiz.

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1973 (EN EERDER)

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Auto-verkeer en broedresultaten.

De Delftse Vogelwacht is zeer actief, ook wat betreft het ophangen van vogelkasten. Ook aan de Insulindeweg, waar ik woon, waren in hoge wilgen een aantal kasten opgehangen. Deze werden regelmatig door Kool- en Pimpelmezen betrokken en in het begin met redelijk resultaat. In de laatste jaren werden er wel nesten gemaakt en eieren gelegd, doch de jongen gingen regelmatig dood, waarvan de oorzaak werd gezocht in de benzine-dampen van deze drukke verkeersweg. Ook in mijn voortuin had ik een kastje opgehangen. Vóór 1972 zijn daaruit jongen van de Koolmees uitgevlogen. In 1972 lagen hierin twee achtereenvolgende nesten met eieren van Koolmezen. In beide gevallen gingen de jonge vogels dood. In april 1973 waren er weer eieren, maar ook nu gingen de jongen dood. In juni wederom een nest met eieren, waarvan de jongen begin juli zijn uitgevlogen. Nu komt het eigenaardige. Vanaf begin mei is de straat voor een groot gedeelte opgebroken en het auto-verkeer praktisch stilgelegd. Het kan natuurlijk toeval zijn, doch het is niet onwaarschijnlijk dat de benzine-dampen de eigenlijke oorzaak zijn geweest van de slechte resultaten in de jaren vóór de opbrekerij, hetzij rechtstreeks, hetzij door gebrek aan insecten tengevolge van die dampen. H.

Abnormale broedplaats van de Staartmees *Aegithalos caudatus*.

In het Vogeljaar 21 p. 432 wordt melding gemaakt van de bouw van een nest in een Spechtehol in de Kennemerduinen. Over de broedresultaten werd (nog) niets vermeld. Berichtgever A. E. Leutscher. H.

Merel *Turdus merula* bouwt 23 nesten.

Over de bouw van 23 nesten door een Merel wordt verwezen naar een artikel van M. de Jong in de courant de Noord-Oost Polder van 8 mei 1973 (ook Vogeljaar 21 (4) 421.