

de ganzen de helling af te dalen waarbij ze echter wel gezicht hielden op de situatie. Opmerkelijk was de bijna automatische wijze waarop de ganzen bij het naderen van auto's zich terugtrokken in de berm en hoe schijnbaar onverschillig de vogels de auto's op korte afstand — 10 à 15 meter — lieten passeren (Fig. 1).



Fig. 1. Fouragerende Rotganzen langs een snelweg.
Fig. 1. Grazing Brent Geese along a highway.

SUMMARY

In January—March 1974 a small flock of Brent Geese *Branta bernicla* frequently grazed in the berm of the highway on the eastern Grevelingendam between Oude Tonge and Bruinisse in the province of Zeeland. The geese were not disturbed by the busy traffic that passed them at a distance of 10—15 meters.

Adres: Kilstraat 22, Maasdam.

PLAATSTROUW BIJ EEN ALBINO SCHOLEKSTER *HAEMATOPUS OSTRALEGUS* L. OP VLIELAND

An albinistic specimen of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus* L. at Vlieland

A. HOOGERWERF

Tijdens een in het laatst van april 1972 aan Vlieland gebracht bezoek werd op de steenglooiing langs het wad tussen "Lange Paal" en "Dodemansbol"

een volkomen albinistische Scholekster opgemerkt. De vogel bevond zich temidden van een grote klucht normale soortgenoten waardoor hij uiteraard direkt opviel. De volgende dag werd de waarneming herhaald, maar bij latere bezoeken aan het eiland begin juni en eind juli van dat jaar, kon de vogel niet worden ontdekt.

Op 1 juni 1973 werd hij echter op precies dezelfde plaats onder gelijke omstandigheden opnieuw gezien en op 25 juni zag ik de vogel wederom niet ver van die plaats verwijderd, t.w. op de langs de hoofdweg liggende stenen wadglooiing, circa een kilometer benoordoost "Lange Paal" ditmaal in gezelschap van slechts enkele normale Scholeksters.

En het was op bijna nauwkeurig dezelfde plek waar de vogel op 23, 24 en 25 april 1974 andermaal werd ontmoet, ook nu weer in gezelschap van twee normale exemplaren. En dit was eveneens het geval in de eerste en laatste dagen van juni en in het begin van juli van dit jaar toen waarnemingen werden gedaan op ongeveer dezelfde plaats en de vogel zich bevond in gezelschap van één of enkele normale Scholeksters.

Ofschoon het bewijs ontbreekt, dat het hier inderdaad dezelfde vogel betreft, ben ik er wel van overtuigd dat dit het geval is: het vederkleed was volkomen wit, overeenstemmend met dat van bijvoorbeeld de Koereiger, snavel en poten waren iets lichter dan het geval pleegt te zijn bij een normale Scholekster, het oog donkerder. Bovendien was de witte vogel duidelijk schuwer dan de hem vergezellende soortgenoten.

Op aanraden van de redactie van LIMOSA heb ik mij in verbinding gesteld met Drs. G. C. Boere van Staatsbosbeheer op Vlieland en met de heer A. Timmerman Sr. van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum. Eerstgenoemde deelde mij mede, dat deze vogel zich in elk geval al twee jaar op het eiland bevindt en dat hij hem dit jaar omstreeks medio juni weer voor het eerst waarnam. Verder schreef hij dat hij in het laatst van januari 1970 zulk een Scholekster heeft gezien temidden van een grote groep soortgenoten bij de Amelander Duintjes op Terschelling.

De heer Timmerman schreef, dat hij in de zestiger jaren enkele jaren achtereen een witte Scholekster in de Bantpolder op Schiermonnikoog heeft waargenomen.

Hoewel de mogelijkheid bestaat, dat het hier steeds om hetzelfde individu gaat, is dit natuurlijk geenszins zeker, omdat de vogel niet geringd is en ogenschijnlijk evenmin uiterlijke kenmerken vertoont, welke op dat punt zekerheid zouden kunnen geven.

Misschien zijn er meer recente waarnemingen bekend van de andere Wadeneilanden, welke aanwijzingen zouden kunnen vormen dat wij hier toch met meer dan één albino hebben te maken, en het is o.a. met het doel om daaromtrent meer gegevens te verkrijgen, dat het bovenstaande werd geschreven.

SUMMARY

In April 1972, June 1973, and again in April, June and July 1974 an albinistic specimen of the common Oystercatcher *Haematopus ostralegus* L. was recorded along the "wad-side" of the Dutch Waddenisland Vlieland, and almost without exception at about the same locality. Although there is no certain proof that in all these cases the same bird was involved, the similarity in plumage and in the colour of the unfeathered parts was so striking that the author is quite convinced that this indeed is the case.

During 1973 and 1974 the presence of this bird was also established by Drs. G. C. Boere, a biologist working in Vlieland, and he informed me that in the last days of January 1970 a similar Oystercatcher was seen by him in the island of Terschelling.

Mr. A. Timmerman of the Rijksinstituut voor Natuurbeheer at Leersum wrote to me having recorded an albino Oystercatcher in the sixties in the island of Schiermonnikoog.

The question whether the bird earlier seen in Schiermonnikoog and Terschelling is the same as the one now present in Vlieland must remain unanswered since the bird is not banded and apparently shows no other characters to prove it.

Adres: Bakkum (N.H.), P. C. Hoofstraat 8.