

SUMMARY

On 29 July 1973, six-Bee-eaters have been recorded in the Amsterdamse Waterleiding-duinen. The birds have been observed for about three quarters of an hour. During this time the observers came to the conclusion, that the group of birds consisted of two adults, one juvenile, and three birds were probably moulting. If the group of Bee-eaters consisted of two adults and their young, there remains the question where the birds have bred. Up to 1972 there have been published 12 confirmed records and two breeding-cases for the Netherlands.

LITERATUUR

Tekke, M. J., Ornithologie van Nederland 1972. Limosa 47: pag. 43.

Adres: Kinderdijkstraat 8—2, Amsterdam-1010.

WAARNEMING VAN EEN ♂ WITRUGSPECHT *DENDROCOPOS*
LEUCOTOS BIJ OVERVEEN (N.H.)

Observation of a White-backed Woodpecker near Overveen

T. M. VAN SPANJE

Op 18 november 1972 bezocht ik in de middag het landgoed Lindenheuvel te Overveen. Het landgoed bestaat uit een sterk heuvelachtig terrein aan de binnenduinrand, bedekt met een verwaarloosd oud loofbos (Linde, Iep, Beuk en Eik) gemengd met groepen Thuja's en Grove Dennen, op de open plekken een verlaten villa, koetshuis en kwekerij. Het ligt geheel omgeven door overeenkomstig gevarieerd bos van de andere landgoederen in de gemeente Bloemendaal.

Het was mooi weer met een zwakke tot matige wind en helder zicht. Tijdens de wandeling viel het vreemde gedrag op van een Bonte Specht, die op enige afstand fourageerde op Beuken. De vogel zat dwars op horizontale takjes (doorsnede $\pm 2-5$ cm) en sprong rusteloos van tak naar tak, zonder op de stam van de Beuk te gaan zitten. Bij het fourageren balanceerde de vogel met de staart. Het dier verplaatste zich niet over grote afstand; hoogstens vloog hij naar een naburige Beuk om verder te zoeken. Eenmaal slechts werd gezien dat de vogel zich verticaal tegen een stam drukte, n.l. toen hij een Grove Den bezocht. Het dier fourageerde hier echter niet en vloog bijna direct weer door naar de horizontale takken van een Beuk. Eenmaal in het kijkerbeeld (12×60), viel het ontbreken van witte schoudervlekken onmiddellijk op. De vleugels vertoonden wel een aantal dwarsstrepen, welke uitkwamen in een witte vlek midden op de rug. Tijdens het fourageren was deze vlek zeer opvallend zichtbaar. De vogel werd gedurende 10 min. van circa 30 meter afstand waargenomen, en hoewel ik geen veldgids bij mij had wist ik bijna zeker dat het een Witrugspecht was. Bekend met de zeldzaamheid van de soort werd ter plaatse de volgende beschrijving gemaakt:

Forser dan de Grote Bonte Specht. Gehele kruin helderrood, op een wit voorhoofd na, zoals bij de Middelste Bonte Specht. De opvallende zwarte gaffelvormige tekening op de wang en zijborst raakte het zwart van achterhals en mantel niet. Weinig rood op onderbuik en onderstaart, moeilijk te zien. De vogel riep niet.

Na het waarschuwen van een kennis werd de vogel, een half uur later, niet meer teruggevonden.

Onderstaande literatuur overtuigde mij van de juistheid van de determinatie.

C.N.A.: Deze waarneming wordt beschouwd als een onbevestigde waarneming van een nieuwe soort voor Nederland.

SUMMARY

On November 18, 1972 a ♂ White-backed Woodpecker *Dendrocopos leucotos* was observed in a wood near the dunes at Overveen (province Noord-Holland). The attention of the observer was drawn by the peculiar and characteristic posture of the foraging bird, which perched on horizontal branches of beeches rather than on the trunk. The record was accepted as a non-confirmed observation of a new species for the Netherlands.

LITERATUUR

- Andersson, Å. *et al.* 1972. Vitryggiga hackspetten *Dendrocopos leucotos* i Östergötland. Vår Fågelvärld 31: 257—262.
Dement'ev, G. P. *et al.* 1966. Birds of the Soviet Union I.
Niethammer, G. 1938. Handbuch der Deutschen Vogelkunde II.
Adres: Kruisstraat 17 rood, Haarlem.