

KORTE MEDEDELINGEN

SHORT COMMUNICATIONS

OPNIEUW DUBBELE LEGSELS BIJ DE SCHOLEKSTER *HAEMATOPUS OSTRALEGUS*

About double clutches of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus*

A. HOOGERWERF

Nadat in 1967 en in 1968 door mij op bijna dezelfde plaats op Ameland een 6-legsel van de Scholekster werd gevonden (1968: LIMOSA 41: 113-115), werden bij een in begin juni 1974 aan Vlieland gebracht bezoek opnieuw een 5- en een 6-legsel van deze soort aangetroffen.

Op 5 juni werden nabij de Oude Kooi temidden van een veldje hoofdzakelijk begroeid met een lage heide-achtige vegetatie op een oppervlakte van circa 100 bij 50 m een 2-, een 3- en een 6-legsel van de Scholekster gevonden. Het grote aantal alarmerende vogels maakte het onmogelijk om met zekerheid vast te stellen of bij dat 6-legsel twee of drie vogels betrokken waren.

Twee dagen later werd ver van deze plaats verwijderd, t.w. in lage duintjes langs de Vliehors, een 5-legsel van een Scholekster gevonden, maar ook in dit geval maakten de meerdere ter plaatse aanwezige vogels het niet wel mogelijk zekerheid te verkrijgen ten aanzien van het aantal bij dat legsel betrokken Scholeksters.

Omdat normale legsels bij deze soort uit 3 eieren bestaan, lijkt het bijna zeker, dat ook in deze beide gevallen twee verschillende wijfjes de eieren in hetzelfde nest deponeerden.

SUMMARY

When visiting the Wadden island Ameland in 1967, on 27 May a clutch of 6 eggs was found of the Oystercatcher, *Haematopus ostralegus* and again at about the same locality on 24 May 1968 (see LIMOSA 41: 113-115).

On 5 June 1974 such a clutch was found on the Wadden island Vlieland and two days later, at quite a different locality, one containing 5 eggs. Because the normal clutch contains 3 eggs it is almost certain that two female birds deposited their eggs in the same nest in all four cases, although the presence of 3 birds was established at one occasion only (in 1968).

Adres: P. C. Hoofdstraat 8, Bakkum NH.