

OVER EEN ONGEWONE BROEDPLAATS VAN EEN HOUTDUIF *COLUMBA PALUMBUS*

G. M. v. d. MEULEN en S. BRAAKSMA

De eigenschap van de mensen om aandacht te besteden aan afwijkend gedrag, heeft er o.m. toe geleid dat er in de ornithologische literatuur al veel korte artikelen zijn verschenen die betrekking hebben op ongewone broedplaatsen van vogels, zoals over het broeden van watervogels (Fuut, Meerkoet etc.) op het land en in bomen (Waterhoen!) of over het broeden van boom- en struikbewoners op de grond (Torenvalk, Ransuil, Merel, Zanglijster, etc.).

Zelf zagen wij behalve van de voornoemde vogelsoorten o.m. bij herhaling bodemnesten van Witte Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Koolmees en Zwarte Mees en incidenteel zelfs van een Zwarte Kraai. Het broeden van Houtduiven op de grond past eveneens in deze reeks. Dit is echter inmiddels al zo'n bekend verschijnsel (zie b.v. het Vogeljaar 22, p. 569 en p. 570), dat wij er beslist niet over zouden schrijven, ware het niet dat wij op 31 mei 1974 te maken kregen met een exemplaar dat een wel zeer ongewone broedplaats had uitgekozen. Deze vogel vloog namelijk voor onze voeten op van een nest met 2 eieren in het volkomen boom- en struikvrije buitendijkse gebied langs de Dollard ter hoogte van de Carel Coenraadpolder. Het nest dat slechts enkele takjes bevatte, bevond zich temidden van een begroeiing bestaande uit Slijkgras, *Spartina townsendii*, Zeeaster, *Aster trifolium*, en Kweldergras, *Puccinellia maritima*.

Vermeldenswaardig is nog dat de eieren slechts enkele dagen tevoren waren gelegd. De vele door ons gevonden uitgespoelde eieren en verdrongen jongen van de naaste burens (= Kapmeeuwen, Kluten en Wilde eenden) bewezen duidelijk dat enkele dagen tevoren een hoog tij hier alles had overspoeld. In aansluiting hierop kan nog worden medegedeeld dat de botanicus Dr. L. E. M. Fresco ons onlangs vertelde dat hij in 1973 eveneens een legsel van een duif — vermoedelijk *Columba Palumbus* L. — heeft gevonden op de boomloze Oosterkwelder van Schiermonnikoog.

SUMMARY

On the 31st of May 1974 a Wood Pigeon flew from a nest with two eggs on the Salt-marches of the Dollard in the province of Groningen. This nest was situated on the ground in a complete tree-less surrounding. It consisted of only a few twigs between a vegetation of *Spartina townsendii*, *Aster trifolium* and *Puccinellia maritima*. The botanist Dr. L. E. M. Fresco recently told us that in 1973 he found two eggs of a pigeon — probably also *Columba palumbus* L. — on the treeless shorelands of the island of Schiermonnikoog.

Adres: Afdeling Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer, J. M. Kemperstraat 3, Utrecht.