

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1974

W. PH. J. HELLEBREKERS

Abnormaal vroeg broedsel van de Fuut *Podiceps cristatus*.

De heer W. Th. Wensinck deed mij mede dat hij op 2 maart 1974 bij Noorden (Nieuwkoop) een legsel van 4 eieren vond, welke reeds enigszins bebroed waren en dus eind februari moeten zijn gelegd. Het legsel werd door Kraaien verstoord. Enkele dagen daarna was de vogel bezig met herstel van het nest. De Ned. Vogels geeft op vanaf mei, soms eind april (H.)

Late broedsels van de Kleine Plevier *Charadrius dubius*.

Op 2 augustus 1974 vonden P. Meininger en schrijver dezes een 3-legsel in de duinen tussen Katwijk en Wassenaar en later op deze dag nog twee pas uitgekomen jongen. Het 3-legsel zou een vervanglegsel van een paar kunnen zijn, dat elders verstoord werd. A. Wassink. (Inderdaad laat, de Ned. Vogels: van midden april tot in juli) (H.)

Zes broedsels van Merel-paartje *Turdus merula* in één seizoen.

Via de heer G. Bosch ontving ik een brief van Mevr. S. Bult-Popma, Bakhuizen Fr., waarvan de inhoud, enigszins ingekort, als volgt luidt. Het speelde zich af in één groente-kas.

27 maart 1974 vlogen de eerste Merels uit (4 stuks). Drie dagen na het uitvliegen van deze jongen hadden ze weer eieren (3). Uit dit nest zijn de drie jongen uitgevlogen. De derde keer dat ze eieren hadden waren er 5 jongen, die allen uitgevlogen zijn. Half juli waren er voor de vierde maal eieren (4), die weer in hetzelfde nest lagen, ook in dit geval zijn de jongen uitgevlogen (dus totaal 16 eieren). Daarna zijn ze naar de andere kant van de kas verhuisd, waar ze een nieuw nest maakten met 3 eieren, dat door werkzaamheden verstoord werd. De vogels hebben toen weer een nieuw nest gemaakt in de tomaten met 3 eieren, waarvan de jongen zijn uitgevlogen. Hoewel de kas een goede beschutting is tegen slechte weersomstandigheden is het aantal broedsels toch abnormaal groot. Normaal is 2 à 3, soms 4 broedsels. (H.)

Adres: W. Ph. J. Hellebrekers, Insulindeweg 31, Delft.