

welk geluid mij aan mezen deed denken welke echter niet in de buurt waren. Nadat de adulte vogel was verdwenen en ik de plaats waar ik het jong gezien had naderde, kwam hij opnieuw hevig ratelende te voorschijn waarbij ik, even vóór de ratel, een geluid als „tsjoek” hoorde.

Nadat alles weer stil was geworden herhaalde zich dit een twintigtal meter verder en ik zag toen even het nerveuze wijfje met voedsel in de bek (kleine rups).

De hele waarneming duurde van 9 tot 13 uur, er was zon, weinig wind en de temperatuur was $\pm 22^{\circ}\text{C}$.

Gezien de diverse broedgevallen van deze vogel in de noordelijke provincies van België zal ook een definitief broedgeval van deze vogel in Nederland niet lang meer op zich laten wachten.

Adres: Stevensstraat 18, Sas van Gent (Z-Vl.).

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1975 (EN EERDER)

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Vroege broedsels van de Fuut *Podiceps cristatus*.

Op 11 februari 1975 bij Kortenhoeve een legsel van 4 eieren (medewaarnemer D. Spaan). Op 22 februari zag de heer IJ. Vogel twee jongen, leeftijd geschat op 10 dagen (deze waarneming heeft geen betrekking op de voorgaande mededeling), op 2 maart werden deze twee pulli ook waargenomen door de heer E. Boeve, deze schatte de leeftijd op 4 weken. De eieren zouden dan omstreeks half januari gelegd moeten zijn.

J. L. M. Bos

26 januari 1975 bij Noorden/Nieuwkoop een nest met één ei, kort daarop 4 (later slechts 2), begin februari nog een nest met één ei. Waarnemer D. Stam.

A. Hoogerwerf.

Januari 1975 bij Ankeveen nest met eieren, eerste week van februari jongen (Gooi en Eemlander van 27 maart).

Eind januari 1975 broedende Fuut bij Kortenhoeve (Gooi en Eemlander van 5 februari).

Late broedsels van het Waterhoen *Gallinula chloropus*.

Op 25 september 1974 tussen Oudegaai en Gaastmeer een exemplaar met 3 jongen van ongeveer een week oud (M. de Boer). Op 31 oktober 1974 bij Rosterhaule een nest met 4 eieren (K. Koopman). Ned. Vogels „tot in Augustus”. Beide gegevens in Vanellus 1975 p. 19.

H.

Vroege broedsels van de Meerkoet *Fulica atra*.

28 maart 1975 een broedend ex. in het Amsterdamse Bos, 29 maart nest

met minstens 3 pulli bij Sloterdijk (de eieren moeten dus begin maart gelegd zijn), 30 maart broedend in Edam, 31 maart een 6-legsel bij Sloterdijk.

M. Bakker.

12 januari 1975 in de vaart tussen Koudum en Molkwerum Fr. een paar Meerkoeten met 3 jongen, een tot twee weken oud, waarnemer G. Bosch. Leeuwarder Courant van 16 febr. H.

ABNORMAAL KLEINE EIEREN VAN STORMMEEUW *LARUS CANUS* OP TEXEL

Very small eggs of Common Gull on the island of Texel

A. J. DIJKSEN en L. J. DIJKSEN

Tijdens het ringen van jonge Stormmeeuwen tussen De Geul en De Hors en bij het Noordvlak op Texel in de zomer van 1974 werden enkele abnormaal kleine eieren van deze soort gevonden.

Bij het Noordvlak, tussen strandpaal 12 en 14, werd in 2 legsels een dergelijk ei gevonden; één van die legsels bevatte ook nog 2 eieren van normale afmetingen. Nabij De Hors werden 3 nesten met kleine eieren aangetroffen. Eén met 2 eieren en 2 met 1 ei. Slechts 1 ei werd door ons gemeten: $47,0 \times 34,6$. De niet gemeten eieren hadden ongeveer de zelfde afmetingen. Hellebrekers (1950) geeft als gemiddelde van 100 eieren van de Stormmeeuw $58,4 \times 41,3$ op, met als uitersten $53,3 - 64,8$ en $36,0 - 45,0$.

Bij de nesten bij De Hors bleek dat de kleine eieren niet bevrucht waren, d.w.z. er werden geen jongen uit geboren. Uit de andere eieren uit die legsels, eieren van waarschijnlijk normale afmetingen, die we echter niet gezien hebben, waren wel jongen geboren. De talrijke uitwerpselen en voedselresten in en in de directe omgeving van de nesten wezen daar duidelijk op.

Abnormale eieren zullen waarschijnlijk ontstaan door afwijkingen bij individuele vogels. Wij vonden echter te kleine eieren in 5 legsels in 2 kolonies. Als we daarbij bedenken dat we van de 1300 paren Stormmeeuwen op Texel slechts een zeer klein percentage (nog geen 4%) van de legsels gezien hebben, kunnen we veronderstellen dat het verschijnsel van zeer kleine eieren meer is voorgekomen. Moet men de oorzaak hiervan in de voedselsituatie van het snel groeiende Stormmeeuwenbestand zoeken?

LITERATUUR

Hellebrekers, W. Ph. J. 1950. Measurements and weights of eggs of birds on the Dutch list. E. J. Brill, Leiden.

Adres: Ruigedijk 6, De Koog, Texel.

Vijf dwergeieren van één soort op een beperkt terrein in één seizoen is hoog. Het is onbekend of dit met de voedselsituatie te maken heeft. Het zou