

met minstens 3 pulli bij Sloterdijk (de eieren moeten dus begin maart gelegd zijn), 30 maart broedend in Edam, 31 maart een 6-legsel bij Sloterdijk.

M. Bakker.

12 januari 1975 in de vaart tussen Koudum en Molkwerum Fr. een paar Meerkoeten met 3 jongen, een tot twee weken oud, waarnemer G. Bosch. Leeuwarder Courant van 16 febr. H.

ABNORMAAL KLEINE EIEREN VAN STORMMEEUW *LARUS CANUS* OP TEXEL

Very small eggs of Common Gull on the island of Texel

A. J. DIJKSEN en L. J. DIJKSEN

Tijdens het ringen van jonge Stormmeeuwen tussen De Geul en De Hors en bij het Noordvlak op Texel in de zomer van 1974 werden enkele abnormaal kleine eieren van deze soort gevonden.

Bij het Noordvlak, tussen strandpaal 12 en 14, werd in 2 legsels een dergelijk ei gevonden; één van die legsels bevatte ook nog 2 eieren van normale afmetingen. Nabij De Hors werden 3 nesten met kleine eieren aangetroffen. Eén met 2 eieren en 2 met 1 ei. Slechts 1 ei werd door ons gemeten: $47,0 \times 34,6$. De niet gemeten eieren hadden ongeveer de zelfde afmetingen. Hellebrekers (1950) geeft als gemiddelde van 100 eieren van de Stormmeeuw $58,4 \times 41,3$ op, met als uitersten $53,3 - 64,8$ en $36,0 - 45,0$.

Bij de nesten bij De Hors bleek dat de kleine eieren niet bevrucht waren, d.w.z. er werden geen jongen uit geboren. Uit de andere eieren uit die legsels, eieren van waarschijnlijk normale afmetingen, die we echter niet gezien hebben, waren wel jongen geboren. De talrijke uitwerpselen en voedselresten in en in de directe omgeving van de nesten wezen daar duidelijk op.

Abnormale eieren zullen waarschijnlijk ontstaan door afwijkingen bij individuele vogels. Wij vonden echter te kleine eieren in 5 legsels in 2 kolonies. Als we daarbij bedenken dat we van de 1300 paren Stormmeeuwen op Texel slechts een zeer klein percentage (nog geen 4%) van de legsels gezien hebben, kunnen we veronderstellen dat het verschijnsel van zeer kleine eieren meer is voorgekomen. Moet men de oorzaak hiervan in de voedselsituatie van het snel groeiende Stormmeeuwenbestand zoeken?

LITERATUUR

Hellebrekers, W. Ph. J. 1950. Measurements and weights of eggs of birds on the Dutch list. E. J. Brill, Leiden.

Adres: Ruigedijk 6, De Koog, Texel.

Vijf dwergeieren van één soort op een beperkt terrein in één seizoen is hoog. Het is onbekend of dit met de voedselsituatie te maken heeft. Het zou

van belang zijn het verschijnsel in de komende jaren te volgen en de factoren die geleid hebben tot kleine eieren te leren kennen. H.

NEDERLANDSE ORNITHOLOGISCHE UNIE, JAARVERSLAG OVER 1974

Het ledental van de Unie bedroeg gedurende het afgelopen jaar 1013, te weten 859 gewone leden (waarvan 127 tevens lid van de C.N.V.), 119 jeugdleden, 17 gezinsleden en 18 ere- en corresponderende leden. De corresponderende leden Dr. D. Lack en Mrs. M. M. Nive overleden gedurende 1974.

In het bestuur werd de heer N. Marra opgevolgd door de heer J. Philippona. Het bestuur werd tijdelijk met een lid uitgebreid in de persoon van de heer R. H. Drent.

In het voorjaar werd een commissie ingesteld, genaamd C 74, die tot taak heeft de structuur van de Unie te onderzoeken, en te adviseren over verbeteringen in de werkwijze van de Unie en de opzet van de tijdschriften. Deze commissie bracht enkele malen tussentijds rapport uit aan het bestuur en deed enkele voorlopige mededelingen aan de leden.

Er werden dit jaar drie wetenschappelijke vergaderingen gehouden. Op 27 april sprak de heer J. Rooth (De ontwikkelingen van het Flamingo-reservaat op Bonaire). Op 31 augustus waren de sprekers: de heer J. Wattel (De rui in de jaarcyclus van zeevogels), de heer E. Jansen (De vogelwereld van Aruba), en de heer Th. Renssen (Vogelsterfte ten gevolge van aanvaringen met hoogspanningsleidingen). De vergadering van 23 november was gewijd aan wadonderzoek, met als sprekers de heer J. Hulscher (Het wad, een overvloedig of een schaars gedekte tafel voor vogels?) en de heer G. C. Boere (De geografische herkomst van steltlopers in het Nederlandse Waddengebied, en de functie van het gebied in hun levenscyclus).

De vergadering van de Oecologische Sectie, die op 9 maart gehouden werd, was gedeeltelijk gewijd aan het botulisme bij watervogels, met als sprekers de heer J. Haagsma (Bacteriologische aspecten) en de heer H. J. Over (Oecologische aspecten). Bovendien werden voordrachten gehouden door de heer A. L. Spaans (Onderzoek aan watervogels langs de modderkust van Suriname) en de heer C. Smeenk (Vergelijkende oecologie van vijf arendsoorten in Oost Afrika).

De jaarlijkse excursie werd gehouden op 4 en 5 mei, naar Zeeuws Vlaanderen en het Zwin.

De afdeling Club van Nederlandse Vogelkundigen hield twee excursies naar de waddeneilanden, nl. op 25 en 26 mei naar Schiermonnikoog en op 21 en 22 september naar Texel. Bovendien werden twee vergaderingen gehouden, op 24 maart en 17 november.

Limosa telde dit jaar slechts 174 pagina's. De omvang van Ardea bedroeg 260 pagina's. Helaas is de verschijning van Ardea door tijdgebrek bij de redactieleden sterk vertraagd.

J. H. van Balen, Secretaris.