WAARNEMING VAN EEN KLEINE ZWAAN *CYGNUS BEWICKII* MET RODE POTEN

Observation of a Bewick's Swan *Cygnus bewickii* with red legs

P. H. C. LINA EN H. D. VAN DER LAAN

WAARNEMING

Roselaar (1975) vermeldt de vondst van een Kleine Zwaan *Cygnus bewickii* met gele poten. Deze mededeling herinnerde ons aan een soortgelijke waarneming bij deze soort welke volgens onze aantekeningen op 7 november 1965 plaats vond. Op die dag, het was helder en zonnig weer, bevonden wij ons omstreeks 11.00 uur aan het begin van de Knardijk, nabij Harderwijk (Gld.). Vanaf deze plaats zagen wij, met het licht in de rug, op een afstand van circa 30 meter een groep van ongeveer 10 laag overvliegende Kleine Zwanen waarvan één exemplaar ons onmiddellijk opviel door zijn oranje-rood gekleurde poten. Voor zover wij dat in de korte waarnemingstijd konden beoordelen, was het kleurpatroon van de snavel normaal. Het verenkleed was geheel wit. Verder was de vogel enigszins kleiner dan de hem vergezellende dieren en was zijn hals in het midden iets doorgezakt.

LITERATUUR

Roselaar, C. S. 1975. Een vondst van een Kleine Zwaan *Cygnus columbianus bewickii* met gele poten. Limosa 48: 202-204.

Adres: P. H.C. Lina, Titus Brandsmastraat 75, 2286 RC Rijswijk ZH;
H. D. van der Laan, Merelplein 5, 2771 SB Boskoop.

EIDEREENDEN *SOMATERIA MOLLISSIMA* OP HET HOLLANDSCH DIEP

Eiders *Somateria Mollissima* on the Hollandsch Diep

G. L. OUWENEEL

Bij een vaartocht over het Hollandsch Diep-Haringvliet, als gast van de Afdeling Milieu-onderzoek van Rijkswaterstaat, troffen H. J. M. Baptist en de auteur op 16 augustus 1976 een paar honderd meter uit de noordoever van het Hollandsch Diep, ter hoogte van de Hoogezandse Gorzen, een gezelschapje van 12 Eidereenden *Somateria mollissima* aan. Bij zijn maandelijkse "tel-vaartochten" over het Hollandsch Diep-Haringvliet had Baptist voor het eerst op 15 december 1975 ter plaatse Eidereenden waargenomen, en wel een gezelschap van 6 exemplaren. Tussen 15 december 1975 en 16 augustus 1976 ontbraken ze vrijwel nooit; zij het dat het aantal varieerde van 4-12 exemplaren. Na 16 augustus 1976 heb ik gepoogd vanaf de noordoever van het Hollandsch Diep het doen en laten van de

Eidereenden te volgen. Dit lukte niet altijd; bij onrustig water bleven de vaak ver uit de oever verkerende Eidereenden uit het vizier. Voorjaar 1977 was het gezelschap uitgegroeid tot 18 exemplaren waaronder 4 uitgekleurde ♂♂ . Regelmatig verbleven de vogels toen dicht onder de oever waarbij ze vaak rustten tussen de Aalscholvers *Phalacrocorax carbo* op de basaltblokken van een pier. Rond deze pier verbleef het gezelschap van minimaal 10 en maximaal 18 vogels de gehele zomer 1977.
Lettend op het waarnemingspatroon sedert 15 december 1975 ziet het er naar uit dat er langdurig en ononderbroken Eindereenden kunnen verblijven op het zoete Hollandsch Diep, en wel in een sector die voor de afsluiting reeds kon worden gerekend tot het zoetwatergetijdengebied. De vraag is wat deze Eidereenden tot voedsel dient. Ik zag de vogels regelmatig duiken maar zonder ooit te kunnen vaststellen dat ze met een relatief omvangrijke buit (b.v. een Mossel) bovenkwamen. Vooralsnog valt er over het voedsel alleen maar te gissen.

SUMMARY

On 15 December 1975 a flock of 6 Eiders *Somateria mollissima* was observed on the Hollandsch Diep. Between december 1975 and autumn 1977 Eiders were frequently seen on the same location. Spring 1977 the flock consisted of 18 Eiders of which 4 adults males. The birds were often seen diving but the food stayed unknown. The Hollandsch Diep has fresh water. Before the closure of the Hollandsch Diep-Haringvliet in November 1970, the river was under the influence of the tides, however, then it held fresh water also.

Adres: G. L. Ouweneel, Lijster 17, 3299 BT Maasdam.

WAARNEMING VAN EEN NOORDSE NACHTEGAAL *LUSCINIA LUSCINIA* OP ROTTUMEROOG IN HET VOORJAAR VAN 1977

Record of a Thrush Nightingale *Luscinia luscinia* on Rottumeroog in spring 1977

M. J. SWART EN A. TIMMERMAN AZN

WAARNEMING

Gedurende een weekend-bewakingsdienst op Rottumeroog (Gr.) en wel op zaterdag 21 mei 1977 om 20.30 uur (zomertijd en een zonnige dag), naderden de auteurs het RWS-voogdwoninkje op het Oosterduin (dus niet het huis van de vroegere voogd Toxopeus). Deze voornamelijk uit hout opgetrokken "barak" is rondom omgeven door een tegelpad, van waaraf naar bovenop het duin een pad van houten vlonders ("pallets") schuin omhoog loopt. Tussen het loopvlak van dit pad en het duinzand is enige ruimte. Toen MJS op het plankier stapte, schoot onder de planken vandaan een van boven bruine vogel, die door zijn vlucht even deed denken aan een Snor *Locustella luscinioides*. De vogel streek neer op de tegels, vlak tegen de wand van de woning en meed – zoals ook in het vervolg nog zou blijken – systematisch de hoge helmpollen die overal in de