

KORTE MEDEDELINGEN

SHORT COMMUNICATIONS

OOK IN 1971 BROEDDE DE DWERGMEEUW AL IN FLEVOLAND

The Little Gull *Larus minutus* already bred in 1971 in the Flevopolder

TH. A. RENSSSEN

Algemeen wordt aangenomen dat de Dwergmeeuw *Larus minutus* in 1972 voor het eerst in Flevoland heeft gebroed (zie Marra N. Limosa 46, 1973). Dit is echter niet het geval. Ook in 1971 kwam de soort daar al tot broeden.

Op 1 juni van dat jaar troffen J. H. van Doorn en de auteur op een eilandje in een van de kwelplassen van Zuidelijk Flevoland tussen een groep alarmerende Kokmeeuwen *Larus ridibundus*, Visdieven *Sterna hirundo* en Kluten *Recurvirostra avosetta* ook een alarmerende Dwergmeeuw aan. Na enig zoeken vonden wij aan de waterrand op enkele strootjes een ei van deze soort dat flink met modder was bedekt. Het „nest” lag op een laag modderig gedeelte en was omgeven door enkele kleine plantjes zeezuring. In de onmiddellijke nabijheid broedden 20 paren Visdieven en 3 paren Kluten. Op het hogere deel van het eiland dat begroeid was met riet en biezen, bevond zich een kolonietje van 25 paren Kokmeeuwen.

Op 6 juni was het nest inmiddels met stukjes riet en blad onderbouwd. Het bevatte toen drie tolvormige eieren. De olijfkleurige zwart-bruin gevlekte eieren maten $41,0 \times 29,0$ mm, $40,0 \times 28,8$ mm en $39,6 \times 29,1$ mm.

Op 27 juni na een periode met veel regen en wind, welke het water zeer hoog deden opzetten, bleek het nest tot ongeveer 30 cm boven het maaiveld opgebouwd. De Dwergmeeuwen hadden kennelijk tijdens het slechte weer als enige kans gezien hun nest tot boven de hoge waterstand op te bouwen, want alle Kluten-, Visdief- en lager gelegen Kokmeeuwenesten waren verlaten en ten dele ook verdwenen. Het Dwergmeeuwenest bevatte toen nog maar één ei dat op uitkomen stond. Er werden geen jongen gezien. Op 3 juli bleek het nest verlaten. Er werd toen geen spoor meer van oude of jonge vogels gezien. Op het nest bevonden zich slechts enkele eischaalresten. Bij nader onderzoek bleken ook in het nest nog eischaalfragmenten aanwezig te zijn. Mogelijk zijn de twee eerst gelegde eieren tijdens de periode met slecht weer uitgekomen en de jongen verloren gegaan. Op 20 juni werd het broedgeval bevestigd door professor dr. W. H. van Dobben. Op 12 juni was vlakbij het nest nog een tweede paar aanwezig, dat wij ook zagen copuleren. Op 20 juni alarmeerden boven de broedplaats zelfs 6 uitgekleurde Dwergmeeuwen en 25 vogels van het jaar daarvoor.

Het is dus niet uitgesloten dat er uiteindelijk meer dan één paar Dwergmeeuwen tot broeden is gekomen.

Adres: Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 67 Arnhem.