

landse broedvogels, pp. 206-207. Natuurmonumenten, 's-Graveland.

GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & BAUER K. M. 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 9. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.


SCHLEGEL R. 1969. Der Ziegenmelker. Ziemsen, Wittenberg.

F. Kuyk, Hooizolder 30, 9205 CA Drachten


Zwarte Kraai *Corvus corone* met teen halverwege loopbenen

Op 6 oktober 1983 vingen wij in een kraaienkooi in Burgers' Dierenpark ten noorden van Arnhem een Zwarte Kraai met een grote achterwaarts gerichte teen halverwege de achterkant van beide loopbenen (figuur 1). Halverwege de buitenste teen van de linkerpoot bevond zich ook nog een zijwaarts gerichte teen. Bij de rechterpoot ontbrak deze extra teen. De kraai werd op 10 oktober met ring 5 181 476 van het Vogel-trekstation losgelaten.

De kraai, een vogel in zijn eerste levensjaar, had een vleugellengte van 323 mm en woog 491 g. Vergeleken met andere kraaien die wij in dezelfde decade in het dierenpark vingen, was de



Figuur 1. Linkerpoot van Zwarte Kraai met grote achterwaarts gerichte teen halverwege het loopbeen en extra teen halverwege de linkerteen (Rijksinstituut voor Natuurbeheer). Left leg of Carrion Crow with large backward directed toe half-way the tarsometatarsus. Note extra toe half-way the left toe.



Figuur 2. Verband tussen vleugellengte en gewicht van eerstejaars Kraaien die begin oktober 1983 in het dierenpark zijn gevangen. Relation between wing length (abscissa) and weight (ordinate) of first-year Carrion Crows trapped in the Arnhem Zoo early October 1983.

(●) vogel met extra tenen bird with additional toes.

vogel voor zijn grootte iets aan de lichte kant (figuur 2). In 1979-83 vingen wij rond Arnhem ruim 900 kraaien, maar een aberratie als deze werd door ons niet eerder gezien.

Wij zijn A. J. J. J. M. van Hooff, directeur Burgers' Dierenpark, erkentelijk voor de toestemming om kraaienkooien in zijn park te plaatsen voor ons onderzoek.

Summary

Carrion Crow Corvus corone with toe half-way the tarsi

On 6 October 1983, a first-year Carrion Crow was trapped in the Arnhem Zoo with a large backward directed toe half-way the posterior part of the left and right tarsometatarsus. The left leg had also an additional toe half-way the left toe (fig. 1). Compared with other crows trapped early October 1983, the bird was rather lean for its size (fig. 2).

A. L. Spaans & T. A. Renssen, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 67, 6816 RM Arnhem