

Belangrijke gift van Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland

Limosa heeft onlangs f 10 000 ontvangen van het batig saldo van het boek *Randstad en broedvogels*. Redactie en financiële commissie zijn het bestuur van de Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland zeer erkentelijk voor deze genereuze gift. Momenteel wordt bekeken hoe deze financiële bijdrage het best kan worden aangewend.

Weidevogelbescherming BFWV in 1983

De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFWV) doet reeds vele jaren aan weidevogelbescherming door middel van „nazorg”. Ook in 1983 is er weer volop werk aan de winkel geweest. Door het natte voorjaar maakten de weidevogels een moeilijk broedseizoen mee. Veel vogelwachters maakten melding van verdrinken legfels. Vaak werden dode kuikens in of vlak bij het nest aangetroffen. Het omhoogbrengen van de nesten werd door sommige vogelwachters met succes toegepast. Jonge Kieviten die in lang nat gras niet uit de voeten konden, werden overgebracht naar naburige weilanden met kort gras. De ouders bleken daarna hun jongen zonder al te veel moeite terug te kunnen vinden. Op bouwland moesten nesten worden verstevigd met steentjes en stro om te voorkomen dat de eieren in de doorweekte grond wegzakten.

Doordat met name in de natte periode nogal wat legfels verloren gingen, kwamen veel vogels in juni nog eens tot broeden. Hierdoor moesten nog laat veel nesten met nestbeschermers tegen vertrapping door vee worden beschermd. Al met al is er samen met de boer weer heel wat werk verzet in de hoop dat onze weidevogels er wel bij zullen varen.

Uit de inventarisatielijsten valt af te leiden dat in 1983 c. 1720 vogelwachters actief zijn geweest. Zij vonden op 48 810 ha wei- en bouwland totaal 39 687 nesten van verschillende soorten. Op 49 182 ha werden totaal 50 524 broedparen geteld. Van de Kievit werden 13 746 nesten gevonden (28.2/100 ha), terwijl 14 957 paren werden geteld (30.4/100 ha). Voor de Grutto waren deze cijfers respectievelijk 8087 (16.6/100 ha) en 9418 (19.1/100 ha), voor de Scholekster 7287 (14.9/100 ha) en 8372 (17.0/100 ha), voor de Tureluur 2374 (4.9/100 ha) en 3166 (6.4/100 ha), voor de Kemphaan 82 (0.2/100 ha) en 152 (0.3/100 ha) en voor de Watersnip 310 (0.6/100 ha) en 592 (1.2/100 ha).


Kievit, Grutto, Tureluur en Watersnip blijken zich de laatste jaren goed te handhaven. De Kemphaan is daarentegen sinds 1980 nagenoeg gehalveerd. De Scholekster neemt nog steeds in aantal toe (in 1980 was de dichtheid nog maar 10.6/100 ha). Van de overi-

ge soorten valt te vermelden dat de Kwartelkoning nog op drie plaatsen werd gehoord, de Slobeend zich met 1.3 paar/100 ha de laatste jaren handhaaft. De Zomertaling lijkt iets in aantal toe te nemen. Was de dichtheid in 1980 nog 0.2 paar/100 ha, in 1983 was dat 0.3. De Veldleeuwerik lijkt het moeilijk te hebben. Werden in 1980 4.4 paren/100 ha geteld, in 1983 waren dit er nog slechts 3.5. Ook in 1984 hoopt de BFWV met haar inspanningen een bijdrage te kunnen leveren aan een goede weidevogelstand.

J. Hoekstra (administratie „nazorg” BFWV), *Finne 1, 9055 MH Britsum*

Kleurringen Aalscholvers

Sinds 1978 broeden Aalscholvers in de spontaan opgeslagen wilgenbossen langs de Knardijk in de Oostvaardersplassen. De grootte van de kolonie bedroeg in 1983 ruim 4000 broedparen. Deze sterke groei is niet het gevolg van verhuizing van vogels uit het Naardermeer maar is een op zichzelf staande ontwikkeling die parallel loopt aan toenemende aantallen broedparen in Denemarken, Zweden, DDR en Polen. Om inzicht te



krijgen in de oorzaken van de snelle groei is zowel in Zweden, Denemarken als Nederland onderzoek gestart naar de broedbiologie van deze in bomen broedende ondersoort (*sinensis*). Daarbij worden jonge vogels op het nest geringd. Naast de metalen ring is één kleurring omgelegd met een inscriptie welke afleesbaar is met een telescoop tot op c. 400 meter. De in Nederland geringde vogels dragen een witte ring aan de linker poot met een uit twee of drie letters bestaande lettercode (zie foto). Er wordt van beneden naar boven afgelezen. Codes die verwarring kunnen geven zijn niet gebruikt. In het geval van de foto is de code NX waarbij XN niet is gebruikt. Uit het buitenland afkomstige vogels kunnen een witte, gele, rode, blauwe of zwarte ring dragen welke voorzien is van drie cijfers of een letter en twee cijfers. Een ieder die een dergelijke vogel ziet waarvan de code kan worden afgelezen, wordt verzocht deze op te sturen naar onderstaand adres.

Mennobart van Eerden & Menno Zijlstra, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Postbus 600, 8200 AP Lelystad

Rosse Grutto's met kleurmerken

In het voorjaar van 1984 is er door de Vrije Universiteit een onderzoek aan de Rosse Grutto gestart. Doel van dit onderzoek is een verband te vinden tussen conditie in het voorjaar en broedsucces. Hiertoe werden Rosse Grutto's gevangen en voorzien van een kleurcode aan de poten. De vogels zijn gemerkt met gekleurd plastic plakband (in de vorm van een vlaggetje) aan de linker- en/of rechterpoot, boven het loopbeen. In verschillende combinaties zijn per vogel maximaal twee vlaggetjes aangebracht. De kleuren van deze vlaggetjes kunnen zijn: (1) groen - geel - groen (horizontaal gestreept); (2) groen - geel - groen (horizontaal gestreept) met rood uiteinde; (3) blauw; (4) rood.

Een ieder die zo'n gekleurmerkte Rosse Grutto waarneemt, verzoeken wij vriendelijk dit zo snel mogelijk aan ons te berichten onder vermelding van datum, tijd, plaats, kleurencombinatie en eventueel ook de grootte van de groep waarin de vogel zich bevond, geslacht en verenkleed (zomer of winter).

*J. Cronau, R. de Goede & J. Letschert,
Afdeling Diersystematiek en Zoögeografie,
Biologisch Laboratorium, Vrije Universiteit,
Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam*

9th Conference International Bird Census Committee

The joint 9th Conference of the International Bird Census Committee and the 7th meeting of the European Ornithological Atlas Committee will be held 2-6 September 1985 at the University of Dijon, Côte d'Or, France. The IBCC Conference will be mainly devoted to a special theme: "The influence of man on forest bird communities". The European Atlas Committee will be reviewing the progress of fieldwork for the European Atlas, which is due to start in the spring of 1983. For further information contact *Dr B. Frochet, Laboratoire d'Ecologie, Bâtiment Mirande, Université, 21 000 Dijon, France*

Themanummers *Het Vogeljaar*

Het is een goede gewoonte van de redactie van *Het Vogeljaar* om zo nu en dan themanummers over bepaalde onderwerpen het licht te doen zien. In de loop van de laatste jaren verschenen afleveringen die geheel gewijd waren aan Heggen en houtwallen (*Vogeljaar* 27(5), okt 1979, f 5,—), Hoogstamboomgaarden in gevaar (*Vogeljaar* 30(5), okt 1982, f 4,—) en Vogels en bosstructuur (*Vogeljaar* 31(2), apr 1983, f 5,—), het laatste nummer in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu en de Stichting Kritisch Bosbeheer.

Door een breed scala van auteurs worden telkens uitvoerig deelaspecten van de gekozen thema's behandeld, uiteraard grotendeels handelend over onze gevederde vrienden en hun bescherming. Voor vogelaars die over genoemde onderwerpen meer informatie willen hebben, worden deze themanummers in de aandacht aanbevolen.

Te bestellen door overmaking van het betreffende bedrag op postgirorekeningnummer 964 472 ten name van Administratie *Het Vogeljaar* te Delft onder vermelding van het gewenste themanummer.