

Summary Common Gulls *Larus canus* breeding on buildings

In de dunes near Petten (Noord-Holland) several pairs of Common Gulls out of over 200 pairs nesting in the area breed on buildings (first case in 1975 after they had bred on crates there).

Literatuur

- DE JONG P. H. 1984. Broedgeval Zilvermeeuw op dak. Vogeljaar 32: 87.
- MONAGHAN P. & COULSON J. C. 1977. Status of large gulls nesting on buildings. Bird Study 25: 89-104.
- SPAANS A. L. 1979. Zilvermeeuw *Larus argentatus*. In R. M. Teixeira. Atlas van de Nederlandse broedvogels, p. 172-173. Natuurmonumenten, 's-Graveland.
- Strijbos J. P. 1934. Het nestelen op boomen, een nieuwe broedgewoonte van *Larus c. canus* L. Ardea 23: 105-108, pl. VII-IX.

H. Kooistra, Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland, Postbus 1, 1755 ZG Petten

Kauw *Corvus monedula* trekt in bij Bosuil *Strix aluco*

In het kader van een langlopend onderzoek aan de bosuil-populatie van het Amsterdamse Bos worden door ons regelmatig de voor deze soort geplaatste nestkasten gecontroleerd. De nestkasten worden in toenemende mate ook door Kauwen gebruikt. Regelmatig komt het voor dat in een nestkast waar in maart of begin april een Bosuil op eieren zit, eind april of in mei een broedende Kauw wordt aangetroffen en de eieren van de Bosuil door het takkennest van de Kauw bedekt zijn. Slechts eenmaal hebben wij kunnen constateren dat een Bosuil een nestkast van een broedende Kauw overnam. De woningnood onder Kauwen blijkt ook uit twee gevallen van Kauwen die tevergeefs probeerden te nestelen in door Bosuilen bezette kasten.

In een relatief kleine nestkast (inwendig bodemoppervlakte 40×30 cm² en hoogte 25-30 cm) waarin op 2 april 1980 een Bosuil op drie eieren broedde, waren op 30 april naast het vrouwtje ook twee jongen aanwezig. In de tussenliggende tijd hadden Kauwen een enorme hoeveelheid takken aangesleept en op het dak van de nestkast gelegd. Het overgrote deel was echter daarna op de grond gevallen, zodat de voet van de boom bedekt was met een meer dan één decimeter dikke laag takken en twijgen.

Een klein deel van de twijgen was ook in de kast gedeponeerd. De jonge Bosuilen zijn ondanks alles succesvol uitgevlogen.

In 1983 constateerden we bij een andere kleine bosuil-kast een overeenkomstige situatie. Op 30 april vloog bij betreding van het nestbos een Bosuil uit één van de bomen naast de nestkast, terwijl uit de nestkast een Kauw wegvluchtte. Bij controle van de inhoud van de nestkast vonden we direct achter het vliegat een nest van een Kauw met één ei en in de donkerste hoek een gezond ogende jonge Bosuil. Op 5 mei was de jonge Bosuil flink gegroeid en waren in het kauwenest drie koude eieren aanwezig. Bijna 14 dagen later was het bosuil-jong uitgevlogen, maar lagen de eieren van de Kauw er nog steeds verlaten bij. Waarschijnlijk heeft de Kauw de eerste tijd overdag gebruik kunnen maken van de afwezigheid van de oude Bosuil en is pas verjaagd toen zij ook 's nachts op de eieren wilde blijven zitten.

Summary Jackdaw *Corvus monedula* and Tawny Owl *Strix aluco* in same nestbox

In the Amsterdamse Bos (NH) in 1980 Jackdaws were found nest-building on the top of and in a nestbox with a breeding Tawny Owl. In 1983, in an other nestbox a clutch of three fresh eggs of Jackdaws was present beside a chick of the Tawny Owl.

J. B. Buker & A. Hartog, Willem Mollhof 9,
1065 AH Amsterdam

Overzomerende Roodhalsfuten *Podiceps grisegena* op de Grevelingen

Eind juli 1982 meldde H. F. van der Lee een gezelschap Roodhalsfuten op de Grevelingen te hebben waargenomen. De vogels bevonden zich in de hoek die wordt gevormd door de Grevelingendam en de dijk van Overflakkee. Op 30 juli nam ik daar, pal aan de voet van de Grevelingendam, 12 vogels waar, waarvan 11 in prachtkleed. Latere bezoeken in nazomer 1982 leverden ter plaatse steeds Roodhalsfuten op met als maximum 22 vogels op 19 september. Het jaar daarop werd de locatie voor het eerst bezocht op 10 juli. Het resultaat was 12 Roodhalsfuten, waarvan 11 in prachtkleed. Later in het seizoen daalde het aantal tot één vogel op 27 augustus.

In 1984 werd ook in mei en juni ter plekke pools-
hoogte genomen, teneinde na te gaan of de
Roodhalsfuten hier inderdaad overzomerden.
Vanaf 19 mei werd de locatie met uitzondering
van de periode 14 juli-8 augustus wekelijks be-
zocht, waarbij steeds 1-7 Roodhalsfuten werden
waargenomen. In mei en juni waren steeds 2-3
vogels aanwezig, waarvan 2 in prachtkleed.

Ook andere fuutachtigen voelen zich tot deze
hoek aangetrokken. De gehele zomer plegen er
zich maximaal 80 Futen *P. cristatus* op te hou-
den, terwijl in 1983-84 vanaf begin juli maximaal
25 Geoorde Futen *P. nigricollis* aanwezig waren.
In juli 1983 was er ook een Kuifduiker *P. auri-
tus*. Ongetwijfeld zijn het gunstige (voedsel)om-
standigheden die de futen naar deze locatie doen
trekken. De toenemende mate waarin sportvis-
sers de hoek frequenteren (in zomer 1984 was er
trouwens ook een zeehond) doet een rijke vis-
stand veronderstellen. De vooral tijdens de
weekeinden toelopende sportvisseren brengen de
futen er toe over de Grevelingen uit te waaie-
ren.

De Roodhalsfuten mengden zich niet onder de
andere fuutachtigen, maar traden steeds ge-
scheiden hiervan in groepsverband op. Op stille
tijden begaven ze zich, als enige fuutachtige, in
het zeer ondiepe water pal onder de stenen
dijkvlooiing, waar ze tussen de verspreid liggen-
de basaltkeien pikbewegingen maakten, waarbij

de snavelpunt net onder het wateroppervlak
kwam. Cramp & Simmons (1977) geven als
voedsel voornamelijk ongewervelde dieren, spe-
ciaal insecten en hun larven, en in mindere mate
vis op. Meestal dreven de vogels lange tijd aan-
een in diepe rust op het water.

Summary Summering Red-necked Grebes *Podiceps gri- segena* on the Grevelingen

In 1982-83, from July till September a flock of Red-
necked Grebes was observed in the eastern part of the
Grevelingen, Delta area (maximum 22 birds on 19
September 1982). In 1984, on every visit there were
Red-necked Grebes present (maximum 7 on 7 July).
During May-June 2-3 birds were present.

Flocks of non-breeding Great Crested Grebes *P.
cristatus* are summering at the same place. During Ju-
ly-August up till 25 Black-necked Grebes *P. nigricollis*
may occur. The Red-necked Grebes usually did not
mix up with other grebes.

Literatuur

CRAMP S. & SIMMONS K. E. L. (eds) 1977. The birds of
the Western Palearctic, 1. Oxford University
Press, Oxford.

G. L. Ouweneel, Lijster 17, 3299 BT Maasdam

