

Gezamenlijke trek van Wilde Zwanen *Cygnus cygnus* en Kolganzen *Anser albifrons* in één formatie

Boven het Reestgebied, 7 km NNW van Balk (O), werd op 16 maart 1987 om 8u00 's morgens mijn aandacht getrokken door de gelijktijdig klinkende roep van Wilde Zwanen en Kolganzen. Toen ik naar boven keek, zag ik tot mijn verbazing vijf Wilde Zwanen en zes Kolganzen in één V-formatie noordwaarts vliegen. De kop van deze groep werd gevormd door een Wilde Zwaan, links gevolgd door vier soortgenoten en rechts door de zes veel kleinere Kolganzen. De vogels waren dank zij het heldere weer goed te observeren. Zij bleven in dezelfde samenstelling doorvliegen tot zij na meer dan een kilometer uit het zicht verdwenen.

De wind was noordwestelijk. Aangezien de formatie in noordelijke richting vloog waarbij de zwanen op kop en in de windzijde vlogen, mag worden geconcludeerd dat de Kolganzen in de luwte vlogen. In de directe omgeving van het waarnemingsgebied zijn geen grote wateroppervlakten en evenmin gebieden waar geregeld Wilde Zwanen foerageren. Hieruit kan worden afgeleid dat het om trek over langere afstand ging.

Summary *Joint migration of Whooper Swans* *Cygnus cygnus* *and White-fronted Geese* *Anser albifrons*

On 16 March 1987 a formation of five Whooper Swans and six White-fronted Geese was seen migrating north. The wind was NW. The swans flew on the windward side of the formation, the geese on the leeward side. Birds were most probably on long-distance migration.

M. 't Hart, Groot Oever 14,
7707 PW Balkbrug

Geconcentreerd jagende Buizerds *Buteo buteo*

Op 20 september 1986 bezochten L. J. Draaijer en de auteur de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, een uitgestrekt, voor het publiek gesloten, agrarisch landgoed onder Numansdorp (ZH). Op een c. 30 ha groot, recent geogost perceel karwij

telden wij 15 Buizerds, enkele Torenvalken *Falco tinnunculus* en twee Blauwe Reigers *Ardea cinerea*. De Buizerds zaten verspreid over het perceel, deels bovenop bultjes. Ook was er een voortdurend va-et-vient tussen het perceel en de belendende bomenrijen. De Buizerds verplaatsten zich vanaf hun zitplaats laagvliegend, of op een sukeldrafje met de vleugels half gespreid. Er werd dan gepoogd iets te grijpen, waarbij soms oogstresten rondstoven. Op 27.9 telde ondergetekende 17 Buizerds op dit perceel en op 5.10 tien. Kort na deze datum werd het perceel geploegd. De jachtopziener deelde desgevraagd mee dat al enkele weken vóór 20.9 zich op en rond het perceel veel Buizerds ophielden en dat deze op muizen jaagden.

Karwij is een gewas met een lange groeitijd. De wortels hiervan vormen voor onder meer muizen een aantrekkelijke voedselbron. Het bewuste perceel was in april 1985 met karwij onder tarwe ingezaaid. Het werd eind juli 1986 geogost, zodat het c. 16 maanden ongeploegd bleef en muizen het rijk alleen hadden. Na de oogst besloot de bedrijfsleiding in verband met een landbouwkundig experiment het perceel na de oogst nog ruim twee maanden niet te ploegen. De oogstresten bleven daardoor voor de muizen als voedselbron beschikbaar. Door deze, deels toevallige omstandigheden was er in de nazomer van 1986 een grote muizenpopulatie ter plekke aanwezig, die voor Buizerds een aantrekkelijke voedselbron vormden.

Summary *Concentrated hunting of Buzzards* *Buteo buteo*

On 20 September 1986 15 hunting Buzzards were counted on a 30 ha recently harvested parcel caraway near Numansdorp (Zuid-Holland). On 27 September 17 Buzzards were present, on 5 October ten. According to the local gamekeeper the Buzzards were hunting mice, which were extremely numerous on the parcel. Reasons for this numerosness could be the attractiveness of caraway-roots for mice; the parcel remained unploughed from April 1985 onwards, and caraway rests were 2-3 months after the harvest in July 1986 still present.

G.L. Ouweneel, Lijster 17,
3299 BT Maasdam