

Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1992

Rare and scarce birds in The Netherlands in 1992

WIM M. WIEGANT, GERARD H. STEINHAUS & CDNA


Voor U ligt het zeventiende jaarverslag van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Een Engelstalige versie van dit verslag verscheen in *Dutch Birding* (DB 16: 133-147). Het bevat gevallen uit 1992 en laat ingestuurde en herziene gevallen uit eerdere jaren, uit de jaren 1938 t/m 1991, welke zijn beoordeeld door de CDNA. Verscheidene gevallen uit 1992 en voorgaande jaren zijn om diverse redenen nog in behandeling. Een compleet overzicht van alle gevallen van zeldzame soorten uit de jaren 1800-1980 zal te zijner tijd worden gepubliceerd.

Op 1 januari 1994 was de CDNA als volgt samengesteld: E. J. van IJzendoorn (voorzitter), J. Scharringa (secretaris), W. M. Wiegant (archivaris), C. Reijnders, K. A. Mauer, C. S. Roselaar, J. H. Schekkerman en G. H. Steinhaus. De volgende ex-leden van de CDNA stemden bij sommige van de gevallen in dit verslag: A. B. van den Berg, P. W. Bison en R. A. de By.

Waarnemingen kunnen worden ingestuurd naar de CDNA, Postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid (bij voorkeur ingevuld op waarnemingsformulieren die gratis bij de CDNA verkregen kunnen worden). Meer informatie over de werkwijze van de CDNA is te vinden in van IJzendoorn & de

Heer (1985) en Moerbeek *et al.* (1987), waarin een lijst van te beoordelen soorten is opgenomen. Van deze lijst worden vanaf 1 januari 1993 de volgende soorten niet meer beoordeeld: IJsdruiker *Gavia immer*, Dwerggans *Anser erythropus*, Poelruiter *Tringa stagnatilis*, Lachstern *Gelochelidon nilotica*, Bijeneter *Merops apiaster*, Grote Pieper *Anthus richardi*, Roodkeelpieper *Anthus cervinus*, Waterrietzanger *Acrocephalus paludicola*, Sperwergrasmus *Sylvia nisoria*, Bladkoninkje *Phylloscopus inornatus*, Buidelmees *Remiz pendulinus*, Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* en Roodmus *Carpodacus erythrinus*. Bovendien wordt ook de Flamingo *Phoenicopterus ruber* niet meer beoordeeld.

In 1992 werden twee nieuwe taxa in Nederland vastgesteld: de Dwergarend *Hieraetus pennatus* en de donsstormvogel *Pterodroma feae/madeiral/mollis*. De meest opvallende overige dwaalgasten waren de tweede tot vierde Bronskoepend *Anas falcata*, de tweede Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis*, de derde Ross' Meeuw *Rhodostethia rosea*, de tweede en derde Bonte Tapuit *Oenanthe pleschanka* en de derde Cirlgors *Emberiza cirlus*. Interessant waren een langdurig verblijvende Griel *Burhinus oedipnemos*, een influx van



Bonte tapuit, 3 november 1992, Katwijk aan Zee (Arnoud van den Berg). Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*.

maximaal vijf Steppenkieviten *Chettusia gregaria*, voorjaarswaarnemingen van Sneeuwuilen *Nyctea scandiaca* en de zesde Vale Lijster *Turdus obscurus*.

Systematische lijst van aanvaarde waarnemingen

Bij de lijst van aanvaarde gevallen kan de volgende toelichting worden gegeven.

(a) Van ieder geval zijn de volgende gegevens opgenomen: (1) datum of periode; (2) plaats, bij voorkeur een gemeente of andere bekende topografische aanduiding; (3) provincie (zie afkortingen); (4) aantal exemplaren indien meer dan één, alsmede geslacht en leeftijd indien bekend; (5) een gevangen en geringde vogel is aangeduid met "ringvangst", een gevangen vogel met "vangst", een dood gevonden vogel met "vondst", een zingende vogel met "z", een gefotografeerde vogel met "f", en een vogel waarvan het geluid is opgenomen met "g"; (6) namen van waarnemers: eerst de naam van de ontdekker(s) of inzender(s), daarna de namen van ten hoogste drie inzenders. Indien één of meerdere foto's zijn gepubliceerd is één verwijzing opgenomen, indien een artikel is gepubliceerd over de waarneming is een verwijzing daarnaar opgenomen. Van gevallen die ontleend zijn aan de literatuur is alleen de bron vermeld.

(b) Voor de wetenschappelijke naamgeving is in beginsel Voous (*Limosa* 53: 91-104) aangehouden. Op basis van moderne inzichten heeft de commissie gemeend een aantal amendementen te moeten aanbrengen in haar vergadering van 10 november 1990. De volgende hebben betrekking op het huidige verslag: Vale Pijlstormvogel *Puffinus yelkouan mauretanicus* (voorheen *Puffinus puffinus mauretanicus*) en Kleine Goudplevier *Pluvialis fulva* (voorheen *Pluvialis dominica fulva*).

(c) Getallen achter de soortnaam geven het aantal exemplaren aan van de aanvaarde gevallen uit de jaren 1800-1968, 1969-91 en 1992 (voor een nadere toelichting zie *Limosa* 52: 217-219). Hierbij is, tenzij anders vermeld, geen rekening gehouden met de te zijner tijd te publiceren herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst.

(d) De volgende afkortingen zijn gebruikt

Vrs	Vogelringstation <i>ringing station</i>
ad	adult <i>adult</i>
f	gefotografeerd <i>photographed</i>
g	geluid opgenomen <i>sound-recorded</i>
juv	jeugdkleed <i>juvenile</i>
max	maximum van <i>maximum of</i>
onv	onvolwassen <i>immature</i>
z	zingend <i>singing</i>

DB Dutch Birding

provincies *provinces*

CP	Continentaal Plat <i>Continental Shelf</i>
D	Drenthe
Fl	Flevoland
Fr	Friesland
Gld	Gelderland
Gr	Groningen
L	Limburg

NB	Noord-Brabant
NH	Noord-Holland
O	Overijssel
U	Utrecht
ZH	Zuid-Holland
Zld	Zeeland

donsstormvogel *Pterodroma feae/madeiral/mollis* (0,0,1)

24.10 Camperduin NH (N. F. van der Ham, L. Stegeman, K. J. Eigenhuis e.a.; Groenendijk 1992).

Dit is het eerste geval van een donsstormvogel. De vogel werd onafhankelijk waargenomen door twee groepen waarnemers. De CDNA accepteerde de herkenning als Kaapverdische Donsstormvogel *Pterodroma feae* niet. Een artikel met betrekking tot dit geval zal binnenkort in Dutch Birding verschijnen.

Vale Pijlstormvogel *Puffinus yelkouan mauretanicus* (2,32,3)

14.7 Camperduin NH (A. Schaftenaar). 18.7 Camperduin NH (N. F. van der Ham). 22.7 Camperduin NH (N. F. van der Ham, M. O. Bleijerveld). 25.7 Camperduin NH f (D. J. Moerbeek, A. Vink e.a.; DB 14: 193). 26.7 Camperduin NH (N. F. van der Ham, M. O. Bleijerveld). 27.7 Camperduin NH (W. E. M. van der Schot, J. Swaab, A. Vink). 28.7 Camperduin NH twee (N.F. van der Ham). 29.7 Camperduin NH (N.F. van der Ham, J. W. de Roever, T. O. V. Muusse). 14.10 Camperduin NH (N.F. van der Ham, R. E. Brouwer).

1990 17.8 Camperduin NH twee (B. Winters, N. F. van der Ham). 18.9 Camperduin NH (L. Stegeman, M. Platteeuw, N. F. van der Ham).

Om deze soort te zien is Camperduin de plaats, juli-augustus de tijd, en Nick van der Ham de waarnemer om bij in de buurt te blijven. De gevallen van juli te Camperduin worden geacht betrekking te hebben op ten minste twee individuen. Het geval van augustus 1990 Camperduin is eerder gerapporteerd als betrekking hebbend op één vogel (De By *et al.* 1993).

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*

1990 3.3 Katwijk aan Zee vondst f (C. Schoonenberg).

Sinds 1983 zijn er drie gevallen in november, drie in december en één in maart; de overige zijn van september-oktober.

Aalscholver *Phalacrocorax carbo carbo* (1,7,1)

1991 1.9 Noord-Beveland Zld ring afgelezen (F. Arts).

Dit is pas het negende geval van deze ondersoort. De vogel was gekleurd in Colchester, Essex, in Engeland.

Ralreiger *Ardeola ralloides* (16,22,2)

15.6 Oostvaardersplassen Fl ad zomer (M. Platteeuw, K. Koffijberg e.a.).

21-30.6 Tholen Zld ad zomer f (M. van Dijk, M. Berlijn). Negen van de 13 gevallen na 1980 zijn uit juni.

Koereiger *Bubulcus ibis* (3,59,7)

14.5 Broekhuizenworst L twee (J. J. F. M. Jansen). 28.5 Praamweg Fl twee ad zomer (M. Berlijn). 18-19.7 Lelystad Fl ad (R. E. van der Vliet, R. de Lange, M. Deenik). 16.8 Serooskerke Walcheren Zld (J. Tramper, R. Sponselee, G. A. Davidse). 7-8.11 Alblasserwaard ZH (E. van Boheemen, A. Ouwerkerk, K. Ouwerkerk).

Dit was het beste jaar ooit. Het vorige beste jaar was 1989 (vijf gevallen). Van 1980 tot 1992, werden jaar-

lijks twee tot vijf vogels gezien, behalve geen in 1983 en één in 1984.

Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus* (103,18,2)

3.5 Lauwersmeer Gr ad zomer (L. J. R. Boon, H. van der Jeugd, M. Olthoff), 9-13.5 Texel NH ad zomer (A. Was-sink, H. J. Lichtenbeld, N. Marra sr).

Twee voorjaarsgevallen in één jaar is opmerkelijk. Het enige andere voorjaar sinds 1980 betrof het langdurig verblijf van een vogel in de Oostvaardersplassen, van 13.5 tot 13.8 1983.

Flamingo *Phoenicopterus ruber*

12.4 Rhenen Gld zes ad (A. Schaftenaar, J. J. Bakhuizen, R. de Beer e.a.). 5.5 Eemshaven Gr onv (L. J. R. Boon, A. van Dijk, E. B. Ebels e.a.). 22.7 Philipsdam Zld twee ad en een juv f (A. B. van den Berg, W. Hoogendoorn). 22.8 Philipsdam Zld zeven ad (H. van Wijk, E. van Boheemen). 1-11.8 Eemshaven Gr ad (K. Scholten, S. Lui-nenburg).

1991 16.9-11.1 1992 Philipsdam Zld acht ad en één juv f (T. O. V. Muisse, M. Muisse e.a.).

1985 Oostvoornse Meer ZH toevoeging: twee van de drie vogels bleven tot minstens 16.3 (A. Ros; cf. Moer-beek *et al.* 1987).

Het is niet onwaarschijnlijk dat de vogels die in Rhenen gezien werden op weg waren van Zeeland naar het Zwillbrockervenn in Nordrhein-Westfalen in Duitsland, waar er enkele broeden (J. Treep, van den Berg 1993). Het bedelende juveniel op 22.7 moet ergens anders vandaan zijn gekomen dan het Zwillbrockervenn, want de juveniele vogels verlieten deze kolonie niet vóór augustus (J. Treep). De CDNA stelt prijs op informatie om-trent twee gekleurde vogels die enige tijd verbleven in de Keersluisplas, Fl in de zomer van 1989. Dit is het laatste jaar waarin waarnemingen van deze soort werden beoordeeld door de CDNA.

Fluitzwaan *Cygnus columbianus columbianus* (0,3,1)

9.12 Eenrum Gr (H. A. Diephuis, J. W. de Jong).

Normaal overwintert deze ondersoort in Japan en de westelijke VS. Kennelijk trekken sommige individuen samen met Kleine Zwanen *C. c. bewickii* naar de over-winteringsplaatsen in Europa. Zo zijn er acht gevallen in Groot-Brittannië en Ierland voor de jaren 1958-92 (Ro-gers *et al.* 1993).

Ross' Gans *Anser rossii* (0,3,0)

15.2-16.3 Workumerwaard Fr ad witte vorm (E. B. Ebels, E. Douwma, P. Rousset e.a.). 30.12 Stellendam ZH ad witte vorm (M. P. Teeuw, E. van Boheemen, A. Ouwerkerk).

Deze gevallen worden geacht betrekking te hebben op één vogel, die voor het eerst werd vastgesteld in 1988.

Rotgans *Branta bernicla nigricans* (0,56,0)

28.3-7.5 De Cocksdorp en Oost, Texel NH f (R. E. Brouwer, K. J. Eigenhuis, E. B. Ebels e.a.). De Cocks-dorp, Texel NH 19.10-26.2 1993 (A. Wassink, M. Ber-lijn, J. Scharringa e.a.).

1990 10.11 Noordpolderzijl Gr ad (A. van Dijk).

De gevallen van Texel worden geacht betrekking te hebben op één individu, dat ook in 1991 aldaar aanwezig was (cf. de By *et al.* 1993).

Amerikaanse Smient *Anas americana* (1,17,1)

9.2-18.3 Ingen Gld ♂ (A. Vink, M. Berlijn, E. B. Ebels

e.a.). 11.2 Ackerdijkse Plassen ZH ad ♂ (M. van der Klift, T. O. V. Muisse).

1991 5.1 Megen NB eerste winter ♂ (G. W. M. van Aalst, M. Berlijn, J. van 't Hof e.a.).

De vogel van Ingen zal dezelfde zijn geweest als het exemplaar dat op dezelfde plaats aanwezig was gedurende maart 1993 (cf. de By *et al.* 1993).

Bronskopeend *Anas falcata* (0,1,3)

22-28.1 Amsterdamse Waterleidingduinen NH ad ♂ f (F. G. S. M. Hieselaar, M. Berlijn e.a.; DB 14: 63). 2.2 Rutbeek O ad ♂ (B. Hulsebos). 7.6 Philipsdam Zld ad ♂ (R. Keizer, J. Scharringa e.a.).

Deze gevallen zijn aanvaard door de CDNA omdat de commissie van mening is dat wilde herkomst van sommige van de waargenomen vogels niet kan worden uit-gesloten. De CDNA hoopt nog informatie te ontvangen over een vogel te Hillegom ZH van 16.3-18.4.

Blauwvleugeltaling *Anas discors* (2,12,2)

29.5-15.6 Eemshaven Gr ad ♂ f (J. Schelvis, S. de Bruin, P. Rousset e.a.).

31.12 Middelplaten Veerse Meer Zld ad ♂ (V. Stork, T. Koppejan, S. Lubbers).

Zes van de elf gevallen sinds 1980 zijn tussen 21.4 en 12.5.

Witkoepeend *Oxyura leucocephala* (4,7,0)

1991 7.11-6.1 1992 Philipsdam Zld onv of ♀ f (M. van Dijk, T. O. V. Muisse e.a.). 14-29.12 Stellendam ZH f (M. van Dijk e.a.).

Het geval van de Philipsdam was eerder beschreven voor 10-24.11 (de By *et al.* 1993). Het geval van Stel-lendam, dat eerder was afgewezen, werd aanvaard na de ont-vangst van nieuwe beschrijvingen en een foto. Mogelijk hebben beide gevallen uit 1991 betrekking op één vogel.

Steenarend *Aquila chrysaetos* (5,4,1)

29.5 Erlecom Gld onv (A. Vink, B. Gaxiola, W. M. Wiegant).

Dit is het eerste aanvaarde geval sinds 1981. Er zijn nu tien gevallen, waarvan zes in oktober-januari, drie in april-mei en één in juli. Verscheidene waarnemingen van *Aquila* arenden werden ingediend bij de CDNA maar dit was de enige die aanvaardbaar werd geacht.

Dwergarend *Hieraaetus pennatus* (0,0,1)

30.5 Leersum U donkere fase f (A. Dees; Dees *et al.* 1994).

Dit betreft het eerste geval voor Nederland. De vogel werd overvliegend gezien door slechts één waarnemer.

Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla* (?,?,2)

13.6 Weerribben O twee g (D. Woets).

De CDNA hoopt nog een beschrijving of opname te ontvangen van een vogel te Wageningen, Gld op 16-17.5 die door veel vogelaars werd waargenomen.

Griël *Burhinus oedichnemus* (veel,22,1)

4.6-4.10 Callantsoog NH g (K. J. Eigenhuis, R. E. Brou-wer).

1990 21.5 Wijk aan Zee NH (C. Reijnders, R. Reijnders).

De vogel van Callantsoog was niet gepaard. Sinds het laatste bevestigde broedgeval in 1957, zijn er geen broedpogingen meer geweest. De vogel van 1990 kan dezelfde zijn geweest als die een week eerder werd ge-zien te Castricum NH (de By *et al.* 1993).

Kleine Goudplevier *Pluvialis fulva* (9,1,1)
25.9 Niekirk Fr ringvangst f (A. Veenstra).

Deze vogel werd toevallig gevangen met een groep Kievitens *Vanellus vanellus*. Hij werd herkend als Amerikaanse of Kleine Goudplevier *Pluvialis dominicalis/fulva* maar de maten en de foto toonden aan dat het een Kleine Goudplevier was.

Amerikaanse/Kleine Goudplevier *Pluvialis dominicalis/fulva* (2,0)

1991 8.8 Schiermonnikoog Fr ad (M. Olthoff). 13-15.9 Middelburg Zld ad f (J. M. Walhout, E. J. van IJzendoorn e.a.).

Eerder werd het geval te Middelburg aanvaard als Kleine Goudplevier *P. fulva*, maar de CDNA beschouwd de specifieke identiteit van de vogel nu als onzeker (cf. Eigenhuis et al. 1994).

Steppenkievit *Chettusia gregaria* (3,17,5)

28.6-1.7 IJsselmuiden O ad zomer (M. Berlijn, R. A. de By, J. W. de Roever e.a.). 2.7 Veldddriel Gld ad zomer (F. van Binsbergen). 23-24.8 Ubbergen Gld juv f (J. Jacobs, M. Hornman, G. Driessens). 25-27.9 Buren Gld ad winter (P. van Scheepen). 22.11 Nijkerk Gld ad winter (A. ten Hoeve).

Een recordjaar voor deze soort. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze gevallen betrekking hebben op slechts drie of vier vogels. Het vorige beste jaar was 1981 met drie gevallen.

Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos* (2,47,6)

16-18.5 Oudega, Smallingerland Fr f (K. H. Scholten, L. J. R. Boon, G. Tuinstra e.a.). 23-27.7 Foppenpolder, Maassluis ZH f (P. van Rij; DB 14: 194). 24-27.7 Vlaardingen ZH ad zomer f (M. van Dijk). 13-23.9, Julianadorp en Sint Maartensvlotbrug NH max drie f (P. Knolle, K. J. Eigenhuis, N. F. van der Ham e.a.; DB 14: 194).

1990 22.9 Oostvaardersplassen Fl (P. Edelaar).

Twee gevallen van drie vogels in Noord-Holland worden geacht betrekking te hebben op dezelfde drie individuen. Het was een gemiddeld jaar voor deze soort, als men in aanmerking neemt dat het aantal gevallen een stijgende tendens vertoont. De CDNA verwacht nog informatie over twee vogels te Julianadorp van eind juli tot 4.9.

Breedbekstrandloper *Limicola falcinellus* (23,70,0)

1991 1.9 Rottumerplaat Gr (N. de Vries, T. S. Haanstra).

Dit was het eerste jaar sinds 1981 dat deze soort niet werd waargenomen. Het aantal gevallen van deze soort is sterk gedaald sinds hun favoriete stek in het Lauwersmeer langzamerhand begroeid is geraakt.

Noordelijke Grijs Snip *Limnodromus scolopaceus* (0,7,1)

21-23.8 Lauwersmeer Gr ad winter (K. Scholten, S. Linnenburg, H. van Schuppen).

Deze vogel verbaasde de waarnemers door in volledig winterkleed te verschijnen, terwijl in andere jaren de vogels in augustus altijd sporen van het zomerkleed vertoonden.

Poelruiter *Tringa stagnatilis* (19,112,22)

24-26.4 Rhenen U ad zomer (M. Berlijn, R. M. van Dongen). 26.4 Wilp Gld ad zomer (R. Keizer, D. C. Uit de Weerd e.a.). 6.5 Oostvaardersplassen Fl ad zomer (R. Keizer, H. Dulfer). 7.5 Groningen Gr ad zomer (S. de

Bruin). 18-19.5 Oostvaardersplassen Fl ad zomer (G. O. Keijl e.a.). 8-21.6 Workumerwaard Fr (O. W. Zijlstra, J. de Jong, R. E. Brouwer). 12.6 Oudega Smallingerland Fr 2 ad (M. J. Swart, J. M. Swart, G. Molenaar). 16-19.6 Oudega Smallingerland Fr (T. de Groot). 22.6-30.7 Oostvaardersplassen Fl drie ad (J. J. F. M. Jansen, K. J. Eigenhuis e.a.). 19.7-19.9 Lauwersmeer drie (J. J. F. Jansen, T. Bakker, P. Rousset). 1-5.8 Lepelaarsplassen Fl ad zomer (M. Berlijn, R. Keizer). 9.8 Selenapolder Zld (A. P. Wieland). 18-21.8 Anna Paulowna NH 2 juv (K. J. Eigenhuis, F. Kalsbeek e.a.). 21-25.8 Philipsdam Zld 1 ad en 2 juv (M. van Dijk, S. Tas). 27-28.8 Schiermonnikoog Fr ad (T. Bakker).

1991 29.4 Nijkerk Gld (A. ten Hoeve, R. van der Vliet, T. de Wijze). 19.7 Oostvaardersplassen Fl ad (J. J. F. Jansen). 27-28.7 Lauwersmeer Gr (A. Poelmans). 8.8, ad (M. Berlijn e.a.).

1986 17.8 Workumerwaard Fr (H.-J. Udding).

Vanaf 1.1 1993 wordt deze soort niet meer beoordeeld door de CDNA. Het laatste jaar waarin nog wel beoordeeld werd, bleek tevens het jaar met het hoogste aantal gevallen, met twee groepen van drie vogels.

Terekruiter *Xenus cinereus* (0,9,2)

10.5 Wissekerke Zld ad zomer f (R. Sponselee, G. A. Davidse, P. L. Meininger e.a.). 21.5 De Cocksdorp, Texel NH ad (A. Wassink).

Evenals in 7 van de 9 overige gevallen, verbleven deze vogels slechts één dag op de plaats van waarneming.

Kleinste Jager *Stercorarius longicaudus* (77,127,7)

21.8 Vlissingen en Domburg Zld juv (P. A. Wolf, J. M. Walhout). 4.9 Westkapelle Zld ad en juv (R. Sponselee, M. van Steenis). 3.9 Scheveningen ZH ad (T. O. V. Muisse). Scheveningen 4.9 juv (T. O. V. Muisse). 15.9 Waddenzee bij Schiermonnikoog Fr juv (A. de Bruin). 16.9 Schiermonnikoog juv (K. van Dijken).

1991 7.9 Lauwersoog Gr juv (A. van Dijk).


1988 Katwijk aan Zee ZH juv vondst f (C. Schoonenberg, P. Imthorn, G. van der Bent).

Sinds 1.1 1993 wordt deze soort niet meer beoordeeld door de CDNA.

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis* (0,1,1)

18-19.4 Zundert NB ad zomer f (D. J. Moerbeek, W. Hoogendoorn e.a.; Moerbeek & Hoogendoorn 1993).

Dit is het tweede geval voor zowel België als Nederland. De vogel werd gevonden tijdens een telling van Zwartkopmeeuwen *L. melanocephalus*. Dit geval viel



Ross' Meeuw, 23 november 1992, IJmuiden (Arnoud van den Berg). *Ross's Gull* *Rhodostethia rosea*.

samen met een enorme influx van deze soort in Frankrijk (Moerbeek & Hoogendoorn 1993).

Kleine Burgemeester *Larus glaucooides* (16,43,4)

18-21.1 Scheveningen ZH eerste of tweede winter f (J. Regeer, G. van der Bent, M. Berlijn e.a.; DB 14: 66). 5-7.2 IJmuiden NH eerste of tweede winter (K. J. Eigenhuis, R. Keizer e.a.). 9.2 Bloemendaal aan Zee NH tweede winter (E. J. van Huijssteeden, F. Dorel). 5.3 Katwijk aan Zee ZH tweede winter f (K. J. Eigenhuis, R. van Rossum; DB 14: 115).

1992 was een goed jaar voor deze soort. Andere goede jaren sinds 1980 waren 1981 (4), 1983 (10), 1984 (4), 1988 (3), 1989 (3) en 1991 (3).

Ross' Meeuw *Rhodostethia rosea* (1,2,1)

21-27.11 IJmuiden NH f (D. J. Moerbeek e.a.; Moerbeek 1993).

Dit was verreweg de best bezochte vogel van het jaar. Het was de eerste vogel die te 'beziichtigen' was sinds de adulte vogel op Vlieland in 1958. Gedurende het week-einde trok de vogel meer dan 400 waarnemers waaronder vogelaars uit België, Engeland en Duitsland.

Lachstern *Gelochelidon nilotica*

14.5 Breskens Zld (P. A. Wolf, J. M. Walhout, K. J. Eigenhuis e.a.). 18.5 Breskens Zld (R. Sponselee, R. Jansen). 15.5-2.6 Rottumerplaat Gr (G. Kasemir, D. Lutterop). 28.5 Breskens Zld (K. J. Eigenhuis e.a.). 31.5-6.6 Eemshaven Gr f (G. J. van den Berg, M. van Dijk, S. Tas e.a.). 7.6 Dinteloord NB eerste zomer (E. M. Ouwendijk). 14.6 Wassenaar ZH (A. Remeeus). 1.7 Lauwersmeer Gr, ad zomer (A. van Kleunen, J. van Vianen e.a.). 5.7 Petten NH (N. F. van der Ham). 26-27.7 Oostvaardersplassen Fl twee ad f (P. I. Waanders, A. Schaftenaar, R. de Beer. Vj 40: 288). 1.8 Petten NH (N. F. van der Ham). 1-2.8 Lisse ZH (T. J. C. Luijendijk). 6.8, Burgervlotbrug NH twee ad (R. Keizer, N. F. van der Ham, B. Schep).

1991 1-29.7 IJmuiden NH (K. J. Eigenhuis e.a.).

Deze soort wordt vanaf 1.1 1993 niet meer beoordeeld door de CDNA. De gewoonte om tijdens de zomermaanden bollenvelden te inrunderen om parasieten te doden heeft de kansen om deze soort buiten de slaappleaats op het Balgzand, NH te vinden duidelijk doen stijgen. Evenals in 1991 werden vele waarnemingen niet doorgegeven aan de CDNA.

Dougalls Stern *Sterna dougallii* (0,15,1)

19.5 Egmond aan Zee NH ad zomer (W. van Splunder, N. F. van der Ham, S. Lagerveld).

Sinds 1982 is deze soort jaarlijks waargenomen, met uitzondering van 1986 en 1988.

Witwangstern *Chlidonias hybridus* (196,84,15)

18.5 Oudega, Smallingerland Fr drie ad zomer (K. H. Scholten, G. Tuinstra). 18.5 Texel NH ad zomer (A. Wassink). 28.5 Lauwersmeer Gr drie ad zomer (R. O. Winters, R. Mulder, J. Bisschop e.a.). 28.5-2.6 Budel-Dorplesin NB drie (T. O. V. Muisse, W. Poelmans). 30.5 Millingen aan den Rijn Gld ad zomer (J. F. Bekhuis). 31.5 Vriezenveen O ad zomer (T. Kruissink, R. Brunink, J. Wessels e.a.). 9.7 Oostvaardersdijk Fl (R. O. Winters). 14-16.7 Oostvaardersdijk Fl ad zomer (M. Berlijn, J. Boshuizen, A. H. V. Eggenhuizen e.a.). 27-28.8 Oostvaardersdijk Fl f (K. A. Mauer).

1991 4.7 Egmond aan Zee NH (S. Lagerveld, N. F. van der Ham).

Dit was het beste jaar sinds 1980. Andere goede jaren waren 1981 (9, in mei) en 1991 (8).

Dikbekzeekoet *Uria lomvia* (5,1,1)

18.4 Texel NH vondst, balg in Zoologisch Museum Amsterdam (C. S. Roselaar).

Dit is het zevende geval van deze arctische soort. Andere aanvaarde gevallen dateren van 1919, 1924, 1967, 1974, 1979 en 1981, alle gedurende december-maart. De enige die ooit levend werd gezien betrof een stervende vogel aan de Brouwersdam, ZH in februari 1979 (van den Berg & Bos 1979).

Zwarte Zeekoet *Cephus grylle* (?,?,4)

14.1 Camperduin NH (N. Dijkstra, N. van der Ham, J. Bijleveld e.a.). 26-27.1 Brouwersdam ZH onv (T. O. V. Muisse). 10 en 18-25.10 Camperduin NH (N. F. van der Ham, N. Dijkstra, J. Bijleveld e.a.). 18.10-8.11 Fr West-Terschelling, onv f (E. Nieuwstraten, M. Zekhuis, H. van der Jeugd; DB 14: 236).

Een betrekkelijk goed jaar voor deze soort, waarvan er vanaf 1980 in de jaren 1981, 1985, 1986 en 1990 meerdere werden waargenomen, en in de jaren 1983 en 1988 geen enkele.

Oehoe *Bubo bubo* (0,3,1)


5-12.5 Ermelo Gld f (A. Smit; *Vogeljaar* 40: 191).

Een vogel die door veel vogelaars te Enschede werd gezien tussen 2 en 8 juni 1992 werd in juli dood gevonden en bleek geringd te zijn. De vogel was ontsnapt uit een privé-collectie in Gronau, vlak over de grens in Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

Sneeuwuil *Nyctea scandiaca* (5,2,3)

8.3-1.4 Maasvlakte ZH ad ♀ f (E. van der Burg, K. de Vries, A. B. van den Berg e.a.; Ebels 1992). 5.4 Heiloo NH (E. J. van IJzendoorn, P. W. Bison) en 15.5 Assendelft (R. F. J. van Beusekom, E. J. van IJzendoorn), waarschijnlijk ad ♀. 28.6 Schiermonnikoog Fr f (T. Bakker; DB 14: 156).

Uit bestudering van de foto's werd duidelijk dat de waarnemingen betrekking hadden op ten minste drie verschillende vogels. In eerste instantie was er twijfel of de vogels wel wild waren, omdat het geen typische invasie-winter leek te zijn. Bovendien waren er geruchten dat er in december in Friesland twee vogels waren losgelaten (Ebels 1992). Het werd echter snel duidelijk dat



Sneeuwuil, 10 maart 1992, Maasvlakte (Arnoud van den Berg). *Snowy Owl* *Nyctea scandiaca*.

er sprake was van een influx van c. 20 vogels in West-Europa die duurde van eind februari tot midden juli (van den Berg 1993).

Alpengierzwaluw *Apus melba* (2,15,2)

3.5 Vlissingen Zld (E. Sanders). 28.5 Bakkeveen Fr (K. H. Scholten, S. Luinenburg).

Bijeneter *Merops apiaster*

30.4 Breskens Zld (S. Lilipaly, T. O. V. Muisse e.a.). 20.5 Breskens Zld (P. Ruiters, G. A. Davidse, R. Sponselee). 19.5 Schiermonnikoog Fr twee (T. Bakker). 24.5 Breskens Zld (A. van Gilst, R. Sponselee). 23.6 Lopikerkapel U (J. van Bezooijen, A. Brele, W. van Zijl). 1990 1.7 Bergeijk NB (P. M. A. van de Wielen). 1986 30.4 Hooge en Lage Mierde NB (P. M. A. van de Wielen).

Waarnemingen van deze soort na 1.1 1993 worden niet meer door de CDNA beoordeeld.

Scharrelaar *Coracias garrulus* (?30,1)

7.6 Doldersummerveld D (J. M. Swart, R. Bijlsma, A. B. Swart-Middelhoek e.a.).

De enige recente gevallen waren in 1980, 1981, 1982 (3 waarvan 2 bij elkaar) en 1988 (2).

Middelste Bonte Specht *Dendrocopos medius* (?10,1)

10.5 Roermond L (R. Bekebrede, W. Achthoven).

Kortteenleeuwerik *Calandrella brachydactyla* (0,9,3)

2.5 Lauwersoog Gr f (J. Bisschop, S. Bernardus). 27.9-3.10 Eemshaven Gr f (H. P. van der Jeugd, L. B. Steijn e.a.; DB 14: 236). 14.5 Breskens Zld (M. A. Capello, J. M. Walhout e.a.).

Het beste jaar ooit voor deze soort. Er waren slechts twee eerdere veldwaarnemingen. Met uitzondering van een geval in november dateren alle gevallen uit april-mei en september-oktober.

Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* (1,17,3)

30.4-1.5 Botshol U (D. Groenendijk, M. Berlijn e.a.). 18.5 Rottumeroog Gr (K. van Dijken, W. Steenge). 28.5 Breskens Zld (D. J. Moerbeek, M. A. Capello, G. A. Davidse e.a.).

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (1,21,2)

30.5 Oostvaardersplassen Fl ♂ z (A. Vink, H. Gebuis, P. C. Groebe e.a.). 1-5.6 Wassenaar ZH ♂ z g (K. J. Eigenhuis e.a.).

Alle veldwaarnemingen sinds 1980 betreffen zingende vogels van eind mei tot begin juni, met uitzondering van één in september, terwijl alle ringvangsten van augustus-september dateren, op één in juni na.

Blauwborst *Luscinia svecica svecica*

15-16.5 Den Burg Texel NH ♂ (H. Heessen, M. Heessen-Goënga).

20.5 Rottumeroog Gr ♂ (K. van Dijken, W. Steenge).

Bonte Tapuit *Oenanthe pleschanka* (0,1,2)

23-26.10 Petten NH eerste winter ♂ f (R. E. Brouwer, H. J. Endt; DB 14: 237). 31.10-4.11 Katwijk aan Zee ZH eerste winter ♀ f (A. van Egmond, R. van Rossum, C. Zuiderduyn e.a.; DB 14: 237).

Dit waren het tweede en derde geval voor Nederland. De vogel van Katwijk werd ontdekt vanuit een restaurant, waar de waarnemers koffie dronken na een excursie.

Vale Lijster *Turdus obscurus* (1,4,1)

18.10 Callantsoog NH f (D. Ellinger, O. Moedt).

Deze vogel werd zo kort gezien dat de definitieve herkenning plaats moest vinden vanaf de enige foto die werd genomen. Vroegere gevallen waren er in 1843, 1977 (twee), 1988 en 1989.

Krekelzanger *Locustella fluviatilis* (5,13,2)

25-29.5 Utrecht U z f (H. R. Russer e.a.). 28-30.5 Overlangbroek U z (A. Vink, H. Vink-Slotboom, M. Berlijn e.a.).

Waterrietzanger *Acrocephalus paludicola* (veel,156,2)

1-3.8 Maasvlakte ZH (T. O. V. Muisse). 22.8 Lauwersmeer Gr z (E. Klunder, L. Scholtens).

1991 7.9 Lauwersmeer Gr juv (A. van Dijk).

1990 2-11.8 Lauwersmeer Gr (G. W. M. van Aalst, L. J. R. Boon e.a.). 28.8 Oostvaardersplassen Fl (K. A. Mauer).

Sinds 1.1 1993 wordt deze soort niet meer beoordeeld door de CDNA. De Westplaat op de Maasvlakte en het Lauwersmeer zijn de beste plaatsen om Waterrietzangers te zien te krijgen van begin augustus tot de derde week van september.

Baardgrasmus *Sylvia cantillans* (2,15,2)

14-17.5 Terschelling Fr ♂ z f (F. Majoor, B. Rebergen). 15.5 Rottumerplaat Gr ♂ z (G. Kasemir, D. Lutterop).

Negen van de 14 gevallen sinds 1980 vielen tussen 4 en 15 mei. Er waren geen gevallen in 1989-91.

Sperwergrasmus *Sylvia nisoria* (20,121,4)

28-30.8 De Cocksdorp Texel NH onv f (A. Wassink, T. O. V. Muisse; DB 14: 195). 19-21.10 West-Terschelling Fr onv (J. J. Bakhuizen, K. Kraayeveld e.a.). 20.8 Castricum NH onv ringvangst (W. Beentjes, A. Wijker). 6.9 Castricum NH onv ringvangst (A. Wijker, H-J Ud-ding).

Deze soort wordt sinds 1.1 1993 niet meer door de CDNA beoordeeld. De CDNA hoopt nog op informatie over geringde vogels in dit en vorige jaren.

Braamsluiper *Sylvia curruca blythi/halimodendri* (0,1,1)

5.11 Castricum NH ringvangst (A. Wijker, H.-J. Ud-ding).

Het vorige geval van deze oostelijke ondersoort betrof ook een vangst te Castricum in november.

Gauwe Fitis *Phylloscopus trochiloides* (2,7,1)

2.6 Rottumeroog Gr f (K. van Dijken, W. Steenge; DB 14: 154).

Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (2,47,2)

18-21.10 De Cocksdorp Texel NH (K. van Dijken, E. B. Ebels). 21.10 Terschelling Fr (E. Nieuwstraten, M. Zekhuis, A. van Dijk).


Bergfluitier *Phylloscopus bonelli* (7,13,1)

5-11.10 De Cocksdorp, Texel NH ringvangst f g (A. Wassink, A. B. van den Berg; DB 14: 242).

Deze vogel verbleef in de tuin van een vogelaar. Aan de hand van de roep werd vastgesteld dat het de westelijke ondersoort *P. b. bonelli* betrof.

Tijftjaf *Phylloscopus collybita tristis* (0,?,0)

1990 17.10 Kennemerduinen NH ringvangst f (VRS van Lennep).



Bergfluit, 8 oktober 1992, Texel (Arnoud van den Berg). *Bonelli's Warbler* *Phylloscopus bonelli*.

1989 14-22.10 Texel NH f (H. Gebuis e.a.; DB 12: 48).

Sinds 1.1 1990 wordt deze ondersoort niet meer beoordeeld door de CDNA. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de CDNA deze ondersoort weer gaat beoordelen per 1.1 1994 (cf. *British Birds* 87: 358-359, 1994). Een aankondiging hierover zal binnenkort worden gepubliceerd.

Tijtjaf *Phylloscopus collybita brehmii* (1,6,1)
29.5-14.6 Oudemirdum, Gaasterland Fr z g (O. W. Zijlstra).

Alle gevallen hebben betrekking op zingende vogels in april-juni.

Taigaboombkruiper *Certhia familiaris* (5,117,4)
15-27.1 Rozendaal Gld (J. J. F. J. Jansen e.a.). 9.10 Vlieland Fr waarschijnlijk eerste winter (J. M. Walhout, G. A. Davidse, R. Sponselee). 10.10 Vlieland Fr waarschijnlijk ad (P. A. Wolf, J. M. Walhout G. A. Davidse). 15.12 Terschelling (A. van Kleunen, G. J. van den Berg, D. Groenendijk).

1991 28.1 Beetsterzwaag Fr (K. H. Scholten). 9.10 Schiermonnikoog, Fr (T. Bakker).

1990 29.3 Groningen Gr (M. Olthoff). 29.3 Groningen Gr (L. J. R. Boon, A. Bosma). 6.12 Broekmeden, O (R. Jansen).

De gevallen in Groningen op 29.3 1990 hebben betrekking op twee verschillende vogels.

Roodkopklauwier *Lanius senator* (? ,39,1)
10-11.6 Maasvlakte ZH tweedejaars ♂ f (M. van Diji, R. de Beer, P. C. Meijer).

In de periode 1980-1992 waren er gemiddeld twee gevallen per jaar.

Roze Spreeuw *Sturnus roseus* (13,22,1)
10-20.10 Middelburg Zld juv (J. Goedbloed, J. M. Walhout).

Witbandkruisbek *Loxia leucoptera* (35,20,0)
1990 8.8 Boerskotten O twee ad ♀ (R. Jansen).

Deze twee vogels waren de eerste van de invasie van 1990-91, waarmee het totaal van die invasie op 15 komt (cf. Ebels 1993).

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (8,547,3)
23-24.5 Schiermonnikoog Fr twee ♂ en ♀ (J. F. Bekhuis e.a.). 3-4.6 Uddel Gld (J. J. F. J. Jansen). 1990 17.6

Haagse Waterleidingduinen ZH ad ♂; 20.10 Katwijk f (A. Ouwerkerk, A. den Hollander).

Het geval van juni 1990 is ten minste twee maanden vóór de eerste vogels van de grote invasie van dat jaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de nieuwe gevallen uit 1992 betrekking hebben op nieuwe aankomst. Late voorjaarsgevallen zijn zeer zeldzaam. Gevallen na 1.1 1993 worden door de CDNA niet meer beoordeeld.

Roodmus *Carpodacus erythrurus* (3,119,-)

1991 22.6-2.7 Blocq van Kuffeler Fl ad ♂ (K. J. Eighuis, J. van 't Hof). 23.6 Castricum NH (H.-J. Udding, H. Kivit, A. Wijker).

Sinds 1.1 1992 worden waarnemingen van deze soort niet meer door de CDNA beoordeeld. Het totaal voor 1991 staat nu op 30.

Cirlgors *Emberiza cirlus* (2,0,1)

16.5 Breskens Zld tweedejaars ♂ f (P. van Tuil, E. Sanders e.a.; Nieuwstraten *et al.* 1994).

Dit is het derde geval. De vogel werd slechts kort zittend waargenomen. De CDNA aanvaardde dit geval voornamelijk op grond van de enige foto die werd genomen. De andere twee gevallen zijn van december 1883 en april 1904.

Bosgors *Emberiza rustica* (6,26,2)

4-8.10 Vlieland Fr f (E. B. Ebels, G. J. ter Haar, M. Berlijn; DB 14: 241). 26.10 Petten NH f (J. M. Walhout, A. B. van den Berg, R. van Rossum; DB 14: 241).

Van de 23 gevallen gedurende 1980-92, zijn er 19 uit de periode 25.9 tot 15.10, twee van mei, een van begin september en een van eind oktober. De CDNA verwacht nog beschrijvingen van zeven vogels gerapporteerd uit begin oktober.

Dwerggors *Emberiza pusilla* (13,49,1)

2.5 Groningen Gr (A. de Bruin).

1991 9-11.10 Oosterend, Terschelling Fr (T. O. V. Muisse, A. van Kleunen, M. Muisse).

De CDNA hoopt nog informatie te ontvangen van zes vogels waargenomen tussen 25.9 en 8.11.

Indigogors *Passerina cyanea* (0,2,0)

1989 10-23.3 Amsterdam NH ♂ f (S. de Bruin).

Dit is het tweede geval. Het eerste was een zingend mannetje in Noord-Holland in juni en juli 1983 (Meijer 1984).

Systematische lijst van niet aanvaarde gevallen

Deze lijst bevat alle gevallen die niet door de CDNA zijn aanvaard. De meeste gevallen worden afgewezen omdat de herkenning niet volledig zeker is (vaak vanwege gebrek aan documentatie) of omdat de vogels tekenen van gevangenschap vertonen, zoals twijfelachtige ringen, uitzonderlijke slijtage of afwijkend gedrag. Hierbij zijn ook soorten inbegrepen waarvan alle voorouders geacht worden uit gevangenschap te stammen (geïntroduceerde soorten).

Koereiger *Bubulcus ibis* 31.5 Noorden ZH (gebrekkige beschrijving). **Heilige Ibis** *Threskiornis aethiopicus* 9.9 Hilversum NH (beschouwd als ontsnapt; wilde herkomst van deze soort wordt hoogst onwaarschijnlijk ge-



Bosgors, 26 oktober 1992, Petten (Arnoud van den Berg). *Rustic bunting* *Emberiza rustica*.

acht; verdere gevallen van deze soort worden niet beoordeeld door de CDNA). **Canadese Gans** *Branta canadensis* ssp. 8.3 Bantpolder Fr (beschrijving onvoldoende). **Carolinaeend** *Aix sponsa* 30.12-4.1 1993 De Ronde Venen ZH (ad ♂; determinatie aanvaard maar als ontsnapt beschouwd; wilde herkomst van deze soort wordt hoogst onwaarschijnlijk geacht). **Stellers Eider** *Polysticta stelleri* 19.10 Schiermonnikoog Fr (♂ in eclips; fotografische documentatie onvoldoende om de determinatie te bevestigen). **Steppenarend** *Aquila nipalensis* 23.5 Vlieland Fr (ad; beschrijving onvoldoende en gedeeltelijk onjuist); 30.6 Culemborg ZH (onv; beschrijving onvolledig). **Schreeuwarend** *Aquila pomarina* 20.5 Groningen Gr (ad; beschrijving net onvoldoende voor aanvaarding van deze moeilijke soort); 15.8 Praamweg Fl (beschrijving sluit kleinere soorten roofvogels niet uit). **Steenarend** *Aquila chrysaetos* 26.6 Katwijk ZH (onv; beschrijving niet overtuigend); 16.9 Dwingelo (D) (andere soorten niet uitgesloten). **Dwergarend** *Hieraetus pennatus* 10-19.4 De Hamert L (ingetrokken door waarnemer). **Eleonora's Valk** *Falco eleonora* 14.5 Kats Zld (ad; beschrijving van deze overvliegende vogels ontbeert de details die nodig zijn voor het aanvaarden van een nieuwe soort voor Nederland). **Jufferkraan** *Anthropoides virgo* 6.6 Heusden NB (determinatie bevestigd maar zoals bekend van niet-wilde herkomst). **Kleine Trap** *Otis tetrax* 13.1 Oldelamer Fr (beschrijving onvolledig). **Grote Kanoetstrandloper** *Calidris tenuirostris* 30.4 Vliissingen Zld (foto's tonen een Kanoetstrandloper *C. canutus*). **Langteenstrandloper** *Calidris subminuta* 27.9 IJmuiden NH

(foto's tonen een Kleine Strandloper *C. minuta* met bleke poten; cf. *Limicola* 7: 112, 1993). **Kleinste Jager** *Stercorarius longicaudus* 30.10 IJmuiden NH (ad; beschrijving onvolledig). **Reuzenzwartkopmeeuw** *Larus ichthyaetus* 18.2 Hoek van Holland ZH (derdejaars; gebrekkige beschrijving; grootte niet beschreven; vleugels niet adequaat beschreven). **Kleine Kokmeeuw** *Larus philadelphia* 20.5 Tholen Zld (beschrijving onvolledig). **Ringsnavelmeeuw** *Larus delawarensis* 4.1 Kreekraksluizen Zld (eerste winter; Zilvermeeuw *L. argentatus* niet uitgesloten). **Kleine Burgemeester** *Larus glaucoides* 27.2-4.3 Broekhuizenvorst L (beschouwd als een leucistische Zilvermeeuw *L. argentatus* of Geelpootmeeuw *L. cachinnans*). **Dougalls Stern** *Sterna dougallii* 23.5 tussen Breskens en Vlissingen Zld (ad zomer; beschrijving onvolledig); 15.8 Kerkwerf, Schouwen Zld (ad; beschrijving onvolledig). **Bijeneter** *Merops apiaster* 19.8 Engbertdijkerven O (nauwelijks beschreven). **Rotszwaluw** *Ptyonoprogne rupestris* 14.5 Breskens Zld (onvolledige beschrijving van snel voorbijtrekkende vogel die door vele waarnemers is gezien; de witte staartvlekjes en de ondervleugeltekening werden niet waargenomen). **Roodstuitzwaluw** *Hirundo daurica* 19.5 Breskens Zld (beschrijving onvolledig). **Boerenzwaluw** *Hirundo rustica savignii* 5 Breskens Zld (volgens de CDNA vrijwel niet te onderscheiden van roestkleurige nominaat Boerenzwaluw *H. r. rustica*). **Kortteenleuwerik** *Calandrella brachydactyla* 14.5 Texel NH (onvolledig beschrijving van een overvliegende vogel). **Gele Kwikstaart** *Motacilla flava pygmaea* 29.5 Kornwerderzand Fr (3, ♂ en twee ♀; beschrijving on-

volledig). **Blauwborst** *Luscinia svecica magna* 6.6 Krimpen aan de Lek ZH (volgens de CDNA kan deze ondersoort niet in het veld worden onderscheiden). **Ro-de Rotslijster** *Monticola saxatilis* 13.5 Baarle-Nassau NB (beschrijving onvolledig). **Orpheusspotvogel** *Hippolais polyglotta*, 14.5 Maasvlakte ZH (beschrijving past perfect op Spotvogel *H. icterina*). **Halsbandvlie-genvanger** *Ficedula semitorquata* 15.5 Westvoorne ZH (♀; beschrijving, hoewel betrekkelijk overtuigend, bevat niet voldoende details voor een nieuwe soort voor Nederland). **Taigaboombkruiper** *Certhia familiaris* 7.1 Oostvaardersdijk FI (beschrijving onvolledig); 4.3 Schaarsbergen Gld (vangst; maten noch foto's, beschrijving van geluid niet overtuigend) 16.4-31.5, "ergens" in L broedgeval (fotografisch bewijsmateriaal niet voldoende voor de determinatie; geen beschrijving van de zang). **Kleine Klapekster** *Lanius minor* 29.1 Appelscha Fr (beschrijving onvolledig).

1991

Kleine Flamingo *Phoenicopterus minor* 13.4 Zierikzee Zld (determinatie aanvaard; beschouwd als ontsnapt; wilde herkomst van deze soort wordt hoogst onwaarschijnlijk geacht). **Zwarte Ibis** *Plegadis falcinellus* 5.8. Middelburg Zld. **Ross' Gans** *Anser rossii* 22.2 Schouwen Zld en 2.3 Stellendam ZH (Sneeuwgan *A. caerulescens* niet uitgesloten). **Steenarend** *Aquila chrysaetos* 30.11 Rotterdam ZH (beschrijving gedetailleerd maar gebrek aan vervolgwarnemingen overtuigt de CDNA niet). **Lachstern** *Gelochelidon nilotica* 19.8 Schagerbrug NH (geen beschrijving); **Siberische Boompieper** *Anthus hodgsoni* 11 Holwerd Fr (beschouwd als Oeverpieper *A. petrosus*). **Azuurmees** *Parus cyanus* 14.10 Texel NH (beschrijving past niet op de soort; waarschijnlijk betrof het een leucistische Pimpelmees *Parus caeruleus* of mogelijk een "Pleske's Mees" *P. cyanus* × *caeruleus*). **Pallas' Roodmus** *Carpodacus roseus* 30.4-1.5 Lauwersoog Gr (f, determinatie aanvaard maar de vogel wordt geacht niet van wilde herkomst te zijn geweest aangezien er veel handel is in deze soort). **Mas-kerhors** *Emberiza spodocephala* 12-14.12 Pingjum Fr (f; een onbekende kooivogel, mogelijk hybride Groenling *Carduelis chloris* × *Kneu C. cannabina*). **Bruin-kopgors** *Emberiza bruniceps* 19.5 Vlieland Fr (f; gebrekkige beschrijving, onvoldoende fotografisch bewijsmateriaal). **Grote Kruisbek** *Loxia pytyopsittacus* 30.3 Oirschot NB (2 ad ♂; geen beschrijving).

1990

Carolinaeend *Aix carolinensis* 7.8-10.9 Katwijk ZH (ad ♂; determinatie aanvaard maar als ontsnapt beschouwd; wilde herkomst van deze soort wordt hoogst onwaarschijnlijk geacht). **Klein Waterhoen** *Porzana parva* 2.9 Eemshaven Gr (geen beschrijving). **Dwergarend** *Hieraaetus pennatus* 1.5 Glimmen Gr (vrijwel geen beschrijving). **Grote Kruisbek** *Loxia pytyopsittacus* 12-15.8 Terschelling Fr (2 juv; f, waarschijnlijk relatief groot-snavelige Kruisbek *L. curvirostra*).

1989

Witkopeend *Oxyura leucocephala* 8.7 Vlieland Fr (ad ♂; beschrijving past op Rosse Stekelstaarteend *O. ja-maicensis*).

1988

Oehoe *Bubo bubo* Valkenburg aan de Geul L 7.12 (on-volledig beschrijving van een vogel die dood werd ge-vonden door politieagenten).

1977

Westelijke Rirfeiger *Egretta gularis* 1-2.8 Woerden ZH (beschrijving onvolledig).

1972

Amerikaanse Bosruiter *Tringa solitaria* 2.9 Den Haag ZH (f; de CDNA ziet niet waarom de foto niet betrek-king heeft op een Witgatje *T. ochropus*).

1938

Kleine Kokmeeuw *Larus philadelphia* 7.10 Texel NH (oude, indirecte beschrijving onvoldoende).

Dankwoord Wij bedanken de geconsulteerden voor alle hulp en advies. Informatie over vroegere gevallen is gedeeltelijk gebaseerd op Van den Berg (1994).

Literatuur

- VAN DEN BERG A. B. & BOSMAN C. A. W. 1994. Lijst van Nederlandse vogelsoorten 1994. Santpoort-Zuid.
- VAN DEN BERG A. B. & BOS J. L. M. 1979. Levende Dik-bekzeekoet *Uria lomvia* langs Brouwersdam in fe-bruari 1979. Dutch Birding 1: 109-111.
- DE BY R. A., VAN DEN BERG A. B. & CDNA 1993. Zeld-zame en schaarse vogels in Nederland in 1991. Li-mosa 66: 153-160.
- DEES A. J., RUSSEER E. P., RUSSEER H. R., PRINSEN H. & SNETHLAGE M. 1994. Dwergarenden bij Leersumse Veld in mei 1992 en bij Keersluisplas in april 1993. Dutch Birding 16: 102-105.
- EBELS E. B. 1992. DB Actueel: Sneeuwuil op Maasvlak-te. Dutch Birding 14: 70-72.
- 1993. Invasie van Witbandkruisbekken in Neder-land en Westeuropa in 1990-91. Dutch Birding 15: 206-214.
- EIGENHUIS K. J., DRIESSENS G. & MOERBEEK D. J. 1994. Identiteit van Aziatische Goudplevier bij Middel-burg in september 1991. Dutch Birding 16: 69-71.
- GROENENDIJK D. 1992. DB Actueel: Donsstormvogel langs Camperduin. Dutch Birding 14: 242-243.
- LICHTENBELD H. J. 1992. Veldwarnemingen CLXXII-CLXXVI. Het Vogeljaar 40: 94-96, 190-192, 287-288.
- MEIJER P. C. 1984. Indigogors in Robbenoordbos in ju-ni-juli 1983. Dutch Birding 6: 65-66.
- MOERBEEK D. J. 1993. Ross' Meeuw te IJmuiden in no-vember 1992. Dutch Birding 15: 7-13.
- MOERBEEK D. J. & HOOGENDOORN W. 1993. Ringsna-velmeeuw in Belgisch-Nederlands grensgebied in april 1992. Dutch Birding 15: 249-254.
- MOERBEEK D. J., WINKELMAN J. E. & DE HEER P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60: 21-31.
- NIEUWSTRATEN E., VAN TUIL P. & SANDERS E. 1994. Cir-l-gors te Breskens in mei 1992. Dutch Birding 16: 117-119.

ROGERS M. J. & RARITIES COMMITTEE 1993. Rare birds in Great Britain in 1992. *British Birds* 86: 447-540.

Gerard H. Steinhaus, Brugakker 11-42, 3704 WC Zeist
CDNA, Postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid

Wim M. Wiegant, Beatrixlaan 2, 6706 AX Wageningen

Aanvaard voor opname 26 oktober 1994



Kortteenleeuwerik, 29 september 1992, Eemshaven Gr (Arnoud van den Berg). *Short-toed Lark* *Calandrella brachydactyla*.