

monitoringsroute stroomopwaarts, scheptechniek en vissoorten gaan we aan de slag. Door het natte voorjaar staat het meanderende water onvoorstelbaar hoog en stroomt razendsnel. Een kronkelend wandelpad is overstroomd en getransformeerd in een groot ondiep ven. Onderwater liggen boomstronken, takken en stenen. Opletten dus. Evenwicht bewaren. Niet omvallen. Via een brede waterval stort het water met veel kabaal naar beneden. Voor reus Erwin van bijna twee meter is het water op sommige plaatsen zelfs bijna té diep.

De regen valt met bakken uit de lucht. Als verzopen katten scheppen we er lustig op los en hebben veel plezier. Jonge bruine kikkers springen voor ons uit. Beukenbladeren vormen de laatste rustplaats van een wild zwijn. Uiteindelijk bestaat de rijke oogst uit 54 berrmpjes, 96 rivierdonderpadden en een driejarige beekpriklarve. De bijvangst levert onder andere een kelderpissebed, larven/nimfen van een halfgevekte eendagsvlieg, gewone slijkvlieg en weidebeekjuffer, gevlekte beekroofkever en kokerjuffers. Na afloop ontvang ik van Jesper een handig 'spiekbriefje' met herkenbare foto's en korte teksten



Er werden heel veel rivierdonderpadden gevangen. (Foto: Hilde Ham)

van gangbare macrofaunasoorten. YouTuber Stephan Tukker stuurt een fenomenaal filmpje (link: https://www.youtube.com/watch?v=eF5sTW4t_AQ). Kijken dus!

Hilde Ham

Macrofaunawerkgroepen KNNV Apeldoorn/Epe Heerde en IVN Apeldoorn


Zegenvisexcursie in de Waal



De excursielocatie bij de Waal. (Foto: Jelger Herder)

Op 18 oktober 2024 was de laatste visexcursie van het seizoen. 's Avonds verzamelden de deelnemers bij de Waal bij Nijmegen waar met behulp van een zegenvis werd gevangen en gedetermineerd. Het was een gezellige en succesvolle avond met enkele bijzondere waarnemingen. De serpeling sprong er dit keer uit als meest opvallende soort (vorig jaar vingen we deze soort slechts één keer in zes excursies (Meinerswijk). Dit jaar hebben we ruim twee keer zoveel vissen gevangen als vorig jaar, voornamelijk door de grote aantallen juveniele grondels (Kaukasische dwerg-, Pontische stroom- en zwartbekgrondels). Ook het aantal soorten lag dit jaar hoger, met 16 soorten in plaats van 11 vorig jaar (zie afbeelding). Deze locatie blijft een topstek voor blauwneuzen, met opnieuw meer dan 20 exemplaren. Wat verder opviel was het hoge aantal Kaukasische dwerggrondels, die we vorig jaar niet hebben gevangen, maar dit jaar in overvloed aanwezig waren.

Jelger Herder



Aantal gevangen individuen per soort.