

Mariene schelpen van Lesbos

Sylvia van Leeuwen

Marine shells of Lesbos

Summary. Based on shells collected on beaches by the author as well as by Mr. Joop Trausel and finds reported in the literature, an inventory of 339 species of marine molluscs of the Greek isle of Lesbos has been drawn up. Recently Lesbos has been a favourite 'stepping stone' for refugees trying to illegally enter the European Union. Now this route virtually has been blocked Lesbos can again be recommended as an interesting destination for those interested in Mediterranean sea shells.

Plekken en soorten

In 2002, 2005 en 2009 brachten Bart van Tooren en ik onze vakantie door op Lesbos. Het Griekse eiland is een bedevaartsoord voor vogelliefhebbers, vooral in de trektijd, en ook de bloemenpracht is in het voorjaar uitbundig en zeer gevarieerd. Door de bijzondere vorm van het eiland, met twee grote baaien die bijna zo groot zijn als binnenzeeën, hoopte ik dat er ook schelpen te vinden zouden zijn – en dat klopte. Lesbos bleek een bijzonder leuk eiland om schelpen te zoeken. Het beste uitgangspunt voor verzameltochten door schelpenliefhebbers is het plaatsje Skala Kalloni dat centraal op het eiland ligt.

Kolpos Kalloni

Langs de stranden rondom de baai van Kalloni (Kolpos Kalloni) is van alles te vinden. Mooie en opvallende soorten zijn twee soorten wenteltrapjes (de gewone: *Epitonium clathrus* en Turtons wenteltrap: *E. turtonis*), Siciliaanse kanaalhorens *Aptyxis syracusanus* (fig. 1), losse kleppen van *Pholades Pholas dactylus*, Mediterrane mantels *Flexopecten glaber* (fig. 2), doubletten van enorm grote driehoekige steekmossels (*Pinna nobilis* (fig. 3) en

P. rudis), Noachs arkschelpen *Arca noae*, Eierschelpen *Gastrea fragilis*, Mediterrane wigschelpen *Donacilla cornea* en Ovale zonneschelpen *Gari depressa*. De baai heeft ondiep en rustig zout water en staat via een zeer nauwe doorgang in verbinding met de Middellandse Zee. Het getijdenverschil is daardoor klein. Hier en daar groeit zeegras.

Kolpos Geras

De baai achter Mytilini, de Kolpos Geras (fig. 4), is min of meer vergelijkbaar, hoewel er deels andere soorten te vinden zijn dan in de Kalloni-baai. We vonden er bijvoorbeeld meerdere soorten plaatschelpen (*Tellinidae*), veel doubletten van de Artemisschelp *Dosinia exoleta* en de laatste keer ook een lid van de kokkel-familie dat relatief nieuw is in de Middellandse Zee: de Fragiele hartschelp *Fulvia fragilis* (fig. 5).

'Buiten kust'

Langs de 'buiten kust' van het eiland zijn we op een paar plekken geweest (onder meer Mytilini, Sigri, Molivos, Eftalou, Vatera,



Fig. 1. Siciliaanse kanaalhoren *Aptyxis syracusanus* van Kolpos Kalloni.



Fig. 2. Mediterrane mantels *Flexopecten glaber* van Kolpos Kalloni.



Fig. 3. Driehoekige steekmossel *Pinna nobilis* van Kolpos Kalloni.



Fig. 4. De baai achter Mytilini, de Kolpos Geras.



Fig. 5. De Fragiele hartschelp *Fulvia fragilis* van de Kolpos Geras.



Fig. 6. Rechtsdraaiende juwelendoos *Chama gryphoides*.



Fig. 7. Het haventje van Skala Sikaminea.



Fig. 8. Geknobbelde helmslak *Galeodea echinophora*.



Fig. 9. Sigri, waar een klein beetje gruis verzameld werd.

Petra, Tsonia en Gavathas). Kaap Fokas (nabij Vatera), Sigri en Gavathas zijn voor schelpenzoekers het meest de moeite waard en ook bij Tsonia en Molivos is wat te vinden. In het haventje van Skala Sikaminea (fig. 7) kun je met wat geluk schelpjes vinden uit wat dieper water en ook lekker eten. In vissershavens langs de buitenkust vonden we onder andere fraaie exemplaren van Rechtsdraaiende juwelendoos *Chama gryphoides* (fig. 6) en Geknobbelde helmslak *Galeodea echinophora* (fig. 8).

Bij de overige plaatsen vonden we erg weinig. Maar met wat geluk kunnen ook daar leuke vondsten gedaan worden. Zo vonden we bij het vliegveld van Mytilini vlak voor vertrek nog een fraaie eierschaal van de Argonaut *Argonauta argo*.

'Gruisplekken'

Op Lesbos is met enig geluk uitstekend gruis te vinden. Veel soorten op de bijgaande lijst zijn dus 'microschelpen'. Ik vind het altijd weer fascinerend hoe fraai deze kleine schelpjes zijn en

wat een enorme variatie aan soorten er in dat gruis zit. Goede plekken om gruis te verzamelen zijn strandjes langs de baai van Kalloni, vooral de stukken van Skala Kalloni naar Parakila en bij Apothika. Ook het kleine beetje gruis dat we bij Sigri (fig. 9), en bij Kaap Focas (nabij Vatera) verzamelden bevatte veel kleine soorten.

Recente ontwikkelingen

In 2002 was het eiland nog zeer weinig toeristisch en relatief onbekend. Wij waren zo enthousiast over het eiland dat ik besloot een website te maken met informatie over wandelen en natuur op Lesbos. Die website is tot vorig jaar 'on line' geweest via onze vroegere provider, maar een jaar geleden kreeg ik bericht dat ze met die service stopten. Sindsdien is hij uit de lucht. Ik ben er nog niet aan toe gekomen om de website ergens anders onder te brengen.

Helaas is Lesbos de afgelopen jaren ook op heel andere wijze

Soortenlijst schelpen van Lesbos

De namen zijn aangepast aan de geldige namen volgens het World Register of Marine Species (www.marinespecies.org). Omdat er de laatste tijd zoveel namen veranderd zijn dat het nauwelijks meer bij te houden is, heb ik soms de oude naam van een soort er tussen haakjes achter gezet. De meeste soorten hebben we dood op het strand gevonden. De lijst is aangevuld met vondsten van Joop Trausel (persoonlijke mededeling) en soorten gerapporteerd door Evagelopoulos *et al.* (2015).

Gastropoda - slakken

Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758)
Alvania aspera (Philippi, 1844)
Alvania cancellata (da Costa, 1778)
Alvania carinata (da Costa, 1778)
Alvania cimax (Linnaeus, 1758)
Alvania cimicoides (Forbes, 1844)
Alvania discors (T. Allan, 1818)
Alvania geryonia (Nardo, 1847)
Alvania hirta (Monterosato, 1884)
Alvania lactea (Michaud, 1830)
Alvania lanciae (Calcara, 1845)
Alvania lineata Risso, 1826
Alvania litoralis (Nordsieck, 1972)
Alvania mamillata Risso, 1826
Alvania rudis (Philippi, 1844)
Alvania scabra (Philippi, 1844)
Alvania testae (Aradas & Maggiore, 1844)
Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)
Aptyxis syracusana (Linnaeus, 1758) (*Fusinus syracusanus*)
Atys jeffreysi (Weinkauff, 1866)
Barleeia unifasciata (Montagu, 1803)
Basisulcata lepida (Bayer, 1942)
Bela zonata (Locard, 1891)
Bittium latreillii (Payraudeau, 1826)
Bittium reticulatum (da Costa, 1778)
Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
Bulla striata Bruguière, 1792
Caecum armoricum de Folin, 1869
Caecum auriculatum de Folin, 1868
Caecum clarkii Carpenter, 1859
Caecum trachea (Montagu, 1803)
Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)
Calliostoma laugierii (Payraudeau, 1826)
Calyptrea chinensis (Linnaeus, 1758)
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758)
Ceratia proxima (Forbes & Hanley, 1850)
Cerithiopsis micalii (Cecalupo & Villari, 1997)
Cerithiopsis minima (Brusina, 1865)
Cerithiopsis scalaris Locard, 1891
Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)
Cerithium aluacstrum (Brocchi, 1814)
Cerithium lividulum Risso, 1826
Cerithium renovatum Monterosato, 1884
Cerithium scabridum Philippi, 1848
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Chauvetia brunnea (Donovan, 1804)
Chrysallida interstincta (J. Adams, 1797) (*C. obtusa*, *Parthenina interstincta*)
Chrysallida spiralis (Laseron, 1959)
Cima cylindrica (Jeffreys, 1856)
Clanculus corallinus (Gmelin, 1791)
Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758)
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)
Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
Conus ventricosus Gmelin, 1791 (*C. mediter-*

raeus)
Crepidula moulinsii Michaud, 1829 (*C. gibbosa*)
Crepidula unguiformis Lamarck, 1822
Crisilla semistriata (Montagu, 1808)
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)
Danilia otaviana (Cantraine, 1835)
Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
Diodora graeca (Linnaeus, 1758)
Diodora italica (Defrance, 1820)
Dizoniopsis coppolae (Aradas, 1820)
Ebala nitidissima (Montagu, 1803)
Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791) (*Littorina punctata*)
Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803)
Emarginula adriatica O. G. Costa, 1830
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)
Emarginula octaviana Coen, 1939
Enginella leucozona (Philippi, 1844) (*Engina bicolor*)
Episcomitra cornicula (Linnaeus, 1758) (*Mitra cornicula*)
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)
Epitonium turtonis (W. Turton, 1819)
Erato voluta (Montagu, 1803)
Eulima bilineata Alder, 1848
Eulimella acicula (Philippi, 1836)
Euparthenia bulinea (R. T. Lowe, 1841)
Euspira guilleminii (Payraudeau, 1826) (*Lunatia guilleminii*)
Euspira intricata (Donovan, 1804) (*Payraudeautia intricata*)
Euspira nitida (Donovan, 1804) (*Lunatia pulchella*)
Euthria cornea (Linnaeus, 1758) (*Buccinulum corneum*)
Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
Folinella excavata (Philippi, 1836) (*Chrysallida excavata*)
Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758)
Fusinus parvulus (Monterosato, 1884)
Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758) (*Cassidaria echinophora*)
Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
Gibberula oryza (Lamarck, 1822)
Gibberula philippii (Monterosato, 1878)
Gibbula albida (Gmelin, 1791)
Gibbula guttadauri (Philippi, 1836)
Gibbula magus (Linnaeus, 1758)
Granulina clandestina (Brocchi, 1814)
Granulina marginata (Bivona, 1832)
Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822)
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 (ook forma *lamellosa*)
Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758)
Haminoea navicula (da Costa, 1778)
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)
Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758)
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)
Iothia fulva (O. F. Müller, 1776)
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)
Jujubinus gravinae (Dautzenberg, 1881)
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)
Macromphalus cf. abylenis Warén & Bouchet, 1988
Mangelia attenuata (Montagu, 1803)
Mangelia costulata Risso, 1826
Mangelia paciniana (Calcara, 1839)
Mangelia taeniata (Deshayes, 1835)
Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835) (*M. rugosula*)
Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826)

Manzonina crassa (Kanmacher, 1798)
Megastomia conoidea (Brocchi, 1814) (*Odostomia conoidea*)
Melanella levantina (Oliverio, Buzzurro & Villa, 1994) (*Vitreolina levantina*)
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)
Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826)
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)
Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)
Mitromorpha columbellaria (Scacchi, 1836)
Monophorus perversus (Linnaeus, 1758)
Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)
Naticarius hebraeus (Martyn, 1786)
Naticarius stercusmuscarum (Gmelin, 1791)
Neverita josephina Risso, 1826
Noemiamea dolioliformis (Jeffreys, 1848)
Ocenebra edwardsii (Payraudeau, 1826)
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)
Ocenebrina aciculata (Lamarck, 1822)
Odostomella doliolum (Philippi, 1844)
Odostomia acuta Jeffreys, 1848
Odostomia kromi van Aartsen, Menkhurst & Gittenberger, 1984
Odostomia plicata (Montagu, 1803)
Odostomia rissioformis Milaschewitsch, 1909
Odostomia turriculata Monterosato, 1869
Odostomia turrita Hanley, 1844
Ondina vitrea (Brusina, 1866)
Paludinella sicana (Brugnone, 1876)
Parthenina interstincta (J. Adams, 1797) (*Chrysallida interstincta*)
Parthenina juliae (de Folin, 1872) (*Chrysallida juliae*)
Parthenina palazzii (Micali, 1984) (*Chrysallida palazzii*)
Parthenina suturalis (Philippi, 1844) (*Chrysallida suturalis*)
Parthenina terebellum (Philippi, 1844) (*Chrysallida terebellum*)
Patella caerulea Linnaeus, 1758
Patella rustica Linnaeus, 1758
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791
Philine catena (Montagu, 1803)
Philine quadripartita Ascanius, 1772
Phorcus articulatus (Lamarck, 1822) (*Osilinus articulatus*)
Phorcus mutabilis (Philippi, 1851) (*Monodonta mutabilis*)
Phorcus richardi (Payraudeau, 1826) (*Gibbula richardi*)
Phorcus turbinatus (Born, 1778) (*Osilinus turbinatus*)
Pirenella conica (Blainville, 1829)
Pisania striata (Gmelin, 1791)
Polia scabra Locard, 1891 (*Cantharus scabra*)
Pusia ebenus (Lamarck, 1811) (*Vexillum ebenus*)
Pusia granum (Forbes, 1844) (*Vexillum granum*)
Pusia savignyi (Payraudeau, 1826) (*Vexillum savignyi*)
Pusillina lineolata (Michaud, 1830)
Pusillina marginata (Michaud, 1830)
Pusillina munda (Monterosato, 1884)
Pusillina philippii (Aradas & Maggiore, 1844)
Pusillina radiata (Philippi, 1836)
Pyrgiscus rufus (Philippi, 1836) (*Turbonilla rufa*)
Raphitoma laviae (Philippi, 1844)
Raphitoma linearis (Montagu, 1803)
Raphitoma philberti (Michaud, 1829)
Retusa laevisculpta (Granata-Grillo, 1877)

Retusa leptoneilema (Brusina, 1866)
Retusa truncatula (Bruguière, 1792)
Ringicula auriculata (Ménard de la Groye, 1811)
Rissoa auriscalpium (Linnaeus, 1758)
Rissoa guerinii Récluz, 1843
Rissoa lia (Monterosato, 1884)
Rissoa membranacea (J. Adams, 1800)
Rissoa monodonta Philippi, 1836
Rissoa rodhensis Verduin, 1985 (*Alvania rod-hensis*)
Rissoa similis Scacchi, 1836
Rissoa splendida Eichwald, 1830
Rissoa variabilis (Megerle von Mühlfeld, 1824)
Rissoa ventricosa Desmarest, 1814
Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826)
Semicassis granulata undulata (Gmelin, 1791) (*Phalium undulatum*)
Setia turriculata Monterosato, 1884
Smaragdina souverbiana (Montrouzier in Sou-verbie & Montrouzier, 1863)
Smaragdina viridis (Linnaeus, 1758)
Spiralinella incerta (Milaschewich, 1916)
Steromphala adansonii (Payraudeau, 1826) (*Gibbula adansonii*)
Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758) (*Gib-bula divaricata*)
Steromphala rarilineata (Michaud, 1829) (*Gib-bula rarilineata*)
Steromphala umbilicaris (Linnaeus, 1758) (*Gibbula umbilicaris*)
Steromphala varia (Linnaeus, 1758) (*Gibbula varia*)
Syrnola fasciata Jickeli, 1882
Tarantinaea lignaria (Linnaeus, 1758) (*Fascio-laria lignaria*)
Tectura virginea (O. F. Müller, 1776)
Tonna galea (Linnaeus, 1758)
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803)
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)
Tricolia speciosa (Megerle von Mühlfeld, 1824)
Tricolia tenuis (Michaud, 1829)
Tritia corniculum (Olivi, 1792) (*Nassarius corniculum*)
Tritia cuvierii (Payraudeau, 1826) (*Nassarius cuvierii*)
Tritia incrassata (Strøm, 1768) (*Nassarius incrassata*)
Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758) (*Nassarius mutabilis*)
Tritia neritea (Linnaeus, 1758) (*Cyclope*)
Tritia nitida (Jeffreys, 1867) (*Nassarius*)
Tritia pygmaea (Lamarck, 1822) (*Nassarius*)
Trivia arctica (Pulteney, 1799)
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767)
Turbonilla acuta (Donovan, 1804)
Turbonilla acutissima Monterosato, 1884
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758)
Turbonilla pusilla (Philippi, 1844)
Turbonilla scalaris Vélain, 1877
Turritella communis Risso, 1826
Typhinellus labiatus (de Cristofori & Jan, 1832)
Vermetus triquetrus Bivona-Bernardi, 1832
Vexillum granum (Forbes, 1844)

Bivalvia - Tweekleppigen

Abra alba (W. Wood, 1802)
Abra segmentum (Récluz, 1843)
Abra tenuis (Montagu, 1803)
Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758)
Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758)

Acanthocardia paucicostata (G. B. Sowerby II, 1834)
Acanthocardia spinosa (Lightfoot, 1786)
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)
Anadara gibbosa (Reeve, 1844)
Anomia ephippium Linnaeus, 1758
Arca noae Linnaeus, 1758
Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846) (*Tellina pygmaea*)
Azorinus chamasolen (da Costa, 1778)
Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)
Barnea candida (Linnaeus, 1758)
Bornia sebetia (O. G. Costa, 1830)
Bosemprella incarnata (Linnaeus, 1758) (*Telli-na incarnata*)
Callista chione (Linnaeus, 1758)
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)
Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758)
Centrocardita aculeata (Poli, 1795) (*Glans*)
Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)
Chama gryphoides Linnaeus, 1758
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Clausinella fasciata (da Costa, 1778)
Corbula gibba (Olivi, 1792)
Ctena decussata (O. G. Costa, 1829)
Donacilla cornea (Poli, 1791)
Donax semistriatus Poli, 1795
Donax trunculus Linnaeus, 1758
Donax venustus Poli, 1795
Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758)
Ensis ensis (Linnaeus, 1758)
Ensis minor (Chenu, 1843)
Ervilia castanea (Montagu, 1803)
Fabulina fabula (Gmelin, 1791) (*Tellina fabula*)
Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)
Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758)
Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775)
Gari depressa (Pennant, 1777)
Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758)
Gibbomodiolia adriatica (Lamarck, 1819) (*Mo-dioliolus adriaticus*)
Glans trapezia (Linnaeus, 1767)
Globivenus effossa (Philippi, 1836)
Glycymeris bimaculata (Poli, 1795)
Glycymeris nummularia (Linnaeus, 1758) (G. *insubrica*, G. *violascens*)
Glycymeris pilosa (Linnaeus, 1767)
Gouldia minima (Montagu, 1803)
Gregariella petagnae (Scacchi, 1832)
Gregariella semigranata (Reeve, 1858)
Hemilepton nitidum (W. Turton, 1822)
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Irus irus (Linnaeus, 1758)
Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) (*Mysella bidentata*)
Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)
Lajonkairia lajonkairii (Payraudeau, 1826) (*Petricola lajonkairii*)
Lajonkairia substriata (Montagu, 1808) (*Petri-cola substriata*)
Lasaea adansonii (Gmelin, 1791) (L. *rubra* (Montagu, 1803))
Lembulus pella (Linnaeus, 1758) (*Nuculana*)
Lentidium mediterraneum (O. G. Costa, 1830)
Lima lima (Linnaeus, 1758)
Limaria loscombi (G. B. Sowerby I, 1823)
Limaria tuberculata (Olivi, 1792) (L. *inflata*)
Loripes orbiculatus Poli, 1791 (L. *lucinalis*)
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758)
Macomangulus tenuis (da Costa, 1778) (*Angu-lus tenuis*)

Macra stultorum (Linnaeus, 1758) (ook forma *alba*)
Manupecten pesfelis (Linnaeus, 1758)
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)
Moerella distorta (Poli, 1791) (*Tellina*)
Moerella donacina (Linnaeus, 1758) (*Tellina donacina*)
Musculus costulatus (Risso, 1826)
Musculus subpictus (Cantraine, 1835)
Mytilaster marioni (Locard, 1889)
Mytilaster minimus (Poli, 1795)
Mytilaster solidus Monterosato, 1883
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)
Nucula sulcata Bronn, 1831
Ostrea edulis Linnaeus, 1758
Ostrea stentina Payraudeau, 1826
Papillicardium papillosum (Poli, 1791) (*Pla-giocardium papillosum*)
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) (ook forma *siculum*)
Parvicardium minimum (Philippi, 1836)
Parvicardium scriptum (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892)
Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)
Peronaea planata (Linnaeus, 1758) (*Tellina*)
Peronidia albicans (Gmelin, 1791) (*Tellina*)
Petricola lithophaga (Retzius, 1788)
Pholas dactylus Linnaeus, 1758
Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814)
Pinna nobilis Linnaeus, 1758
Pinna rudis Linnaeus, 1758
Pitar rudis (Poli, 1795)
Polititapes aureus (Gmelin, 1791) (*Paphia*)
Pseudamussium clavatum (Poli, 1795)
Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819)
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758)
Rocellaria dubia (Pennant, 1777) (*Gastrochae-na*)
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) (*Tapes*)
Septifer cumingii Récluz, 1848
Solecurtus strigilatus (Linnaeus, 1758)
Solen marginatus Pulteney, 1799
Spisula subtruncata (da Costa, 1778)
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758
Striarca lactea (Linnaeus, 1758)
Talochlamys multistriata (Poli, 1795)
Thracia pubescens (Pulteney, 1799)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)
Venerupis geographica (Gmelin, 1791)
Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Cephalopoda- Inktvisen

Argonauta argo Linnaeus, 1758
Sepia spec.

Polyplacophora - Keverslakken

Chiton olivaceus Spengler, 1797

Scaphopoda - Olifantstandjes

Antalis dentalis (Linnaeus, 1758)
Antalis vulgaris (da Costa, 1778)
Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825)

Adres van de auteur
 fbsylvia@xs4all.nl