



Koningin van Europese hoornaar in nestkast met nog incompleet legsel van Bonte Vliegenvanger (plus een ei van Pimpelmees), Berkenheuvel, 8 mei 2023 (Foto: Rob Bijlsma). Deze wespensoort is de afgelopen decennia een vaste prooi van Nederlandse Wespendienven geworden. Met spanning wachten we het moment af waarop Aziatische hoornaars in de voedsellijsten van Nederlandse Wespendienven gaan opduiken. *Queen of European Hornet in nestbox with incomplete clutch of Pied Flycatcher (and 1 Blue Tit egg). Broods of European Hornets are frequently taken as food by Dutch Honey Buzzards, but not yet broods of Asian Hornets.*

Een werkgroep om trots op te zijn

Hanneke Sevink

De dagen lengen, het licht keert terug, de drang om naar buiten gaan is onweerstaanbaar. Weken achter het bureau worden verwisseld voor struinen door velden en bossen. Heerlijk om het gekekker van de Haviken, het diepe krok-krok van de Raven en de mauwende Buizerds weer te horen. Je wilt het niet missen, je moet naar buiten. De start van het broedseizoen waarin uiteindelijk honderden roofvogelaars duizenden paartjes en hun broedprestaties in beeld proberen te krijgen. Het resultaat na maanden intensief veldwerk is te lezen in het eerste nummer van De Takkeling. Gezamenlijk leveren we elk jaar een enorme prestatie, een prestatie die nog waardevoller is omdat we het al decennia lang voor elkaar krijgen. Daar wil ik graag ieder van ons een groot compliment voor geven.

Waar menig roofvogelaar het invullen van de nestkaarten al een enorme klus vindt, voert Rob in de herfst de duizenden nestkaarten in (sinds 1996, toen het landelijke nestkaartproject van start ging) om te komen tot een overzicht van de broedresultaten. Waarvoor grote dank.

Juist langlopend onderzoek laat zien wat er in de natuur gaande is. Het geeft invulling aan de kreet: 'De natuur staat op omvallen'. Langlopend onderzoek op landelijke schaal laat de ontwikkelingen in populaties goed zien. Naast vestigingen en toenames, denk aan Vis- en Zeearend, laten meerdere roofvogelsoorten een achteruitgang zien. Ik noem er een paar: Wespendif, Havik, Torenvalk, Blauwe Kiekendief.

De resultaten van ons onderzoek worden steeds vaker gebruikt om aan terreineigenaren (van groot tot klein, particulier en overheid) duidelijk te maken welke van de door hen geplande ingrepen in de natuur niet kunnen in verband met de roofvogels die er leven. In de meest recente gedragscode soortenbescherming bosbeheer kwam ik een lichtpuntje tegen: 'Standaard binnen 50 meter van een bijzondere nestboom waarin zich een bewoond nest bevindt worden geen vellingswerkzaamheden uitgevoerd. *Een ecologisch deskundige bepaalt wanneer in welk specifiek geval een grotere afstand moet worden aangehouden.*' Wij zijn bij uitstek die deskundigen waarover hier wordt geschreven! Dat zijn we op grond van ons intensieve en jarenlange veldwerk en onze specifieke kennis (inclusief de gepubliceerde wetenschap) ingebed in de ruime leefomgeving. Laten we die positie goed gebruiken in onze strijd voor de natuur!