

schrijving, een beschrijving van de standplaats, die vaak zeer goed is, enkele woorden over de waarde voor de keuken, en een opsomming van die soorten, waarmee de behandelde soort mogelijk verward zou kunnen worden.

In deel 1 slaat de auteur de plank nogal eens mis met het citeren van auteursnamen; in deel 2 zijn er in dat opzicht slechts enkele onjuistheden.

Bovenstaande critiek neemt niet weg, dat deze boekjes de wens naar vervolgendeeltes doen opkomen. Er zijn nog zo ontzaglijk veel fungi, die we graag op dezelfde voortreffelijke manier afgebeeld zouden willen zien.

R.A. Maas Geesteranus.

VERSLAG FLORACOMMISSIE 4

BOLETENMIDDAG 31 JULI

Aanwezig waren een 16-tal leden. Het aantal soorten boleten, dat bijeengebracht was, viel nogal mee, niettegenstaande de geringe rijkdom aan boleten in de natuur. Het waren meest de gewone soorten, die ter tafel kwamen, zoals: Boletus badius, B. felleus, B. luteus, B. granulatus, B. scaber, B. subtomentosus, B. elegans, B. variegatus, B. luridus, B. edulis, B. edulis var. pinicola, B. calopus en B. rufescens.

Speciale vermelding verdient hier B. pulverulentus, die altijd vrij zeldzaam is.

Opvallend was het verschil in poriënwijde tussen exemplaren van B. granulatus gevonden bij Dorst (bij Breda) en exemplaren afkomstig van Bergen in Noord-Holland. De exemplaren van Dorst hadden wijdere poriën.

Aardig was ook een vondst van Boletus Castaneus bij Oosterhout.

Van het Rijksherbarium waren exsiccaten aanwezig. Verder waren er vele boekwerken en platen bijeen gebracht.

De heren Huysman en de Vries hielden een korte voordracht resp. over de kenmerken, waarop men bij het determineren van boleten moet letten en over de systematische indeling van het geslacht Boletus.

Baarn.

G.A. de Vries.

TRICHOLOMA SULFUREUM GEVRAAGD.

In verband met een speciaal onderzoek zou de heer J.A. Schravensande, Engelsestraat 72 te Rotterdam gaarne de beschik-