

RESULTATEN DER EXCURSIES.

Hieronder volgen de belangrijkste vondsten van de excursies van het afgelopen jaar. Voor alle excursies geldt, dat de paddestoelen even schaars waren als de deelnemers. De met ! aangegeven soorten zijn in de collectie opgenomen.

1. EXCURSIE WINTERSWIJK EN OMGEVING, 30 IX 1956.

Basidiomycetes

<i>Amanita gemmata</i>	<i>Mycena epipterygioides</i>
<i>Boletus Felleus</i>	<i>Ramaria stricta</i> !
<i>Clitocybe clavipes</i>	<i>Rhodophyllus cetratus</i>
<i>Clitopilus septicoides</i> !	<i>Russula emetica</i>
<i>Collybia tuberosa</i>	- <i>fragilis</i>
<i>Galerina tenera</i>	- <i>ochroleuca</i>
<i>Hypholoma capnoides</i>	- <i>paludosa</i>
<i>Lactarius camphoratus</i>	<i>Tylopilus felleus</i>
- <i>quietus</i>	<i>Tyromyces fragilis</i> !
- <i>turpis</i>	

2. EXCURSIE VOORNE, 6-7 X 1956.

(M) = Oostvoorne, Mildenburg; (O) = duinen bij Oostvoorne; (Q) = Rockanje, Quackjeswater.

Basidiomycetes

<i>Bovista plumbea</i> (O)!	<i>Radulum radula</i> (O)!
<i>Caldesiella ferruginosa</i> (Q)!	<i>Ramaria ochraceovirens</i> (M)!
<i>Calocybe ionides</i> (M)	<i>Russula font-queri</i> (Q)!
<i>Clavulinopsis corniculata</i> (O)!	<i>Solenia confusa</i> (Q)!
<i>Dictyolus muscigenus</i> (M)!	<i>Tubaria autochthona</i> (M)!
<i>Geastrum minimum</i> (O)!	<i>Tulostoma brumale</i> (M)!
- <i>rufescens</i> (M, O)!	<i>Tyromyces caesius</i> (O)!
- <i>triplex</i> (O)!	<u>Ascomycetes</u>
<i>Lepiota subalba</i> (M)!	<i>Pustularia cupularis</i> (M)!
<i>Lycoperdon molle</i> (M, O)!	<i>Rutstroemia echinophila</i> (M)!
<i>Psathyrella subatrata</i> (M)!	<i>Sepultaria arenosa</i> (M)!

3. EXCURSIE HULSHORST-EN OMGEVING, 13-14 X 1956.

Basidiomycetes

<i>Amanita porphyria</i> !	<i>Rhodophyllus mammosus</i> !
<i>Cortinarius mucosus</i>	<i>Russula schiffneri</i>
- <i>obtus</i> !	- <i>xerampelina</i> var. <i>erythropoda</i>
<i>Craterellus infundibuliformis</i> !	<i>Sarcodon imbricatus</i> !
<i>Hydnum repandum</i> !	<i>Scleroderma bovista</i> !
<i>Gyroporus cyanescens</i>	<i>Tricholoma equestre</i> !
<i>Marasmius cohaerens</i> !	<i>Tricholoma portentosum</i> !
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	<i>Tyromyces fragilis</i>
<i>Phaeomarasmius aridus</i> !	<u>Ascomycetes</u>
(= <i>Naucoria erinacea</i>)	<i>Cordyceps ophioglossoides</i>
<i>Phellodon tomentosus</i> !	<i>Coryne urnalis</i> !
<i>Pleurotus dryinus</i> !	<i>Onygena corvina</i> !

4. EXCURSIE CASTRICUM, GEVERSDUIN, 21 X 1956.

Basidiomycetes

<i>Lepiota castanea</i> (overgang naar <i>L. ignipes</i>)!	<i>Rhodophyllus sericeus</i> !
<i>Melanoleuca melaleuca</i> !	- <i>staurosporus</i> !
<i>Omphalia pyxidata</i> !	- <i>versatilis</i> !
<i>Panellus stipticus</i> var. <i>albus</i> !	<u>Ascomycetes</u>
<i>Rhodophyllus asprellus</i> !	<i>Geoglossum cookeianum</i> !
- <i>sericellus</i> !	<i>Helvella elastica</i> !
	<i>Trichoglossum hirsutum</i> !

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DER FLORACOMMISSIE TE AMSTERDAM
OP 27 OCT. 1956.

Deze bijeenkomst werd op het Hugo de Vries-Laboratorium gehouden. Sprekers waren G. L. van Eyndhoven (Geastrum in wijdere zin, Tulostoma en Disciseda), R. A. Maas Geesteranus (Bovista, Bovistella, Calvatia, Disciseda en Lycoperdon), en M. A. Donk (Inleiding, Sphaerobolaceae en Nidulariaceae).

De twee eerste sprekers lieten vooral zien op welke kenmerken men moet letten bij het herkennen van de soorten, de laatste ging wat uitvoeriger in op het merkwaardige mechanisme waardoor bij Crucibulum en Cyathus de peridiolen worden verspreid.