

nl. één op 3 maart, waarbij het mycologisch werk in Leiden in de belangstelling stond, en één op 27 oktober in Amsterdam, gewijd aan de Gastromyceten. Verder organiseerde zij een weekend op Voorne op 6 en 7 oktober en een dagexcursie naar Castricum op 21 oktober.

De Vereniging hield op 30 september een dagexcursie te Winterswijk (tevens propaganda-excursie) en op 13 en 14 oktober een weekendexcursie naar Hulshorst.

EEN MYCOLOGISCH PROBLEEM

Dat het pad van een redacteur niet over rozen gaat, bleek mij onlangs weer eens overduidelijk, toen onze zo actieve heer Bas een noodkreet tot mij richtte om copie voor Coolia. Aangezien het afgelopen seizoen voor mij uitgesproken slecht was geweest, was ik wel genoodzaakt om een duik te nemen in de archieven.

Ik zou dan Uw aandacht willen vragen voor een kleine vaalbruine, roodverkleurende melkzwam, die ik, als ik me dat nog goed herinner, voor het eerst vele jaren geleden op een excursie in Over-Holland zag, waar men hem betitelde met de naam Lactarius fuliginosus Fr. Ik heb die exemplaren toen zelf niet kunnen onderzoeken.

In 1953 en wel om precies te zijn op een excursie, die op 18 oktober naar Oud-Amelisweert bij Utrecht, eveneens een loofbos op klei, gehouden werd, werden er vele exemplaren verzameld, waarvan ik er toen zelf ook enkele heb kunnen meenemen. Hoe groot was mijn verbazing, toen ik thuis gekomen, bij microscopisch onderzoek ontdekte, met sporen te maken te hebben, die, in Melzer's reagens bekeken, grote kammen vertoonden, zoals op de sporen van Russula laurocerasi Melz.

Nu was ik in die tijd pas sedert kort de gelukkige eigenaar geworden van de bij vele mycologen reeds beroemde "Flore analytique des Champignons Supérieurs" van Kühner en Romagnesi en dit boek moest mij wel, zo dacht ik, de oplossing aan de hand doen. Op bladzijde 478 vindt men daar de determineertabel van de "Fuliginosi", donkerbruine melkzwammen, die rose of rood verkleuren en waartoe de soort ongetwijfeld behoorde. De exemplaren vertoonden in het midden der hoed een indeuking. Het kon daarom geen L. lignyotus Fr. zijn, die een duidelijke spitse bochel heeft. Deze laatste soort komt slechts in sparrenbossen voor, in de bergen. Lactarius acris Fr. ex Bolt. kon het al evenmin zijn, want van deze moest de melk binnen de minuut intensief rose-rood verkleuren. Ook het vlees wordt

vervolg pag.14