


VOGELNESTZWAMMETJES

Deze aardige paddestoeltjes behoren tot de buikzwammen (Gastromyceten). De algemene vorm varieert van een $\pm$ rond slap zakje tot een stevig kommetje of bekertje. De sporen worden gevormd op basidiën in de eitjes (peridiolen). Bij het rijp worden gaat de paddestoel aan de bovenzijde open door verwerking of door middel van een dekseltje (epiphragma) en de eitjes worden als er een regendruppel in een bekertje valt weggespat. Er komen in Nederland minstens 5 soorten voor. Meestal groeien ze op hout of op de grond bij houtresten, soms op dode plantenstengels en bladeren, soms op mest.




Nidularia farcta



Crucibulum vulgare

1. Paddestoel een stevige beker of kroes, in jeugd met dekseltje, eitjes met een fijne navelstreng aan de wand vastzittend en niet kleverig 3.
1. P. een licht okerkleurig tot vuilbruin, $\pm$ rond, dunwandig zakje, bobbelig door uitpuilende eitjes, door verwerking ontstaat een meest onregelmatige opening, eitjes glanzend donkerbruin, losliggend en bij vocht kleverig. Zeldzaam. Meestal op takjes Eierzakje
(Nidularia Farcta (Roth ex Pers.) Fr. = ? N.confluens Fr. et Nordh.)
(slecht bekend, misschien enkele soorten).




Cyathus striatus



Cyathus stercoreus

2. P. bekervormig, wand op doorsnede gelijkmatig dun, eitjes lichtgrijs tot donkergrijs of zwartig, deksel wittig 3.
2. P. + kroesvormig, wand op doorsnede naar basis steeds dikker, eitjes wittig of licht geelbruin, buitenwand okergeel tot licht geelbruin, eerst donzig dan viltig, dekseltjes + oranjegeel, binnenwand glad lichtgelig tot lichtgrijs. Algemeen. Op hout, soms op mest Geel Nestzwammetje
(*Crucibulum laeve* (Bull.) ex D.C. = *C. vulgare* Tul)
3. Bekerrand aan binnenzijde glad 4.
3. Bekerrand aan binnenzijde gestreept, buitenzijde sterk bruin warrig harig. Algemeen. Op bodem of op hout Gestreept Nestzwammetje
(*Cyathus striatus* (Huds.) ex Pers.)



Cyathus olla

4. Eitjes 2-3.5 mm, eerst lichtgrijs dan donkergrijs, binnenzijde van bekertje lichtgrijs, naar basis donkerder, p. eerst bekervormig later uitgebogen vlakke rand, buitenzijde lichtbruin vlokkig viltig, spoedig kaal en grijsig. Vrij algemeen. Op en bij plantenresten Bleek Nestzwammetje
(*Cyathus olla* (Batsch.) ex Pers.)
4. Eitjes 1-2 mm, van aanvang af zwartig, binnenzijde van bekertje donkergrijs tot zwartig, p. bekervormig, buitenzijde lichtbruin, iets wollig later viltig. Zeer zeldzaam. Op mest, soms op hout Mest-nestzwammetje
(*Cyathus stercoreus* (Schw.) De Toni)