




2.30 uur van 't Haasje.

De kosten zijn:
 f 1.-- voor het
 overnachten, f 1.75
 voor soepmaaltijd
 (soep met brood).
 Men dient mee te
 brengen: lakens, de-
 kens en brood. Dran-
 ken verkrijgbaar.

Opgeven vóór 18 sept. bij de heer P.B. Jansen, Meerten Verhoffstraat 9, Breda (tel. 01600 - 5307), onder gelijktijdige storting van f 2.75 op giro 90902 t.n.v. penningmeester Ned. Myc. Ver. te Amsterdam.

PADDESTOELEN VAN DORST EN OMGEVING

Nu de Myc. Ver. in september een weekend organiseert in de gem. Oosterhout (N.B.) is het voor onze lezers wel de moeite waard om eens te vernemen, wat we daar al zo kunnen vinden. (Ik wil me beperken tot de Agaricaceeën) Het terrein, dat we het meest bezoeken, is oorspronkelijk stuifzand, zoals de Drunense duinen. Een 50 jaar geleden is echter het grootste deel ervan bebost, zodat er nu alleen nog maar een klein stukje stuifzand over is: „het Cadettenkamp”, gelegen ten N. van de spoorlijn Breda-Tilburg. De bossen zouden echter niet zo interessant zijn, indien er niet een aantal leemkuilen waren waar de leem is uitgegraven voor een tweetal steenfabrieken.

Tegenwoordig gaat de leemwinning zo in zijn werk, dat eerst het zand met bulldozers wordt weggeschoven, daarna wordt de leem afgegraven en per smalspoor vervoerd, ten slotte worden de ontstane plassen weer gedempt en hierop wordt bos aangeplant. Deze bossen zijn nog jong en mycologisch nog niet erg interessant. Bijzonder rijk is echter de directe omgeving van het smalspoor en verschillende sloten, waardoor vroeger leemhoudend water is afgevoerd. Ook zijn er enkele complexen Douglasdennen waar de grond sterk leemhoudend is. Onder deze Douglasdennen vinden we bijzonder veel.

Ten slotte zijn er enkele moerassige stukjes met Elzen en Wilgen, ook bijzonder rijk aan minder algemene soorten. Van dit Elzen- en Wilgenplekje kunnen we vermelden Gyrodon lividus, de elzenboleet, die er dikwijls in groot aantal te vinden is, gemakkelijk herkenbaar aan de aflopende, zeer korte buisjes. Een prachtige Cortinarius, nl. concinus

groeit er ook overvloedig; deze oranje-rode, forse paddestoel komt evenals Gyrodon onder Elzen voor. De kleine Cortinarius pulchellus komen we daar ook nog al eens tegen. Naast de algemene Mycena pura, het elfenschermpje, staat er ook Mycena pseudopura, met iets aflopende lamellen en niet amyloide sporen. Tussen riet aan de rand van een leemkuil vonden we in 1955 veel Hypholoma subericaea en ook Inocybe calospora. Vanzelfsprekend komen we er diverse soorten Alnicola's tegen, meest phaea en escharoides.

U ziet: deze Elzenbosjes alleen al zijn een reis naar Dorst waard. Maar de omgeving van het smalspoor biedt ons nog veel meer. Begin Oct. 1955 verzamelde ik een pracht ex. van Coolia odorata, sinds vele jaren in ons land niet meer gevonden. Het aantal soorten Inocybe's is bijzonder groot, ik noem slechts dulcamara, eutheles, grammata, obscura en obsoleta. Ook vinden we er veel Lepiota soorten, bijv. de fraaie seminuda, een klein wit parasolzwammetje; Lep. Clypeolaria met zijn lange sporen en de zeldzame Lep. echinacea.




fig. 1

Coolia odorata

Van de weinig bekende Psalliota soorten noemen we de forse witte abruptibulba, die in dennenbossen groeit, en de kleine purpurascens, met purperkleurige schubjes op de hoed.

Het geslacht Mycena is goed vertegenwoordigd, we vonden op bemoste wilgen vele soorten schorsmycena's. Deze zullen echter eind sept. nog wel niet aanwezig zijn; oct. en nov. is de tijd, dat we ze kunnen verwachten. In de natte zomer van 1956 vonden we enkele ex. van Mycena adonis, met prachtig rose-rode hoed. Mycena acicula is algemeen op takjes en ook wel op bemoste bomen. Een aardige vondst was ook Mycena rorida, die een dikke geleilaag om de steel heeft. De hoedhuid van deze soort bestaat uit ronde cellen.

Wie zijn hart heeft verpand aan het geslacht Drosophila kan ook in Dorst terecht. Om enkele aardige soorten te noemen: op oude boomstompen groeit Dros. pygmaea, die zoveel lijkt op het grijze streephoedje, Coprinus dissiminator. Hij is microscopisch direct te herkennen aan de gekroonde cystiden. Een ander soort met gekroonde cystiden is Dros. olympiana, die op takjes groeit. Op de stengels van oude lisdodden, vlak boven het water, vinden we kleine Dros. typhae. Als men deze ziet, zou men hem voor een Naucoria houden.

Deze korte kris-kras opsomming zal elke mycoloog doen watertanden.

Wij geven U de raad, houdt het weekend 28-29 sept. vrij en kom naar „het Haasje“.

Meerten Verhoffstr. 9, Breda

P.B. Jansen

AFWIJKENDE VORMEN VAN CLAVARIA FISTULOSA, LEOTIA LUBRICA en
CORDICEPS OPHIOGLOSSOIDES

Vergroeiingen, die naar analogie van de Phanerogamen, fasciaties worden genoemd, zijn bij paddestoelen niet zeldzaam. Het meest komt voor een vergroeiing alleen aan de basis of een totale vergroeiing („fasciatie“ in engere zin). Vergroeiing alleen van de uiteinden, met vrije bases, zijn zeldzaam, en vermoedelijk is het bestaan van een dergelijke versmelting bij Clavaria fistulosa (fig. 1, 12 cm lang, gevonden door J. de Jonge in de Harense Hortus „De Wolf“, 2 dec. 1950) slechts aan zeer weinigen bekend. In de literatuur kon ik er geen vermelding van vinden.




fig. 1

Clavaria fistulosa

Fasciaties van Leotia lubrica (fig. 2, Olterterp, 21 oct. 1951) komen vrij veel voor, maar de hoedjes houden dan meestal een wat meer regelmatige vorm. Men krijgt soms zelfs de indruk, doordat de steel zeer vaak gegroefd is, dat de „fasciatie“ slechts schijn is. Men zie bijv. het plaatje in „Paddestoelen in kleuren“,




fig. 2

Leotia lubrica

kort geleden verschenen. Een exemplaar met zo'n verfromfaaide hoed als op bijgaande tekening zag ik niet eerder. Tussen twee haakjes, het genoemde, populaire boekje is buitengewoon aardig, er worden een kleine 350 paddestoelen gekleurd in afgebeeld. De kleuren zijn over het algemeen goed, de beschrijvingen bondig. Ik heb de Deense uitgave in mijn bezit en kan het in zijn soort zeer waarderen, moet er echter toch een aanmerking op maken. Op het titelblad staat vermeld: „Farvetavler af E. Hahnwald“, een groot aantal plaatjes zijn