

echter overgenomen uit Michaël, "Führer für Pilzfreunde", soms klakkeloos, soms in spiegelbeeld, of ook wel gedeeltelijk veranderd. Om het in paddestoelenstijl te zeggen: „er zit een luchtje aan“!




fig. 3

Cordiceps ophioglossoides

De derde tekening stelt voor Cordiceps ophioglossoides op Elaphomyces muricatus. Nu wordt in alle flora's vermeld dat deze knotszwam ook in tweeën, of zelfs in drieën vertakt voorkomt. Ik heb het echter nooit eerder gezien en vond deze twee exemplaren op één hertetruffel bij Lhee (Dwingeloo) op 23 sept. 1956 temidden van ruim 100 gewone exemplaren. Van verschillende monstruositeiten zijn gevallen bekend dat er meerdere vlak bij elkaar stonden, kennelijk alle uit één mycelium ontsproten. Ook bij deze vertakte Cordiceps zit kennelijk de drang tot „dichotomie“ in het mycelium gelokaliseerd.

L.S. Wildervanck

EEN MYCOLOGISCH PROBLEEM II

Samenvatting deel 1: De auteur vond bij Utrecht een vaal bruine, roodverkleurde melkzwam met grote netvorming verbonden kammen op de sporen. Deze behoort dus tot de Fuliginosi. De soorten uit deze groep vertonen de volgende verschillen met het Utrechtse materiaal:

- Lactarius lygniatus: spitse bochel, montane verspreiding.
L. acris : snel roodverkleurend, kleverige hoed.
L. pterosporus : lamellen dicht opeen, kammen op sporen vormen geen net.
L. fuliginosus : sporen met lage netstructuur.
L. picinus : zeer donker gekleurd, onder sparren.
L. picinus var. speciosa: steel te donker.

In Fungus Jrg. 7, p. 56, wordt door Schweers in zijn Glinsteringen des jaars 1935 L. fuliginosus Fr. subsp. picinus Fr. vermeld als te zijn gevonden onder eiken op een slootwal in Slangenburgh.

Volgens de standplaats onder eiken zou dit dus geen subsp. picinus geweest kunnen zijn, want deze moet onder sparren groeien. Zou dit misschien L. speciosus Lange geweest kunnen zijn?

In Fungus Jrg. 4, p. 76 wordt in de index L. azonites (Bull. ex Gmel.) Fr. genoemd als gevonden in Hengelo. Deze komt volgens Lange overeen met L. fuliginosus forma speciosus, die in loofbossen groeit (Lange noemt, om het moeilijker te maken, een andere auteurscombinatie en wel: (Bull.) Schroet.). In de Mededelingen 18-20, p. 62 vond ik, dat deze soort eveneens door Schweers was gevonden en dat hij in 1929 op de zelfde plaats weer was opgekomen. Hier werd ook de synoniemie opgegeven van L. azonites met L. fuliginosus Fr. Tevens werd vermeld, dat de in 1925 voor het eerst in Nederland verzamelde exemplaren op Plaat 2158 in de Flora Batava werden afgebeeld.

Hoogstwaarschijnlijk zijn ook herbariumexemplaren van beide vondsten bewaard gebleven, zodat we de zaak dus verder zouden kunnen onderzoeken. Reynders & Schütz noemen in een gestencild en nog voorlopig verslag van een mycologische inventarisatie van het landgoed Wulperhorst bij Zeist voor de eerste maal L. pterosporus Rom. Hopelijk is ook hier materiaal verzameld en bewaard.

Samenvattend zou ik willen opmerken, dat de exemplaren van Oud-Amelisweert mijns inziens niet tot L. pterosporus Rom. gerekend kunnen worden, maar veeleer tot een vorm van L. fuliginosus Fr. met een bleke kleur en met sporen, die kammen vertonen, die netvormig samenhangen. Ik moet echter hier direct bekennen, dat ik maar weinig exemplaren heb gezien, zodat ik de variabiliteit niet goed kan beoordelen en dus met zekerheid niets mag zeggen. De bedoeling van dit artikel-tje was echter zowel om een probleem aan te snijden, als om de lezers en de lezers te laten zien, welk detectivewerk er vaak verricht moet worden om achter de naam van een paddestoel te komen. Laat ik echter de beginners meteen geruststellen met te zeggen, dat het lang niet altijd zo moeilijk is en dat er vele soorten zonder al dat gepluis gedetermineerd kunnen worden.

Tenslotte wil ik hier nog vooral aansporen om goed naar deze roodverkleurde melkzwammen, die altijd zeldzaam zijn, uit te kijken. De meeste kans om ze te vinden heeft U in loofbossen op de klei. Waarop we dan speciaal moeten letten en waarover liefst zo nauwkeurig en zo spoedig mogelijk aantekeningen moeten worden gemaakt zijn de volgende kenmerken:

1. Kleur en verkleuring van melk en vlees.
2. Smaak van melk en vlees.

3. Kleur van hoed, steel en plaatjes.
4. Structuur van de hoedhuid.
5. Grootte en versiering der sporen in Melzer's reagens bekeken.
6. Groeiplaats. Onder welke bomen en op welke grondsoort?

En dan vooral niet vergeten om materiaal ervan op te sturen naar het Rijksherbarium te Leiden!

Baarn, 21 februari 1957

Dr. G.A. de Vries.

N.B. Boven genoemde namen zijn gebruikt in de zin van Kühner en Romagnesi. In "Die Milchlinge" van Neuhoﬀ wordt L. fuliginosus - L. azonites en wordt L. picinus var. speciosa - L. fuliginosus genoemd; vermoedelijk met recht.

Nu komt het materiaal van de Heer De Vries uiterlijk het meest overeen met L. azonites maar de sporen kloppen beter met L. fuliginosus ss. Neuhoﬀ. Meer vondsten zullen ons moeten leren wat het belangrijkste is. Persoonlijk heb ik de ervaring dat de sporen in deze groep sterker variëren dan men uit de boeken zou opmaken en ik heb het idee dat we hier met L. azonites te maken hebben. De plaat in de Flora Batava, tekeningen van de Heer Schweers, materiaal van de heren Huijsman en A.F.M. Reijnders wijzen er m.i. allen op dat L. azonites in ons land de minst zeldzame, zo niet de enig voorkomende soort van het groepje van de Fuliginosi is.

C. BAS

RECTIFICATIE VOGELNESTZWAMMENTABEL

In genoemde tabel is een hinderlijke fout geslopen. Onder de eerste 1 wordt verwezen naar 3; dat moet echter een verwijzing naar 2 zijn!

WIJZIGING BEHEER LEESPORTEFEUILLE

Daar de heer Huijsman een groot deel van het jaar in het buitenland vertoeft, heeft hij afstand gedaan van het beheer van de leesportefeuille, nadat de heer R. Wijsman, Oranje Nassaulaan 73 te Amsterdam bereid was gevonden dit op zich te nemen.

UITSLAG VERLOTING GRAMBERG

Voor deze verloting hadden zich 15 deelnemers gemeld. Het boek viel ten deel aan de heer Weverling te Den Haag.