

K L E I N E P A R A D E

Fistulina hepatica. Mejuffrouw Van Stolk te Huis ter Heide vond een biefstukzwam op een 20 cm dikke tamme kastanje. Deze soort komt vrijwel altijd op eiken voor. Zijn er meer uitzonderingen op deze regel?

Vergiftiging door Lactarius deliciosus. De Heer A.N. Koopmans en Mevr. J.A.C. Veth te Apeldoorn verzamelden prachtig materiaal van *Lactarius deliciosus* voor consumptie. Na gebruik voelden beiden zich 's avonds en 's nachts onwel. Er trad een toestand op die op dronkenschap leek, waarbij de benen min of meer verlamd werden en de hartslag zich versnelde. Dit alles terwijl in de boeken deze soort als eetbaar wordt opgegeven.

Laat dit een waarschuwing zijn voor hen die paddestoelen eten, met kleine hoeveelheden te beginnen, als zij zich aan een soort wagen die zij nog niet eerder gebruikten, zelfs al wordt die soort als goed eetbaar beschouwd.

Lactarius piperatus en zijn dubbelganger. Onder de in Nederland als *Lactarius piperatus* (Gepeperde Melkzwam) aangeduide paddestoelen gaan twee soorten schuil.

De echte *L. piperatus* is geheel wit, de melk droogt wittig op en verkleurt niet met KOH terwijl de steel even lang of langer is dan de diameter van de hoed.

Zijn dubbelganger *L. glancescens* is aanvankelijk wit, maar krijgt vuil-gelige vlekken terwijl de melk groenig opdroogt. Een druppel melk op een glaasje gemengd met KOH geeft een goudgele verkleuring. De steel is vaak korter dan de hoeddiameter.

Tot voor kort was deze laatste soort onbekend in Nederland. Maar de Heer Koopmans te Apeldoorn zond een exemplaar naar het Rijksherbarium.

M Y C O L O G I S C H N I E U W S 14-15

14. *Stropharia aeruginosa* en *Str. cyanea*.

R. Tuomikoski (*Karstenia* 2 : 31-32, 1953) vestigt er in zijn artikel "Notes on Finnish Agaricales" de aandacht op, dat wat men *Str. aeruginosa* (kopergroenzwam) pleegt te noemen in werkelijkheid een mengsel van 2 of 3 soorten is.

Hij onderscheidt voorlopig *Str. aeruginosa* in engere zin en *Str. cyanea*.