

sporenstof vind je zelden. Met behulp van het boek van Schaeffer kwam ik op R. fragilis var. carminea J. Schaeff. Ook de flora van Kühner en Romagnesi bracht me daarnaar toe. Hoewel ik er nog niet zeker van ben, dat ik goed gedetermineerd heb, vooral omdat mijn exemplaar nogal groot was (7 cm i.p.v. 5 cm) blijf ik voorlopig toch aan de juistheid van mijn oplossing geloven, vooral omdat Schaeffer opmerkt, dat de smaak wel eens heel zwak scherp kan zijn, terwijl bovendien de term "zerstückelt-netzig" niet onaardig op mijn sporen paste.

Een andere wonderlijke klant vond ik onder beuken. Er schoot me geen enkele naam te binnen. Eén van onze excursiegangers deed een gooi: R. amoena Qué. Niet zo gek, want de hoed was een beetje een mengelmoesje van kleuren. Na een poosje werd de basis van de steel duidelijk geel, terwijl langzamerhand de hele steel geel optrok, ook de lamellen vertoonden hier en daar gele vlekken. Toen begon ik uiteraard aan R. puellaris Fr. en R. versicolor J. Schaeff. te denken. Zeker hoort hij in dat groepje thuis. Vermoedelijk is het wel R. puellaris, omdat R. versicolor altijd iets scherp moet zijn en uitsluitend onder berken groeit. Wel "geelde" hij te weinig intens voor R. puellaris, maar dat schijnt wel eens meer voor te komen.

Dan nog een paar bleek-paarse broze vrienden met nogal sterk-gele lamellen. Mijn vermoeden bleek juist: het waren vertegenwoordigers van R. turci, de okergele sporen (F) en de hoedhuidcellen met heel kleine kristalletjes er op bewezen dat.

Tenslotte de clou van ons weekend wat Russula's betreft: Russula decolorans, gevonden door de heer Huibers uit Nijmegen. Hoed magnifiek éénkleurig koperkleurig oranje, lamellen typisch crémekleurig, steel en later ook lamellen verkleurend tot zwart.

Asterstr. 2, Winterswijk

M. van Vuure

RESULTATEN DER EXCURSIES 1957

De excursie naar Middachten en omgeving was uitzonderlijk goed bezocht; in geen jaren en jaren waren er zoveel deelnemers bijeen. Jammer, dat zij niet met een rijke oogst werden beloond.

Voor de excursie naar Dorst daarentegen waren er niet meer dan een handjevol liefhebbers. En deze excursie was nog wel zo goedkoop gehouden in het belang van de jongeren, maar die hadden misschien juist griep.

Voor de excursie naar Oud-Amelisweert en Rhijnauwen bij Bunnik was de opkomst matig. Het weer kon geen beletsel genoemd worden, het aantal fungi was droevig.

Alleen de belangrijkste vondsten zijn vermeld. De met ! aangegeven soorten zijn in de collectie te Leiden opgenomen.

1. EXCURSIE MIDDACHTEN EN OMGEVING, 7-8 IX 1957.

<u>Basidiomyceten</u>	<i>Inocybe asterospora</i> !
<i>Boletus calopus</i>	- <i>petiginosa</i> !
<i>Cantharellus</i> (<i>Craterellus</i>)	<i>Lentinellus cochleatus</i> !
<i>sinuosus</i>	<i>Masseola</i> (<i>Sparassis</i>) <i>crispa</i>
<i>Cantharellus</i> (<i>Craterellus</i>)	<i>Phellodon</i> (<i>Hydnum</i>) <i>amicus</i> !
<i>tubaeformis</i> !	<i>Pholiota</i> (<i>Flammula</i>) <i>alnicola</i> !
<i>Collybia fusipes</i>	<i>Resupinatus</i> (<i>Pleurotus</i>) <i>applicatus</i> !
<i>Gloeoporus amorphus</i> !	<i>Russula claroflava</i> !
<i>Gyroporus</i> (<i>Boletus</i>) <i>castaneus</i> !	- <i>drimeia</i>
<i>Hapalopilus Schweinitzii</i>	- <i>foetens</i>
<i>Hydnellum compactum</i> (<i>Hydnum</i>	<i>Tremellodon gelatinosum</i>
<i>acre</i>) !	<u>Ascomyceten</u>
<i>Hydnellum velutinum</i> var. <i>scrobiculatum</i> (<i>H. scrobiculatum</i>) !	<i>Hypocrea citrina</i> !
<i>Hydnellum velutinum</i> var. <i>spongiosipes</i> ! (<i>H. velutinum</i>) !	<i>Leotia lubrica</i>
<i>Hydnum repandum</i> !	<i>Polydesmia pruinosa</i> !
	<i>Rhizina undulata</i> (<i>inflata</i>)

2. EXCURSIE DORST, 28-29 IX 1957.

De meeste fungi, die in Coolia 4: p. 18-19. 1957 werden vermeld in het artikel van P. B. Jansen, zijn inderdaad ook gevonden.

3. EXCURSIE OUD-AMELISWEERT EN RHIJNAUWEN, 20 X 1957

<i>Clitocybe geotropa</i> !	<i>Crepidotus pubescens</i> !
<i>Cortinarius rubellopes</i> !	<i>Marasmius recubans</i> !
<i>Crepidotus luteolus</i> !	

INOCYBE HALOPHILA Heim

Op 11 november 1957 waren de heer en mevrouw Huijsman en ondergetekende op excursie in de onvolprezen duinen van Voorne. Direct achter de zeereep in een vlak vochtig terreintje met spaarzame gras- en mosvegetatie en verspreide kruipwilgbosjes vonden wij een *Inocybe*, welke reeds in het veld direct opviel. De sterk schubbige hoed en de sterk