

den de Gele Ridderzwammen de verspreid staande dennen, vaak alleen kenbaar aan kleine bultjes in het zand, die altijd deze zwam bleken te verbergen. (Hoewel zeer zanderig is dit een voortreffelijk smakende paddestoel. Red.)

Boletus (Gyroporus) cyanescens (Indigoboleet). Ook deze boleet blijkt graag in stuifzanden te groeien. Tijdens mijn vakantie in Drunen (medio sept.) vond ik telkens als ik de duinen inging enkele exemplaren van deze soort; steeds dicht bij kreupeleiken. C. Bas.

MYCOLOGISCH NIEUWS 16

Ieder kent, althans van naam, Xerocomus (Boletus) parasiticus, de boleet die parasitisch leeft op aardappelbovisten. De in het oog vallende kenmerken zijn: geelbruine hoed en steel, geel vlees, gele buisjes.

Enige jaren geleden werd door de Japanner Imazeki (in Nagaoa 2: 35. 1952) een nauw verwante soort beschreven, Xerocomus (Boletus) astereicola, met dezelfde merkwaardige gewoonte om als parasiet op te treden. De gastheer is in dit geval Astraeus hygrometricus, een soort die van verschillende vindplaatsen uit ons land bekend is.

Zij, die zo gelukkig zijn dicht bij een der vindplaatsen van de Hygrometrische aardster te wonen, zouden zich eens in de tijd, dat Astraeus te verwachten is, de moeite moeten getroosten geregeld te gaan kijken. De kans, dat een Japanse soort hier voor zou komen is wellicht gering, maar misschien ook weer niet geheel uitgesloten. En het is zeker, dat het kennen van de standplaats al vaak heeft geleid tot het vinden van de soort.

De kenmerken van X. astereicola zijn: vuilgele hoed, roetbruine steel, geel vlees dat blauw wordt na doorsnijden, gele buisjes die blauw worden bij druk.

R.A. Maas Geesteranus.

LEDENADMINISTRATIE

Nieuwe leden:

C. de Wolf, Oudegracht 207, Alkmaar (student-lid).

Adreswijzigingen:

Dr. H. Bremmer naar Coornhertlaan 2, Eindhoven.

K.N.N.V.-afd. Winterswijk naar Asterstraat 2, aldaar.

T. O. van Kregten naar Vaartweg 137, Hilversum.

Ir. H. F. van der Laan, R.D. 2, Canonsburg (Pa.), U.S.A.

Mej. A. C. Stolk naar Wittelaan 19, Baarn.