

Doorn 20-21 september.


1 x

Phylloporus rhodoxanthus

dolae (vroeger *Collybia acervata* genoemd) die veel *dryophilus* lijkt, maar wijder uiteenstaande lamellen en een vrij donker roodbruine steel heeft. In het pinetum stond op verschillende plaatsen Lepiota brebissoni. Een kleine witte roze spoorder die talrijk voorkwam tussen mos en gras onder de coniferen bleek Rhodophyllus (*Eccilia*) molliusculus te zijn.

Bennekom 4-5 oktober (paddestoelenwerkgroep K.N.N.V.).

Dit goed bezochte weekend mocht zich ook in een goede presentie van de paddestoelen verheugen. Een complete lijst van de vondsten zou zeer lang zijn. Een kleine selectie is:



1 x

Coprinus atramentarius var. *acuminatus**Inocybe sambucina**Phylloporus rhodoxanthus**Pluteus atromarginatus**Psilocybe semilanceata**Russula mairei* var. *fageticola*

(algemeen onder dennen)

*Russula puellaris**Tricholoma saponaceum* var. *sqaumosum*.Jubileum-excursie Vogelenzang 19 oktober.

Met ongeveer 25 mensen bezochten wij 's morgens het Vogelenzangse bos en 's middags de Waterleidingduinen. Ook nu was de fungusflora niet

Psilocybe semilanceata

rijk maar er werden een aantal fraaie vondsten gedaan. Een kleine witte Lepiota was L. cygnea en een kleine roze-bruine Lepiota L. sub-incarnata, terwijl een kleine vleesroze soort de zeldzame Limallella glioderma bleek te zijn. Er werd ook een mooie bruin-rode flammula-achtige zwam gevonden die op de excursie Flammula sapinea werd genoemd. Bij nader onderzoek bleken de sporen glad te zijn en waren er randcellen met ronde koppen; dit was Pholiota tuberculosa. Een kleine witte Inocybe, die sterk rood verkleurde, werd ten onrechte I. godeyi genoemd; het was I. geophylla var. lateritia. De meeste excursisten zullen niet licht de prachtige Hericium erinaceum (Pruikzwam) vergeten die de holte van een oude beuk bij het Huis te Vogelenzang opvulde.

Zuid-Limburg 25-26 oktober.

Deze kleine excursie bracht op zaterdagmiddag een bezoek aan het Onderste Bos bij Epen. Er werden niet veel typische Zuid-Limburg-soorten gevonden. Marasmius foetidus was misschien de enige. Opvallend was het talrijke voorkomen van Flammula lenta. Vermeldenswaard zijn verder Galerina camerina, Inocybe umbrina, Mycena cinerella (alle drie uit Lariabos) en Psathyrella scobinacea.

Zondags werd het Savelsbos bij Gronsveld geïnspecteerd. Enkele aardige vondsten waren:

Clitocybe phyllophila	Flammula oedipus (= F. Sordidus)
Inocybe eutheles	Marasmius epiphyllus
Lepiota sublittoralis	Russula parazurea
Lectarius lacunarum	Rhodophyllus platyphylloides.

Een indrukwekkend gezicht was een geheel veld Clavariadelphus junceus.

Van bijna alle in deze verslagen genoemde fungi is materiaal geconserveerd in het Rijksherbarium te Leiden.

C. Bas.

GEVONDEN VOORWERP

De heer De Vries, Beukenlaan 8, Baarn, vond in zijn auto een ballpoint nadat hij een aantal bezoekers van de bijeenkomst te Baarn op 8 november j.l. vervoerd had.