

sen vonden wij een dergelijk zwammetje. Maar uit de boeken bleek dat G. sahleri een witvezelige hoed moet hebben en dat had onze soort be-
slust niet. We konden er niets anders van maken dan G. hypnorum, maar
dan toch een merkwaardige vorm.

Van de in dit artikel tje genoemde soorten komen er slechts enkele
bijna uitsluitend op veen en veenmossen voor (*Hypholoma elongatum*, *H.*
udum, *Gymnopilus fulgens* en *Mycena megaspora*). *Alnicola amarescens* is
een typische brandplekbewoner. *Omphalia postii* misschien ook, ofschoon
mogelijk is dat deze soort bij levermossen hoort. Anders is het voor-
komen op de Amsterdamse grachtmuren (*Coolia* 5 (6) : 39) moeilijk te
begrijpen.

Niet iedereen heeft een hoogveen tot zijn beschikking. Maar een
kleine weerspiegeling van de hoogveenfungusflora kan men vinden rond
vennetjes, vooral als daarin ook *Sphagnum* groeit. En vennetjes heeft
Nederland nog heel wat.

In *Fungus* 12 : 7-11 en 57-62 (1940-41) staat een uitgebreid arti-
kel over fungi in Drente van A.F.M. Reynders, waarin nog heel wat meer
over veenpaddestoelen te vinden is.

Een prettige kant van het zoeken naar veenpaddestoelen is, dat
men in het veen soms vrij veel paddestoelen kan vinden als elders door
droogte de oogst gering of nihil is.

C. Bas

NOGMAALS DE PARASIET OP ANTHURIUM.

De Heer Bakker ontving van de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen de volgende reactie op zijn artikel tje in het maart-nummer
van *Coolia*:

"Naar aanleiding van Uw artikel tje "Parasiet op Anthurium" in
Coolia 6 no. 1 van maart 1959, merken wij het volgende op.
De *Septoria* species die bladvlekken veroorzaakt bij de flamingo-plant
werd in de oude tuinbouwgidsen (1955 en eerder) aangeduid met de naam
Septoria azaleae Vogl. Daarbij werd dus verondersteld dat deze schim-
mel identiek is met de door Voglino beschreven schimmel op *Azalea*.
Voor zover wij weten is echter nooit bewezen dat de schimmel op *Azalea*
identiek is met de schimmel op *Anthurium*. Dit is uiteraard in verband
met de besmettingsmogelijkheden wel van belang.

De *Septoria* soort op *Anthurium* is in 1941 door de Duitser Kotthof
beschreven onder de naam *Septoria anthurii* Kotth. Onder deze naam
wordt de bladvlekkenziekte in de moderne fytopathologische literatuur
aangeduid.

Overigens is deze naam waarschijnlijk niet geldig, daar dezelfde schimmel volgens Dr. J.A. von Arx van het Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" reeds vroeger beschreven is onder de naam *Gloeosporium minimum* Karst et Har.

De juiste naam zou dan moeten zijn *Septoria minimum* (Karst. et Har.)

Als bestrijding van deze bladvlekkenziekte wordt geadviseerd (Tuinbouwgids 1959 blz. 622) de planten te bespuiten met 300 gr. ferbam of 300 gr. zineb-spruitpoeder per 100 l water. Bespuiting om de 2 à 3 weken herhalen."

DRINGEND VERZOEK OM OPGAVE VAN VIND- PLAATSEN EN TOEZENDING VAN MATERIAAL

Voor een bepaald doel moet ik dit jaar kleurenfoto's maken van de hierna te noemen paddestoelen, die in mijn omgeving weinig of niet voorkomen.

Het zijn:

Agaricus arvensis of *campester* (Akker- of Weidechampignon) --- *Asterophora* (*Nyctalis*) *parasitica* (Sterzwammetje) --- *Boletus aurantia-*
cus of *rufescens* (Rosse boleet) --- *Boletus cyanescens* (Indigo-boleet)
--- *Calvatia* (*Bovista*) *gigantea* (Reuzen-bovist) --- *Cortinarius ar-*
millatus (Ambandzwam) --- *Craterellus cornucopioides* (Hoorn-van-
overvloed) --- *Craterellus tubaeformis* (Trechter-cantharel) --- *Hyd-*
num repandum (Gele stekelzwam) --- *Hydnum imbricatum* (Geschubde ste-
kelzwam) --- *Lentinellus cochleatus* (Bruine anijszwam) --- *Mutinus*
caninus (Kleine stinkzwam) --- *Myriostoma coliforme* (Peperbus) ---
Masseola (*Sparassis*) *crispa* (Sponszwam) --- *Paxillus atrotomentosus*
(Zwartvoet-Krulzoom) --- *Peziza aurantia* (Grote oranje bekerzwam) ---
Polyporus frondosus (Eikhaas) --- *Polyporus giganteus* (Reuzenzwam) ---
Ramaria (*Clavaria*) *aurea*, *flava*, *formosa* of *botrytis*, (Grote gele
koraalzwam) --- *Rhizina undulata* (Oliebolzwam) --- *Russula aeruginea*
(*graminicolor*) of *virescens*, (Groene russula) --- *Tremellodon gelati-*
nosum (Stekel-trilzwam) --- *Tyromyces* (*Polyporus*) *sulphureus* (Zwavel-
zwam).

Willen degenen, die deze soorten alle of gedeeltelijk kennen, zo vriendelijk zijn, mij even een bericht (schriftelijk of telefonisch) te doen toekomen, wanneer zij in de komende maanden een of meer der genoemde soorten (mooie, verse exemplaren) in hun omgeving of elders weten te staan, graag met zo duidelijk mogelijke aanwijzing van de