

- Inocybe lacera* f. *gracilis* Lange. 15 VII; 18 VII; 15 VIII veel; 1 IX nog vrij veel. Steeds onder elzen.
- Laccaria amethystina* (Bolt. ex Fr.) Berk. & Br. 1 VII. Elzenbroek.
- Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Berk. & Br. 1 VII; 15 VIII veel; 27 IX en 6 X. Elzenbroek.
- Laccaria tortilis* (Fr.) Pat. 28 VII 7 ex.; 15 VIII. Elzenbroek.
- Lactarius aspidius* Fr. 1 VII; 15 VII 3 ex.; 19 VII 20 ex.; ook nog 15 VIII en 6 X. Elzenbroek.
- Lactarius glyciosmus* Fr. 6 X. Elzenbroek.
- Lactarius obscuratus* (Lasch) Fr. 19 VII 2 ex. Elzenbroek.
- Lyophyllum palustre* (Peck) Sing. Talrijk in sphagnum vanaf 10 V; 27 IX zeer veel.
- Marasmius ramealis* (Bull. ex Fr.) Fr. 28 VII 1 ex. in Elzenbroek.
- Mycena acicula* (Schaeff. ex Fr.) Quél. 1 IX 1 ex. in Elzenbroek.
- Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schw. ex Fr.) Quél. 1 ex. 15 VIII.
- Omphalia swartzii* (Fr.). 31 V 1 ex. in Elzenbroek.
- Paxillus involutus* (Batsch ex Fr.) Fr. Vooral aan de westrand van het ven, tot in het sphagnum.
- Rhodophyllum* cf. *caccabus* Kühn. 28 VII; 18 VIII veel. Steeds in Elzenbroek.
- Rhodophyllum staurosporus* (Bres.) Lange. 15 VIII 2 ex. in Elzenbroek.
- Russula fragilis* Fr. 6 X 1 ex. in berkenbosje.
- Meerten Verhoffstraat 9, Breda. P. B. Jansen

PADDESTOELENNIEUWS UIT GRONINGEN

Moeten we het in het Noorden voornamelijk hebben van Drente, ook de provincie Groningen is de moeite waard. In de eerste plaats dient genoemd te worden de Harense hortus „De Wolf“, waarover ik in *Fungus* al enige malen schreef.

Door het kunstmatig scheppen van verschillende biotopen wordt in dit grote terrein, gelegen op de Hondsrug, een ideale toestand geschapen voor een groot aantal zwammen. Sinds 1935 wordt de hortus regelmatig geïnventariseerd; eerst door Swanenburg de Veije (van '35 tot '39), later, van 1949 af, geholpen door enkele andere biologen, door mij. In de jaarlijks uitgegeven mededelingen van de hortus „De Wolf“ wordt hiervan regelmatig verslag uitgebracht. In 1958 werd een volledige lijst gepubliceerd van de tot en met dat jaar gevonden soorten. In totaal zijn er nu 300 bekend geworden.

Merkwaardigerwijs leverde de droge herfst van 1959 een grote zeldzaamheid op, te weten een spierwitte variëteit van de Grijze ringbloeet, *Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell (= *Boletus* of

Ixocomus viscidus), waarvan een vijftal exemplaren tussen Gele ringboleten, Suillus grevillei (Klotzsch) Sing. (= *Boletus* of *Ixocomus elegans*), onder lorken groeiden. De zwam werd ter nadere identificatie naar Leiden gezonden en is volgens de heer van Brummelen vermoedelijk Suillus aeruginascens var. albus, door Kühner in 1926 beschreven (*Le Botaniste* 17 : 200 . 1926). We zullen er het volgend jaar weer op letten. De Grijze ringboleet is tenslotte zeer variabel.

Van de zeldzamere soorten, die ik meestal niet of zelden in Fungus vermeld vond en die evenmin of zelden in de in mijn bezit zijnde jaargangen van de Mededelingen van de Ned. Mycol. Ver. en de Levende Natuur genoemd worden, volgt hier een opsomming.

Wanneer wij er in Groningen niet uit konden komen, werden de zwammen naar een specialist opgestuurd; dit is achter de naam van de betreffende soorten vermeld.

ASCOMYCETES

PYRENOMYCETES.

Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not. (det. Maas Geesteranus).

DISCOMYCETES. (namen volgens Seaver, North American Cup Fungi, Opercul. 1942).

Geopyxis cupularis (L.) Sacc. (fig. 4)

Humaria araneosa (Peck) Seaver (det. Schweers).

Peziza (Plicaria) echinospora Karst.

(Op brandplek; zie art. van Swennenburg de Veye in Fungus 10 : 39 . 1938).

Peziza (Discina) venosa Pers. (det. Schweers).

Sepultaria araneosa (Fuck.) Boud.



fig. 4

Geopyxis cupularis

BASIDIOMYCETES

TREMELLACEAE.

Hxidea nucleata (Schw. ex Fr.) Burt.

CLAVARIACEAE.

Clavariadelphus fistulosus f. contorta (Holmskj. ex Fr.) v. Höhm. (zie Fungus 21 : 14 . 1951).

CYPHELLACEAE.

Cyphella capula (Holmskj.) ex Fr., gele vorm (foto van materiaal uit Harense hortus in Fungus 9 : 55 . 1938).

Dictyolus lobatus (Pers. ex Fr.) Quél. (det. Maas Geesteranus),
D. retirugus (Bull. ex Fr.) Quél.

POLYPORACEAE.

Ceraporia viridans (Berk. et Br.) Donk (det. Donk).

Podoporia vitrea (Fr.) Donk = Poria undata (Pers.) Bres. (det. Maas Geesteranus).

AGARICACEAE.

Alnicola luteolofibrillosa Kühn., A. scolecina (Fr.) Kühn.

(= A. badia Kühn.), A. umbrina R. Maire.

Conocybe blattaria var. exannulata Kühn. (det. Huijsman),

C. mesospora Kühn. (det. Huijsm.), C. pygmaeoaffinis (Fr.) Kühn.

Deconica physaloides (Bull. ex Fr.) Karst.

Inocybe eutheles (Berk. et Br.) Sacc. (det. Huijsm.), I. globocystis Vel. (det. Huijsm.).

Marasmius recubans Quél.

Mycena arcangeliana sensu Oort (in grote toefen op een boomtrunk; sterke jodoformgeur), M. tintinabulum (Fr.) Quél.

Omphalia philonotis (Lasch) Quél. (op sphagnum; det. Schweers),

O. umbellifera var. viridis sensu Lange (zie Fungus 20 : 72 . 1950).

Pluteus chrysophaeus (Schaeff. ex Lasch) Quél.; P. nanus (Pers. ex Fr.) Quél., P. salicinus (Pers. ex Secr.) Quél., P. umbrinellus (Sommerf.) Gill. (det. Huijsm.).

Psathyrella stipatissima Lange (in bundels).

Tricholoma (Calocybe) carneum (Bull. ex Fr.) Quél., T. (Calocybe) persicolor (Fr.) Karst.

GASTEROMYCETES.

Geastrum rufescens Pers. (van 1948 - '53, daarna verdwenen; det. Van Eyndhoven).

Een tweede terrein dat voor de mycologie van betekenis is, is het pas verworven bezit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, het „Westorbroek“, gelegen op 10 km. van Groningen langs de weg naar Winschoten. Het omvat enige plassen en is begroeid met vele soorten loofbomen en heesters. Sinds 1956 wordt dit terrein door mij

geinventariseerd. Elk jaar wordt een verslag naar het bestuur van „Natuurmonumenten" gezonden. Tot nu toe vond ik in het Westerbroek ± 100 soorten. Enkele bijzondere vondsten volgen hier.

Lepiota brebissonii Codey. Vermoedelijk de eerste vindplaats in het Noorden. Volkomen is er op van toepassing wat Huijsman er in Fungus 12 : 61 (1941) over schreef: „Een zwartbruin kapje in het centrum van de hoed, met zeer fijne vlokkige schubjes daaromheen verspreid, tekent zich af tegen het witste wit dat ik in de paddestoelenwereld ooit ontmoet heb." Een mooie foto vind men in Fungus 20 : 45 (1950).

Rhodophyllus (Eccilia) politus (Fr.) Quéf.? (voorlopige determinatie Bas.) Honderden exemplaren groeiden op een graspad.

Een merkwaardig gezicht was een veld dode grasstengels, bezet met duizenden exemplaren van Pleurotus (Crepidotus) pubescens auct.

Een vijftal bijna geheel witte, ± 2 cm. grote bekerzwammetjes, tussen gras gevonden, vertegenwoordigden zeer waarschijnlijk Galactinia pudica Boud (det. Bas). Dit is vermoedelijk de eerste vondst in Nederland. Helaas liet deze soort in 1959 verstek gaan. Hopelijk verschijnt hij dit jaar weer.

De enige vondst in 1959 in het Westerbroek was een Pluteus cervinus (Schaeff. ex Fr.) Quéf. met een hoed van 16 cm; groter dan ik in de literatuur vermeld vond.

Een derde terrein dat de moeite waard is, is het bos om de Fraeylemaborg bij Slochteren, in de zogenaamde Groningse „Woldstreek". In Oct. 1959 vonden wij er met een excursie van de N.N.V. o.a.

Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr., een witte, wollige Polyporaceae, als met blauwe inkt overgoten. Op takjes vonden wij Pleurotus (Resupinatus, Acanthocystis) applicatus (Batsch ex Fr.) S. F. Gray; tot 1 cm. grote, donkergrijze, op het substraat aangedrukte, subexcentrische waaiertjes. Op half vergane noten van de uit N. Amerika afkomstige Juglans nigra zaten kleine Collybias (of Mycena's?). Deze soort kon niet worden thuis gebracht. Ik zal er dit jaar weer naar uitkijken. Fraeylemaborg leverde vroeger al eens de prachtige Lakzwam, Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst., op.

Een witte variëteit van Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. vonden wij in Oct. '58 in het Tonckensbos bij Norg, eigendom van „Natuurmonumenten". De paddestoelen waren slanker dan de gewone A. phalloides, hadden een gladde, getijgerde steel, wat zover ik weet niet past bij A. verna (die overigens een voorjaarszwam is) en ook niet bij A. virosa die een geschubde steel heeft. De gewone

A. phalloides is mij uit Groningen alleen bekend uit een villatuin langs de weg naar Haren waar hij al jaren geregeld opkomt.

En tenslotte wil ik nog noemen een kort-gesteelde trechtervormige, beige bekerzwam, volgens Maas Geesteranus waarschijnlijk Aleuria tectoria (Cooke) Boud., die al enige jaren in het huis (!) van de heer J. de Jonge groeit.

Petrus Campersingel 243
Groningen.

Dr. L.S. Wildervanck.


MYCENA CORTICOLA (Pers. ex Fr.) Quél. EN M. PSEUDOCORTICOLA Kühn.

Op wilgen, die flink met mos zijn begroeid, kunnen we in het najaar en dikwijls ook nog in het begin van de winter verschillende soorten „schors-Mycena's" vinden. Het zijn wel niet de gemakkelijkst te determineren paddestoelen, maar na wat oefening kunnen we er al gauw enkele soorten uithalen.

Een zeer fraai zwammetje is Mycena pseudocorticola Kühn. Deze soort vinden we meestal in flinke aantallen bijeen, van één tot meerdere meters van de grond. De kleur is fraai loodgrijs, later wat verblekend. De hoed is meestal niet groter dan 6-10 mm. Ook de steel is loodgrijs en aan de basis duidelijk wit donzig. Onder het microscoop vallen de grote ronde sporen op; de basidiën zijn gewoonlijk 2-sporig, ze hebben twee grote sterigmen.

Mycena corticola (fig. 5) heb ik maar eenmaal gevonden, dit zwammetje is meer bruinig gekleurd, de jonge ex. zijn purperkleurig. De sporen zijn iets kleiner dan die van M. pseudocorticola en dikwijls iets ellipsoidisch, ze zijn iets breder dan lang. De basidiën zijn 4-sporig. Zowel microscopisch als macroscopisch zijn deze beide soorten dus gemakkelijk van elkaar te onderscheiden.

P.B. Jansen.



HET VERKLEURZWAMMETJE

De laatste maand van 1959 bracht ons, dank zij het zachte weer, nog heel wat plaatjeszwammen, die we anders in zomer en herfst vinden.

De bossen van Dorst, een van onze voornaamste „jachtterreinen",