

TWEE INTERESSANTE EN HERKENBARE VEZELKOPPEN.

1. *Inocybe squamata*.


Het aantal soorten van het geslacht *Inocybe*, of wel Vezelkop, is zeer groot in ons land. Zij zijn echter zo moeilijk uit elkaar te houden dat niemand bij benadering weet hoeveel het er zijn. Misschien is het voor de amateur een troost te weten dat ook de vakmensen elk jaar een aantal pakjes met vezelkoppen ongedetermineerd moeten wegleggen in de hoop dat zij er later beter raad mee weten.



Toch herbergt ook het geslacht *Inocybe* een aantal soorten die met enige inspanning met het blote oog buiten herkend kunnen worden.

Twee nog weinig bekende en toch goed herkenbare soorten wil ik hier in 't kort bespreken.

De eerste is een soort die door de Deense mycoloog J. Lange werd beschreven en wel *Inocybe squamata*. Zoals de naam al zegt is het een geschubde soort. Het zijn



2. *Inocybe aurea*.

vooral de jonge exemplaren met aangedrukte donkere rossigbruine vezelschubjes op een groenig-gele ondergrond, die erg opvallen. Later wordt de hoed meer radiaal rossig bruin vezelig en zijn de donkere schubjes meestal nog slechts bij de umbo zichtbaar. De groenig gele tot strogele tint blijft het langst bij de hoedrand zichtbaar. De lamel-

len verkleuren van beige naar olijfkleurig bruin en hebben een opvallend witte snede. De steel begint bleek, maar krijgt spoedig een licht rozig okerbruine vezelstreping en is alleen in het begin iets donzig, maar wordt spoedig kaal. De geur is onbeduidend. Op doorsnede is het vlees in hoed en steelbasis vaak groenig geel getint. De sporen zijn glad, 10.0-12.5 x 5.5-6.5 micron. Er komen alleen clavate cystiden op de snede van de lamel voor. Het is dus een soort uit de groep van *Inocybe fastigiata*. De soort vertoont een sterke voorkeur voor standplaatsen op klei onder populieren.

De eerste maal dat ik de soort zag was in 1956, toen de heer K. Bakker hem opzond vanuit Delft. Later verzamelde ik flinke aantallen in de Leidse Hout en nu kort geleden ook in het Amsterdamse bos. Zowel in Leiden als in Amsterdam bleek dat er geen absolute binding met Populier is. Wel lagen alle drie de vindplaatsen op klei.

De tweede soort die ik op het oog heb is voorlopig nog een endem, d.w.z. een soort die tot ons land beperkt is. Dat is iets heel bijzonders, maar het zal wel veranderen als men in het buitenland van het bestaan van deze soort op de hoogte raakt. Het gaat hier om *Inocybe aurea* door Huijsman enige jaren geleden in Fungus (25: 22.1955) beschreven.

Deze prachtig goudgele soort met puntige zijdeachtige vezelige hoed en gelig witte steel is moeilijk te miskennen. Het is een soort met een duidelijk velum dat bij jonge exemplaren de hoedrand met het midden van de steel verbindt. Daaronder is de steel iets vezelig of glad en daarboven fijn bepoederd. De steel heeft geen knol.

Onder het microscoop heeft *I. aurea* ook enige zeer goede kenmerken. De cystiden op vlak en snede van de lamellen zijn zeer dunwandig, spoelvormig tot clavaat en dragen bijna geen kristallen. De sporen zijn eierhoekig dan knobbelig; sommige zijn zelfs + rechthoekig.

Huijsman kende de soort van twee plaatsen toen hij hem beschreef, n.l. van Doetinchem en Gorsel. De grondige speurtochten van Dr. E. Kits van Waveren brachten 3 nieuwe vindplaatsen aan het licht: Vorden, Warnsveld en Amersfoort.

Merkwaardig genoeg bestaan de meeste vondsten uit slechts één exemplaar!

I. aurea groeit in droge dennebossen, hakhoutbosjes e.d. en heeft, gezien de ruime mate waarin deze bostypen in Nederland aanwezig zijn, misschien een grote verspreiding in ons land.

Rijksherbarium, Leiden.

C. BAS.

DRINGEND VERZOEK OM OPGAVE VAN VINDPLAATSEN EN TOEZENDING VAN MATERIAAL.

Voor een bepaald doel moet ik dit jaar kleurenfoto's maken van de hierna te noemen paddestoelen, die in mijn omgeving weinig of niet voorkomen.

Het zijn:

Agaricus arvensis of campester (Akker- of Weidechampignon)
--- Asterophora (Nyctalis) parasitica (Sterzwammetje) ---
Boletus aurantiacus of rufescens (Rosse boleet) --- Boletus
cyanescens (Indigo-boleet) --- Calvatia (Bovista) gigantea
(Reuzen-bovist) --- Cortinarius armillatus (Armbandzwam)
--- Craterellus cornucopioides (Hoorn-van-overvloed) ---
Craterellus tubaeformis (Trechter-cantharel) --- Hydnum
repandum (Gele stekelzwam) --- Hydnum imbricatum (Geschub-
de stekelzwam) --- Lentinellus cochleatus (Bruine anijs-
zwam) --- Mutinus caninus (Kleine stinkzwam) --- Myriostoma
coliforme (Peperbus) --- Masseurula (Sparassis) crispa
(Sponszwam) --- Paxillus atrotomentosus (Zwartvoet-Krul-
zoom) --- Peziza aurantia (Grote oranje bekerzwam) ---
Polyporus frondosus (Eikhaas) --- Polyporus giganteus
(Reuzenzwam) --- Ramaria (Clavaria) aurea, flava, formosa
of botrytis, (Grote gele koraalzwam) --- Rhizina undulata
(Oliebolzwam) --- Russula aeruginea (graminicolor) of
virescens, (Groene russula) --- Tremellodon gelatinosum
(Stekel-trilzwam) --- Tyromyces (Polyporus) sulphureus
(Zwavelzwam).

Willen degenen, die deze soorten alle of gedeeltelijk kennen, zo vriendelijk zijn, mij even bericht (schriftelijk