

Deze "kleine" soort dankt haar naam aan haar eivormige cystiden. De hoed is donkerbruin met bruine, opstaande schubjes, de steel is bovenaan bleek, onderaan donker geschubd. Een vindplaats bevindt zich aan de Harpweg in Berg-en-Bos, onder eiken.

Inocybe Casimiri Vel. is de tweede "kleine" soort uit het I. lanuginosa-complex. Zij gelijkt veel op I. lacera; de sporen zijn echter hoekig en niet glad als bij I. lacera. Zij groeide onder beuken aan de Keienberse weg te Bennekom en is zeldzaam.

In het jaar 1960 deden we nog een aardige vondst, een zwammetje, dat vroeger bij de Inocybes werd gerekend. Het is kenbaar aan de karmijn-wijnrode lamellen en de licht- tot donkergrijze hoed. De steel is van onderen bruin, van boven rood. Het draagt thans de naam Melanophyllum echinatum (Roth ex Fr.) Sing. Wij vonden het in 1960 op een composthoop in onze tuin. (Zie ook Coolia 7: 1, pag. 10 - 11.)

Weliswaar vonden wij niet de Gouden vezelkop, die we zo gaarne eens gezien hadden, maar toch was deze kleine Inocybe-studie voor ons een waar genoegen. Zonder de hulp van de heer Bas, wien wij ten zeerste danken voor zijn hulp en revisie van al de genoemde zwammen, was dit uitstapje op het moeilijke terrein der Inocyben niet mogelijk geweest.

- J.A.C. Veth en A.N. Koopmans.

EXCURSIE VERSLAGEN.

Excursie naar het landgoed Groeneveld te Baarn.

Op 22 september 1962 waren 13 leden en 2 introducés voor het kasteel Groeneveld samengekomen om de mycoflora aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hoewel het weer al enige tijd ongunstig was geweest voor de ontwikkeling van fungi, werden er toch nog 92 soorten genoteerd, waaronder Volvaria gloiocephala, Macropodia macropus, Ixocomus piperatus, Lactarius cunicularius en de beide Asterophora (Nyctalis) soorten, A. lycoperdioides en A. parasitica. Geaster triplex was dit jaar niet verschenen op zijn oude

groeiplaats. Een exemplaar van *Lactarius rufus* werd gevonden onder een berk, ver weg van coniferen waaronder deze soort gewoonlijk voorkomt.

Excursie naar het landgoed Over-Holland te Nieuwersluis.

Dank zij de speurzin van de excursisten (13 leden en 1 introduc ) konden op 29 september niettegenstaande de opvallende schaarste nog 91 soorten worden opgeschreven. Hieronder bevond zich o.a. *Amanita strangulata*, die op vele kleurenfoto's werd vereeuwigd. Iets ongewoons was dat tot drie maal toe *Phallus impudicus* werd gevonden groeiend bovenop een vrij hoge boomstronk. Onder de overige vondsten mogen misschien nog wel *Bolbitius vitellinus*, B. (*Pluteopsis*) *aleuriatus* en *Pholiota erebia* vermeld worden.

Weekend-excursie naar Ommen.

Bijzonder verheugend was de grote opkomst voor deze excursies. Er waren n.l. 22 leden en 7 introduc 's, die op 13 en 14 oktober in de bossen bij Ommen naar paddestoelen zochten. Op beide dagen werden vele kleurenfoto's gemaakt. Zaterdagochtend werd een wandeling gemaakt in het bos gelegen tussen het station en de Ada's Hoeve. Het terrein bleek hier zeer gevarieerd te zijn. Het begon al direct met een grote hoeveelheid oude boomstammen en stronken, waarop verscheidene interessante houtzwammen werden gevonden o.a. *Volvariella bombycina*. Er was zandgrond met loof- zowel als naalldhout en er was een mooi hoogveentje. Daar er al geruime tijd geen regen meer was gevallen, was de oogst niet groot. Ongeveer 37 soorten werden genoteerd, waaronder *Cortinarius helvelloides*, *Clitocybe houghtonii*, etc.

Na de lunch in het hotel "De Zon a.d. Vecht" reed het gezelschap per auto naar het meest N.O. gelegen ven in de Staatsbossen ten Z.O. van Ommen. Dit ven had een zeer brede *Sphagnum*z ne, waarin vele veenpaddestoelen groeiden, zoals de zeer algemene *Nematoloma elongatum* en de minder frequente *N. udum*. Verder kwamen er voor

Lyophyllum palustre en *Mycena megaspora*.

De mooiste vondst was hier ongetwijfeld *Suillus flavidus*, die wat gelijkenis vertoont met een vermagerde, vale Gele

Ringboleet met wijdere poriën. Aan de rand van een zandpad groeide veel *Cordyceps ophioglossoides*, parasiterend op *Elaphomyces granulatus*. In totaal werden ruim 50 soorten in de onmiddellijke omgeving van dit ven gevonden. Na terugkomst bij de auto's werd gereden naar het landgoed Eerde, eigendom van Baron v. Pallandt v. Eerde. Ondanks de rijk gevarieerde boomgroei werden er weinig soorten gevonden. Toch was ook deze tocht niet tevergeefs, want grote, gave exemplaren van *Sparassis crispa*, *Aleuria aurantia*, *Boletinus cavipes*, *Mycena inclinata* en soorten als *Cordyceps militaris*, *Nidularia farcta*, e.a. vormen een mooie beloning voor de gedane moeite. In de avond na afloop van het gezamenlijke diner in het hotel werden de vondsten in de door de directie beschikbaar gestelde werkkamer uitgestald en werden moeilijke soorten nog weer eens vergeleken en microscopisch onderzocht. De volgende dag werd een bezoek gebracht aan het Eerder-Achterbroek, eigendom van de Vereniging tot ehoud van Natuurmonumenten in Nederland. Dit landschappelijk bijzonder mooie terrein leverde ruim 100 soorten op. Een van de pronkjuwelen was wel een Lakzwam (*Ganoderma lucidum*), die zomaar los in een droge greppel lag. Op een klein grazig plekje bij een boerderij groeide tussen *Hygrophorus niveus* de iets kleinere, sterk naar potlood (of *Cossus*) ruikende *H. russocoriaceus*. Er werden 13 *Lactarii* gevonden en 7 *Boleten*, waaronder een volkomen witte *Tubiporus edulis* temidden van zijn normale bruine soortgenoten. Om ongeveer half een was het gezelschap weer bij het hotel teruggekeerd. Hoewel na de lunch reeds vele deelnemers naar huis waren gegaan, maakten de overgeblevenen een tocht naar een van de oude Vechtarmen tussen Junne en Beerze. Hier werden 56 soorten genoteerd, waaronder de prachtige goudgele *Pluteus leoninus*, de zeer onaangenaam riekende *Thelephora palmata* en een aantal nog onrijpe truffels, vermoedelijk *Tuber borchii*.

G.A. de Vries.