

bossen groeit de beste) moet men er op bedacht zijn dat er nog een andere Sclerotinia is beschreven, die Speenkruid als gastheer heeft, nl. Sclerotinia ficariae Rehm. Deze soort is meer verwant met S. tuberosa, de Anemonenbekerzwam, dan met de bovenbeschreven soort. De sclerotiën van S. ficariae zijn 2-10 x 3-5 mm, de apotheciën 2-4 mm in diameter en de sporen 6-8 x 3-3.5 μ (veel kleiner dus dan van Botryotinia ficariarum).

VERSLAG VAN DE WEEKEND-EXCURSIE VAN DE FLORACOMMISSIE

NAAR OOSTVOORNE OP 19 EN 20 OKTOBER 1963.

Tijdens deze tweedaagse excursie naar Oostvoorne werd op zaterdag 19 oktober een bezoek gebracht aan het landgoed "de Mildenburg". Zestien leden namen aan deze excursie deel.

In verband met onderzoeken aan het Biologisch Station Weevers' Duin maakte de Heer D. van der Laan deze excursie mee. Om ook mycologische gegevens in de vegetatiekartering te betrekken werden de fungi uit de verschillende percelen genoteerd of voor nadere bestudering medegenomen.

Vermelding verdienen de volgende soorten: *Rhodophyllus euchrous*, *Agaricus meleagris* zgn. "Rebhuhnform", *Scleroderma cepa*, *Steccherinum ochraceum*, *Hypoxylon multifforme*, *Rutstroemia firma*, *Rutstroemia luteovirescens*, *Polydesmia pruinosa* op *Hypoxylon*, *Thateria phaeostroma* en *Paecilomyces farinosa*.

Sommige deelnemers gingen 's avonds nog naar het laboratorium van het Biologisch Station Weevers' Duin om enige vondsten microscopisch te bekijken.

Op zondag 20 oktober werd 's ochtends een bezoek gebracht aan de duinweitjes bij Weevers' Duin en aan Voorne's duinterrein. Het gezelschap was toen aangegroeid tot 24 personen.

Deze duinweitjes, die mycologisch gezien tot onze fraaiste en meest typische terreintypen behoren, zijn bij Weevers' Duin nog vrij goed bewaard. Een zelfde vegetatie kan men ook aantreffen op grazige paden in half-open duinterrein, zoals bijvoorbeeld in de duinen bij Castricum. Het is dan ook bedroevend om te zien, dat men dergelijke

paden in het reservaat "Voorne's duinterrein" van een dikke laag schelpkalk heeft voorzien.

Het terrein bij Weevers' Duin leverde o.a. vele wasplaten, enkele aardtongen en koraalzwammen op. De volgende soorten, tijdens de ochtend-excursie verzameld, verdienen vermelding: *Hygrophorus pratensis*, *H. niveus*, *H. russocoriaceus*, *H. fuscescens* (sensu Kühn. & Romagn.), *H. nigrescens*, *H. coccineus*, *H. nitratus*, *H. psittacinus*, *H. puniceus*, *H. conicus*, *Dermoloma atrocinerum*, *Tricholoma cingulatum*, *Rhodophyllus jubatus*, *Tubaria autochtona*, *Clavaria acuta*, *Clavulinopsis luteoalba*, *Radulum orbiculare* en *Thuemenidium atropurpureum*.

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de terreinen rond het Quackjeswater. Gevonden werden o.a. *Russula claroflava* en *Trametes trogii*. Na aanvankelijk mooi weer en een opkomende dreiging, begon het tegen vier uur steeds harder te regenen. De meeste deelnemers konden nog juist vóór de bui de auto's bereiken.

J. van Brummelen.

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Bestuur.

Prof.Dr.A.J.P.Oort, voorz. Eriicalaa 5, Wageningen
Drs.C.Bas, onder voorz. Joh.Wagenaarlaan 12, Leiden
Mej.Dr.A.Jaarsveld, secr., Hugo de Vries lab.

Plantage Middenlaan 2 a, Amsterdam-C.

Mej.Drs.J.P.S.Smit, penningm., Nic.Maesstraat 135,
Amsterdam Z.Postrek. 90902 t.n.v. N.M.V.

Mevr.Drs.H.F.J. von Arx-v.d. Brugge, biblioth.,
de Ruyterlaan 5, Baarn.

Drs.J.v. Brummelen, vert.Flora Comm. Hyacinthenlaan 25
Haarlem.

Nieuwe leden per 1-1-1963.

G. van der Hoek, Coltermanstraat 7 rood, Haarlem

C.F.M. Langezaal, arts, Witte singel 30, Leiden.

Mevr.E.Vriens-Neytzell de Wilde, Huis te Landelaan 14
Rijswijk Z.H.