

mineren !

De ingewijden weten dit reeds jaar en dag, maar mij heeft altijd die vraag geobsedeerd: komen we dan bij dit geslacht nooit verder dan een summiere kennis van een tiental soorten? Zijn de tabellen in de " Flore " dan voor niets geschreven? Of is het werk van Orton in de New Naturalist-serie voor niets gedaan? Deze gedachten vielen mij in toen ik vorig najaar prachtige *Cortinarius concinnus* en *armillatus* zag.

"L'étude des Cortinaires sera agencée de telle façon qu'elle deviendra accessible à tous" schrijft de franse specialist Dr. Henry aan Bertaux. Deze laatste gaf toen bovenstaand werkje uit dat amateurs bekend wil maken met de grootste en voornaamste groepen, die er bij dit complexe geslacht te onderscheiden zijn, met de meest markante soorten en de beste kenmerken. Uit de grondige kennis van een beperkt aantal moet dan geleidelijk aan door ervaring en studie een uitgebreidere kennis mogelijk zijn. Maar in geen geval de zaak laten liggen als een behoorlijk aantal exemplaren vindt.

Een aanvulling kan men vinden in Bull. Soc. Myc. de Fr. suppl. t. 77, 1961, ook aan de hand van Bertaux, speciaal over de *Leucophylli*.

Excursie BERGEYK op zondag 22 sept. 1963.

Begunstigd door mooi herfstweer vertrokken we met zeven deelnemers in auto's naar de boerderij van de familie Wijnen in Bergeyk, waar de wagens gestald werden en iedereen van laarzen voorzien.

De morgen-uren brachten we door rond het Uileven, een eertijds echt brabantse vennetje, maar nu door bemesting sterk geëutrophiëerd.

In het veenmos vonden we prachtige *Galerina mycenoides*.

Onder de wilgenbomen stonden volop *Hypholoma subericaeum* en *Hebeloma pusillum*. Aan de rand van het veen groeide de slanke *Flammula myosotis*.

Aan de andere zijde werden we verrast met tientallen *Cortinarius concinnus* in allerlei stadia en prachtig van kleur in het zachte najaars zonnetje. In het schemerdonker van het wilgen en berkenstruweel ontdekten we tenslotte nog *Inocybe squarrosa* Rea, zo kenbaar aan de gele talrijke cystiden op de lamellen en het harig-schubbige hoedje.

Na de middagboterham lui liggend in het zonnetje verorberd te hebben wandelden we rustig langs mooie paadjes naar de Beekloop, maar de droogte van de voorafgaande week had niet veel meer laten staan.

We kunnen dan ook alleen maar vermelden: *Flammula graminis*,

Nolanea staurospora, veel Entoloma rhodopolium (met en zonder geur) en ook hier veel Cortinarius concinnus. Aan het eind kwam nog Lactarius semi - sanguifluus te voorschijn. De schaarse aan paddestoelen werd echter vergoed door het fraaie landschap, de lekkere bramen en de kweeperen.

Fr. Benjaminsen.

====*==*==*==*

MYCO - FILATELIE IV

Op 1 jan. 1964 werd door Mongolië een serie van acht paddestoelenpostzegels uitgegeven op wit papier en groot ruitvormig formaat.

De zegels vertonen de volgende waarden en afbeeldingen:

- 5 m Coprinus comatus,
- 10 m Lactarius torminosus,
- 15 m Psalliota campestris,
- 20 m Russula delica,
- 30 m Ixocomus granulatus,
- 50 m Lactarius scrobiculatus,
- 70 m Lactarius deliciosus,
- 1, -t. Ixocomus variegatus.

In totaal bestaan er nu 39 postzegels met afbeeldingen van paddestoelen in 23 verschillende soorten.

In Gibbons' stamp monthly van febr. 1959 bespreekt de bekende Dr. Dennis uit Kew de Roemeense en de Tsjecho-slowaakse series.

Fr. Benjaminsen.

====*==*==*==*

NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Bestuur:

- Prof. Dr. A. J. P. Oort, voorz. Eriicalaan 5, Wageningen;
- Drs. C. Bas, onder voorz. Joh. Wagenaarlaan 12, Leiden;
- Mej. Dr. A. Jaarsveld, secr., Hugo de Vries lab. Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam C;
- Mej. Drs. J. P. S. Smit, penningm., Nic. Maesstr. 135, Amsterdam Z. postrek. 90902 t. n. v. N. M. V.;
- Mevr. Drs. H. F. J. von Arx-v. d. Brugge, biblioth., de Ruyterlaan 5, Baarn;
- Drs. J. v. Brummelen, vert. Flora Comm. Hyacinthenlaan 25, Haarlem.
